






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.572





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.572







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.572




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.572



1. 6. 572








XV

VEG







ΜΗΤΕΡ ΛΑΒΗΤΟΝ



ILLVSTRISSIMO PRINCIPI FER.  
dinando Regi Hūgarīa, Bohemiā &c.

Transuxerat olim, Ferdinande Regum serenissime, ad nos D. Her-  
mannus Inclutus à Neuenare Comes, Vegetij Renati artem Veterinariam,  
ut eam doctissimorum uirorum auxilio, à mendis, quibus scatebat, expurga-  
remus, & typis excussam aderemus in publicū. Sed cū exemplaris infinita  
depravatione desperantes ab incepto negotio deteriti fuissetus, codicemq;  
illum peruetustum rursus ablegassetus, instigauit ad desperatū munus re-  
deundū, q; tuæ Serenitatis nomini opus hoc dedicādk afferebat, nimirū ut cui  
nō ingloriosum esset, et egregios, et ualidos equos habere etiā p multos, quos  
hic author & à peste præseruari, & iam agrotantes sanari nō incommode  
perdocuit. Verū cū non integre natuo nitori me redditurū considerē, spe-  
rabam tamē me & Cels. tuæ rē gratā, & posteris ansam id studij diligentius  
pquirēdi præbiturū. Habeant uaq; p Serenitatē tuā et ceteri, Vegetiū hūc,  
nostro labore à uitijis pmodū infinitis expurgatū. quāq; sint pleraq; quæ  
absq; dūto γράφω restitui posse nō credere, quæ, ubi usum fuerat, uel obelo,  
uel asterisco, uel alia quadā notula cōsignauimus. Nonnulla, licet immutatis  
uel uerbis uel uerborum ordine, sententias tamen plenas, & intellectu faciles  
insinuare comperimus, quæ lectoris iudicio immutanda uel corrigenda reli-  
quimus. mei enim candoris non esse censebam si mea alienis ingererē. Quæ-  
dam etiam morborum, simul & herbarū, remediōrumue uocabula licet im-  
mutanda cognosceremus, constās tamen exemplariorum consensus, ne qd  
immutaremus prohibuit. nā ita fortā sis scriptū ab authore nō uulgares ne-  
que inruditi persuadebant amici. quod eo facilius effecerant, & q; nō igno-  
rem Antonij Codri de hoc authore iudiciū, & q; sciam apud plerosq; medi-  
cos permulta esse uel corruptissima. Quædam etiam cū uel uariarent exem-  
plaria, uel abundare uiderentur, aut etiam uel parum, uel nihil ad sententiā  
facerent, parenthesi interdum cinximus. De his Serenitatem tuam admonen-  
dam duximus. Precantes nostrum hunc laborem (qui certe quantus fuerit,  
nemo facile crediderit) hilari fronte suscipere nō dedignetur. Vale felix.

S.

M.

T.

Obsequentiſſimus Ioannes Faber  
Emmeus Iuliacenſis Typogra-  
phus. Baſileæ.



# SERENISSIMO

AC ILLVSTRISSIMO PRINCIPI D. FER-  
dinando, Regi Hungariæ, Bohemiæq; Archiduci Aus-  
triciæ, Duci Burgundiæ, &c. Domino suo Cle-  
mentissimo.



Nter tot, tamq; uarios & ancipites fortu-  
næ casus, quos infractio hucusq; animo  
superasti, Ferdinande Rex Sereniss. illud  
merito in te miramur omnes, quod in ea  
ætate cōstitutus, ita animum institueris,  
ut neq; in rebus prosperis audaciæ, neq;  
in aduersis timiditati unquam induleris.

Nam tot iam partis abs te triumphis, nihil immoderate, ni-  
hil arroganter egisse uisus es. Sed ne in ipso quidem bellico  
furore mentē tuā passus es à recta ratione dimoueri, quod  
heu nimium multis contigit, alioqui laudatissimis uiris, ma-  
gno suo, suorumq; malo. Alios non paucos bellum ipsum  
exitialis rerū humanarū pestis, inhumanitatē, feritatem, et  
crudelitatem docet. Tu contra in ipsis bellorū tumultibus  
mansuetior, in militia reddi cultior uideris. Quā rem maio-  
re etiam admiratione dignā facit Celsitudinis atq; dignita-  
tis tuæ cōsideratio. Tu quippe citra omnē controuersia  
post Cæsareū numē secundū in rebus humanis obtines lo-  
cū. Quē qdē ita & magnanimitate & gratia tueris, ut ne-  
mo uideri possit eo obtinēdo dignior. Intellexerūt hoc Bō-  
hemi & Hūgari, qbus nec uisus antea, nec plene cognitus  
inter tot undiq; cōpetitores dignissimus es iudicatus, quos  
triusq; regni gubernacula suscipies. Miratur multi Cn. Pō-  
peiū, q Mithridatē regem. 70. regnorū cū tota ferē Asia, na-  
tura imbelli; Mariū, q Cymbrorū colluuiē: Cæsare, q Gal-  
los agrestes tunc hoīes bello superant. Te adhuc puero Sue-  
uorū gens, quorū uires ipsis aliqñ Romanis formidabiles  
erāt, tuo. i. Austriæ Imperio accessit, idq; felicissimo quodā  
2                      auspicio



## EPISTOLA

auspicio, uidelicet ut ex tam auspicato exordio Regni tui, homines intelligerent, ipsos aliquando, ditionis tuæ terminos longe lateq; propagandos esse. Venetos gentem totius Italiae florentissimam, ad conditiones acceptandas sola nominis tui auctoritate compulisti, receptis oppidis aliis quor, quæ Maximiliano Cæsari, iniuste ablata, iure debebantur. Accesserunt etiam finibus tuis pars lacus Benaci, nec non alpium, ac florisulij loca quedā per Venetos iam dudum uiolēter occupata. Heluetios multo iam tempore graues illis, quos eo in tractu tibi habes subditos, facile cōtines tua auctoritate, Satius iudicantes, quietem agere, quā quicquam quod tu uiolari nolis, attingere. Vn garicum bellum, quod prædonis illius Reguli inuidia exarserat restrinxisti, ut prius quā copiae tuæ, ditionis illius fines attigisse crederentur, ille tam toto regno pulsus exularet. Sunt hæc quidē argumēta summæ fortitudinis & prudentiæ, maioris etiam felicitatis tuæ. An nō uidemus hoc agere deum? ut Cæsarea maiestas ac tua Celsitudo tātum emineant potestate, quantum modestia & bonitate excellitis. Amisit nuper Germania decus et ornamentū suum Diuum Maximilianum Auum uestrū, Cuius in re bellis ca non inferior Scipione, uirtus atq; industria habebatur: Amiserat ante Philippum patrem, adeo amabilem & charum omnibus mortalibus, ut pulcherrimum Titi & Vespasiani elogium illi iure competierit, Deliciae generis humani; sed deus qui nunquam deest rebus humanis, quanto cum scenore, quod periisse uidebatur, refarciuit, excitans nimirū duo ornamenta, duo humani generis præsidia, quorum auspicio, boni ad excolendas uirtutes accendantur, mali uero benefacere discant. Sed hæc epistolaris non cōprehendit angustia: celebrabunt ea, quibus & plus otij & ingenij erit. Aperuisti tu uel solus campum patensissimum, ubi & ingenium & eloquentiam exerceant omnes.



# DEDICATORIA.

nes eruditū. Sane iniquum fuerit, nos ita suspicere antiquitatem, ut nostra, cum non sint inferiora, contennamus. Ego, ne inter aulicos tuos, solus nihil agere uidear, chartas ceum munusculum tuæ offero Serenitati, Vegetij inquam Renati, eius qui de re militari libellum cōscripsit, artis Veterinariæ siue Mulomedicinæ opus, multis seculis absconditū. quandoquidē equos habere & multos & bonos regij decoris esse uidetur, quos non tam ad pompam, quàm ad res gerēdas alere cordati homines solent. Quæ in re Mulomedicorum opera minime contemni debet. Hoc itaq; opusculum Beato Rhenano, necnon Ioanni Emmeo, conterraneo meo, uiris cum eruditis, tum mihi amicissimis, primum commissimus, ut illorum opera castigatum exiret in uulgus. Nam erat propemodū infinitis locis corruptum. Verū cum Beatus ille uarijs obstrictus negotijs muneri obeūdo adesse nō posset, solus Emmeus, nō absq; summis laboribus, operi castigando manum applicuit. Huius igitur industriæ debetur, quod ab infinitis uindicatum nūc nūc potit in lucē. Tu uero Serenissime Rex Ferdinande, ut illos tui gratia potissimum susceptos labores recōpenses, bonas literas, quicq; illas sincere colunt, pro regia indole tua, quemadmodū hætenus fecisti, ornare & tueri non desinas, id enim tuis pulcherrimis factis, non parum splendoris adiūciat. Interim Deum Opt. Max. precor, ut imperium tuum, perpetua felicitate decoretur ad honorem dei, & utilitatem Reip. Christianæ. Meq; tibi obsego sissime commendo Ferdinande Regum Illustrissime. Ex arce nostra Bedburtina, quarto Nonas Iulij. Anno domini

M. D. XXVIII.

E. R. Maiestatis Tuæ  
deditissimus, & obsequentissimus Here  
mānus Comes à Nuenare, Præpositus  
primariæ ædis Coloniensis.



# ELENCHVS TI=

TVLORVM CAPITVM LIBRI PRIMI.

Quibus signis ægritudo animalium cognoscatur.	1
Quot sint genera morborum.	2
Signa morbi humidi.	Cap. 3
Signa morbi aridi.	4
Signa morbi subtercutanei	5
Signa morbi articularis.	6
Signa morbi farciminosi.	7
Signa morbi subrenalis.	8
Signa morbi elephantiasis.	9
Cura morbi humidi.	10
Cura morbi aridi.	11
Cura morbi subtercutanei.	12
Cura morbi articularis.	13
Cura morbi farciminosi.	14
Cura morbi subrenalis.	15
Cura morbi elephantiasis.	16
Causæ & curæ generales morbi malei.	17
Potio anniuersaria Physica.	Cap. 18 lib. primi.
Compositio suffimentorum contra morbum maleum.	19
Alia compositio suffimentorum uehementior, ad lustranda animalia, quæ & fascinum tollit.	20
De ratione flebotomi.	21
Quæ diligentia adhibeat in sanguinis detractione.	22
Castrata animalia non deplenda.	23
Admissum facientes non deplendos	24
In quibus passionibus & ex quibus locis sanguis sit auferendus.	25
De his quibus sanguis in ungulam tollitur. Alias. Qui ungulam cogunt, uel ciecerint, quomodo sanguis tollatur.	26
De Epist	

# I N D E X .

De epistomicis, uulsis, colicis, strophosis, & q morbo sub- renali tenentur, unde sanguis tollendus sit.	27.
De ratione foci atq; cauterij.	28
De passione & curis febrium.	29
De lassitudine, quæ uidetur febribus similis.	30
De febribus internis.	31
Si in Autumno febrerit.	32
Si æstate febrat.	33
Si hyeme febrat.	34
Si ab indigestione febrat uel pletura.	35
Si ex uuinere oris aut faucium febrat.	36
De coactionibus. i. de nimia lassitudine.	37
Quæ genera ægritudinum ex coactione nascantur.	38
De diuersis passionibus uentris	39
De aqualiculo. i. stomacho.	40
De colo & coli dolore.	41
Cura longanonis & ilei.	42
Causæ & curæ strophæ.	43
De lumbricis, colicis, tineis & pediculis.	44
De clysterijs ad curam lumbricorum & tinearum.	45
De calculosis iumentis.	46
De emphragma.	47
De ileo.	48
De dolore uentris.	49
De dolore coli.	50
De dolore uesicæ.	51
Colli & lumbrici qua cura tollantur ad manum.	52
De syncopatis & confixis.	53
De his qui sanguinem per nares emittunt.	54
De infestatione sanguinis.	55
Quæ adhibenda est diligētia ut animalia sana per- durent.	56
Potio æstiuæ.	57

Potio hy



# INDEX.

Potio hyemalis.	18
Potio in autumnno & uere prabenda.	19
Potio omni tempore necessaria.	60
De difficultate urinæ.	61
De Stropho.	62
De dorso curando.	63
De potione probatissima Diapente.	64

## CAPITA LIBRI SECVNDI.

De ualitudinibus capitis.	1
De Appiofo.	2
De Frenetico.	3
De Cardiacis.	4
De Rabiofo.	5
Qua ohferuatione curentur cyclo animalia. at unũ exem plariorum habebat, cibo.	6
De cerebro commoto.	7
De capitis dolore.	8
De Distensionibus.	9
De Appiofo.	10
De Rabiofo.	11
De Infania capitis.	12
De Chirurgia.	13
De Auribus.	14
De pilis qui nascuntur in oculis.	15
De Suffusione oculorum.	16
De paracenthesi oculi.	17
De Lunatico oculo.	18
De Staphylomate oculi.	19
Ad album de oculo tollendum.	20
De suffusione curanda per nares.	21
De diuerfis passionibus oculorum.	22

# INDEX.

De strumis iumentorum.	23
De glandulis	24
De pullaribus	25
De fistula maxillæ, uel de conficiendo collyrio fistulari.	26
De expositione fistulæ.	27
De tumore faucium uel capitis.	28
Si ex pletura sanguinis fauces tument.	29
De intomatibus. i. tuberibus.	30
De lingua incisa.	31
De gingiuis & dentibus.	32
De osse fracto.	33
De cartilagine narium si sanguis fluat.	34
De palato si uena se non clauferit.	35
De genere & qualitate mucorum qui per nares fluunt.	36
De cuserino. i. cū post cursum sanguis de naribus fluit.	37
De polypo	38
De siderato.	39
De obseruatione flebotomi.	40
De ceruicibus	41
De malandria. i. de uulneribus ceruicis.	42
De distillatione ceruicis.	43
De distillatione scapularum.	44
De armislæsis.	45
De genu commoto uel basi.	46
De fractura articuli, uel cruris, uel coxæ.	47
De flegmone, marmore, siue mallonibus.	48
De aquatilibus & ozœnis.	49
De pedibus reumaticis, siue uentosis.	50
De impetiginibus.	51
De uligine.	52
De podagra iumentorum.	53
De orthocolis siue stulosis.	54
De pedibus & ungulis.	55



# I N D E X .

Si pulmunculum ad aperturam fecerit.	56
Si exungulauerit iumentū, & si suffusionē pedū patiat̃.	57
De pedibus attritis siue mollibus.	58
De dorso confirmando.	59
De dorso curando iam laeso.	60
Si pulmunculus nascitur in dorso animalis.	61
Si uulnus fecerit.	62
Vt pili renascantur.	63
De denigrandis pilis albis.	64
Vt pili nigri albescant.	65

## CAPITA LIBRI TERTII.

De obseruanda boum sanitate, Rubricæ cap. 1.	
De morbis boū, & primo de maleo. 2. cap. Rub.	
De cruditate. cap. 3. Rub.	
De febre. cap. 4. Rub.	
Si uermes animal fecerit. cap. 2. lib. 3.	
De cura lumborum.	3
Quibus signis dolor renum indicetur.	4
De internis musculis renum.	5
Si talus exeat animali.	6
De dolore renum.	7
De tumore testium.	8
Si natura reuocari non possit.	9
Si iumentum sanguinem minxerit.	10
De dysenteria.	11.
Si ociosum animal sanguinem mingat.	12.
Si animal sanguinem euomat.	13
Si percussa uena claudī non possit.	14
De indignatione uesticæ.	15
De fluxu uentris.	16
De uerrucis.	17

# I N D E X.

De uitijis coxarum.	18
De laccis gambarum.	19
De gamboſo,	20
De hiſ quæ læduntur à rotis.	21
De ſyrmatico. i. quod coxam ſubito trahit.	22
De morbo alienato.	23
De roborofiſ.	24
De hydropiciſ.	25
De ſarcoſtiſ.	26
De tympanitiſiſ.	27
De lienofiſ.	28
De implectico.	29
De phragmatico.	30
De eo qui aquam timet.	31
De ſpaſmo.	32
De epilepſia.	33
De eo qui aquam reuomit.	34
De ſideratiſio.	35
De percuſſo à ſole.	36
De cruditate.	37
De bulimo.	38
De anhelitu.	39
De æſtu,	40
De paralytico.	41
De intrinſecus rupto.	42
De infania.	43
De pletura ex hordeo.	44
De paſſione pulmonis.	45
De eieronica, uel orthotonico, uel ortholiſtophico.	46
De opiſthotonico, & empithotonico.	47
De lethargico.	48
De morbo regio.	49
De bili, i. coleribus.	50

b a



# INDEX

De biliarida.	51
De coli passione.	52
De uomica.	53
De coriagine.	54
De stomachico.	55
De ictérico.	56
De stropho.	57
De dolore iecoris.	58
De inflatione uentris.	59
De intestini uexatione.	60
De tussi.	61
De tussi quæ uenit si quid faucibus hæserit.	62
De tussi ex perfrictione.	63
De tussi à colibus.	64
De tussi ab interioribus.	65
De uulsis.	66
De tussi quæ ex humorum acerbitate generatur.	67
Ad tussim siccam, uel ad suspirium, & arteriam exasperatam.	68
Ad uomicas & tussim.	69
De diuersis potionibus uulforum & tussientium.	70
De scabie.	71
Si animal fœno malo lædatur.	72
Si hordeo malo lædatur.	73
Ad fascinum.	74
Remedium contra omnes morbos.	75
Si animal lædatur dum accipit potum.	76
Si animal à uenenatis bestiolis mordeatur.	77
Si bystrem comederit animal in fœno.	78
Si uipera percusserit animal.	79
Si araneum comederit.	80
Si sphalangius percusserit animal.	81
De mure araneo.	82

# I N D E X.

Ad ictum scorpionis.	83
De canis rabidi morfu.	84
Si animal comederit sterus gallinarum.	85

## CAPITA LIBRI QVARTI.

De numero & positione ossium	1
De numero & qualitate membrorum.	2
De numero & qualitate neruorum.	3
De qualitate uenarum.	4
De indicijs & ætate equorum.	5
De signis quibus agnoscitur patria.	6
De temporibus uitæ.	7
Porio ad reficiendum iumenta, & diapente.	8
Ad tussim & uulsos.	9
Ad collos, uermes, uel tineas.	10
Aduersum omnia genera morborum.	11
Confectio suffimentorum salutaris.	12
Confectio pulueris quadrigarij.	13
Compositio caustici.	Ca. 14
Compositio malagmæ.	15
Compositio collyrij fistularis.	16
Compositio malagmæ crudæ.	17
Compositio syncrismæ.	18
Compositio traumatici.	19
Compositio malagmæ basilicæ.	20
Alia compositio malagmæ.	21
Compositio prima anacollimatis.	22
Compositio alia malagmæ crudæ.	23
Compositio malagmæ ad uligines.	24
Compositio malagmæ ad neruos.	25
Compositio traumatici.	26
Compositio collyriorum.	27
	b 3



I N D E X .

Sequuntur medicamentorum genera quædam, ad finē  
quarti libri adiecta. Folio .70.

Cephalicum emplastrum ad claudenda uulnera.  
Medicamentum consuetum.  
Chlora medicamentum ad uulnera lymphidanda.  
De tetrapharmaco, ad uulnera claudenda.  
Glicium, ad uulnera sordida & cancrofa.  
De ossoclaris, ad omnia ossicula.  
De styptico, ad uulnera humecta.  
Medicamentum ad omnia uulnera claudenda.  
Implectoricum, ad caua supplenda.  
Ad oculorum rupturas, & glaucomata.  
De syncrismo, aliud.  
De lipparijs.  
Traumatici compositiones uariæ, ad uaria.  
Caustici compositiones aliæ ad diuersa.  
De malagmatis quibusdam.  
Emplastrum quoddam.  
De ceroto.  
Fomentum ad tumores, uel quamlibet duriciam.  
Potio hyemalis.  
Potio æstiuæ.

# VEGETII RENA

TI ARTIS VETERINARIAE, SIVE  
MVLO MEDICINAE, PRAEFATIO.



Vl medicina apud Græcos Latinosq; authores non fuit cura postrema. Sicut enim aīalia post hoīem, ita ars Veterina post Medicinā secunda est. In equis enī ac mulis & adiumenta belli, & pacis ornamenta consistūt. Sed quoniā minus dignitatis uidebatur habere professio quæ pecudū promittebat medelā, ideo minus splendidis exercitata, minus eloquentibus collata docetur in libros, Licet prōxima etate et Pelagonio non defuerit, & Columelle abūdauit dicen di facultas: uerū alter eorū cū rusticæ rei præcepta conscriberet, curas aīaliū leui admonitione perstrinxit; alter omīssis signis causisq; morborū, quasi ad doctissimos scriberet, tam magnæ rei fundamenta neglexit. Chiron uero & Absirtus diligentius cuncta rimati, eloquētiæ inopia, ac sermonis ipsius uilitate sordescūt. Præterea indigesta & confusa sunt oīa, ut partem aliquā curationis quærenti necesse sit errare p̄ titulos, cū eisde passionibus alia remedia in capite, alia inueniantur in fine. Additur etiā q̄ studio lucri quædam ita sunt compositæ potiones, ut pretium enorme contineant, & curæ taxatio, animalis æstimationem propē uideatur æquare: ut plerūq; aut parci homines, aut certe prudentes, aīalia sua canibus dedant, aut à dānosa curatione dissimulent. His & talibus rationibus inuitatus, cum ab initio etatis alendorum equorum studio flagrarem, hanc operam nō inuitus arripui, ut conductis in unū Latinis dūtaxat authoribus uniuersis, adhibitis etiam Mulomedicis, & Medicis non omīssis (nam Mulomedicinæ doctrina ab arte Medicinæ non adeo in multis discrepat, sed in multis plurimisq; cōsentit) in quantum mediocritas ingenij patitur, plene ac breuiter omnia epitome congererem, causasq; & signa morborum omnium declararem. Nam si laus prima medicorum est genus ægritudinis in homine reperire, qui passionem suam & manu potest, & uoce signare, quāto magis in Mulomedicina necessariū creditur genus ægritudinis nosse, cum mutum sit aīal, & non possit propriū indicare



# P R A E F A T I O .

indicare languorem, & ab imperitis ad opus aliquod laborēque cogatur. Sic geminū subeat ex morbo & fatigatione discriminē. Aut certe neglectū, inueterata ægritudine nequeat sero curari. Sicut Mantuanus poëta diuino ore testatur: Morborūq; & causas, et signa docebo. Absq; dubio aut oīs cura uacabit, si genus passionis ignoretur. Ex inani p̄suatione illud generatur in cōmodū, ut honestissimus qsq; erubescendū ac uile credat iumentorū nosse medicinā. Primū, nullius rei scientia uilis est. Nā cum humane uitæ conuersatiōe aliud fugendū, aliud uero sequēdum, nō est p̄fecta peritiā, nisi quæ utraq; cognouerit. Deinde, quis æstimet erubescendū talem peritiā quæ damna submo-ueat? Nā sicut incolumitas iumentorum habet lucrū, ita eorū interitus asferre uidetur incommodū. Præsertim cū mancipia, quorum plebeia curatio nō putatur, sæpe uilioribus pretijs, quā equi uendantur aut muli. Postremo siue ad uehēdos locupletes aptos, siue in circi cōtentione uictores, siue in prælijs (ut ita dixerim) probatissimos bellatores, acerrimū studiū amoremq; constat alis (aut saluti) habere dominorū. Nec immerito uoluptati natū animal (salutis) gratiam meretur ab hoīe. Quis aut nosse curas iumentorum erubescendum putet, cum optima iumenta habere gloriosum sit? Quis uitupationi det id posse curare, quod laudi ducitur possidere? Forsan ipsa opera Mulomedicorū uidetur abiectior, notitia aut curationis nō solum honestissimis, sed etiā discretissimis conuenit: ut prouisione & ordinatione sollerti curatis animalibus, & damnis careant, & uoluptatibus perfruantur. Sed alij morbi sunt, qui ea tantū aīalia, quæ occupauerunt, uexant; Alij etiam ab uno uel paucioribus quæ pereūt, in plura, quæ pariter stabulātur uel aluntur, in totos sæpius greges sensissima contagione transmigrant, ut quamuis sanū aīal intra breue tempus, alienæ ægritudinis afflante uicinia, repente depereat. Rectius est ergo eorum prius morborū & signa & causas prædicere, curasq; mōstrare, qui quodā trāsitu pluribus nocēt. Nam aduersus maiora dispēdia, maiorem sollicitudinē oportet impendi. Prima igitur iumentorum uilitas est domini, uel procuratoris, uel pastoris ipsius amor atq; diligentia. Comes enim semp est affectionis, industria: & incolumia cupimus quæcumq; diligimus. Domita aīalia aut præsepibus aluntur, aut pasto. Indomita latioribus nutriuntur in salubus. Quotidie ergo, uel frequentissime speculari conuenit habitum iumentorum. Nam diligentibus morbus ipse se prodit.

FINIS.



# VEGETII RE=

NATI ARTIS VETERINARIAE,  
SIVE MVLOMEDICINAE LI  
BER PRIMVS.

QVIBVS SIGNIS AEGRITVDO  
animalium cognoscatur. Caput. I.



CONTINVO ANIMAL QVOD  
ualetudo tentauerit, tristius inuenitur, aut pi-  
grius, nec consueto utitur somno, nec solito se mo-  
re transuoluit, nec requiem ut assumat accūbit,  
nec deputatum cibum assumit ex integro, & po-  
tum aut intemperantius accipit, aut omnino fasti-  
dit, stupēti bus oculis, auribus flaccidis, erecto ui-

lu, turpi pilo, exhausta sunt ilia, sit spina rigidior, anhelitus crebrior aut  
grauior, incessus ipse, quo maxime notatur, segnis ac nutās. Cum huius-  
modi signa in iumento unum uel plura conspexeris, statim illud separabis  
à ceteris, ut contagionem non inferat proximis, et facilius in solo iam cau-  
sa morbi possit agnosci. Si diligenter habitum, post unam, secundam, uel  
tertiam diem ab illa inuestitia fuerit absolutū, nihilq; resederit in corpore  
ipsius quod putetur ambiguum, scito ex leuioribus causis illam uenisse tri-  
stitiam, & animal consuetudini pristinae esse reddendum. Nec exploran-  
di omittatur intentio. nam frequentius inspicere debet & cautius, quod se-  
mel coepit esse suspectum.

Quot sint genera morborum. Caput .II.

**M**orborum quidem diuersae sunt passionēs, sed uno generali uoca-  
bulo continentur, quod ab antiquis Malleus nominatū est, ipsa  
appellatione uim cladis periculumq; testantes. Sunt autem spe-  
cies Mallei numero septem: Humidus, Aridus, Subtercutaneus, articula-  
ris, ele

## ARTIS VETERINARIAE

ris, Elephantiasis, Subrenalis, Farcininosus. Signa omnium dicamus.

### Signa morbi humidī. Caput .III.

**H**umidus morbus est, cui de naribus pro mucis humor defluit male olens, & spissus, colore pallido. Huius grauat caput, oculi lachrymantur, & stridet pectus, sit gracilis horrentibus pilis, tristis aspectu. quem profluuium atticum ueteres uocauerunt. Quando cunque autem sanguinolentus humor uel croco similis per nares fluxu experit, iam insanabilis est & uicinus morti.

### Signa morbi aridi. Caput .IIII.

**A**ridus autem morbus his agnoscitur signis: Nullus ei per nares supra solitum humor emanat, suspirat tamen grautiter, & nares habet extensas, ilia curuabit intrinsecus, et contractionem spinæ duriciamq; patietur, testiculi eius ita substringuntur, ut apparere uix possint, cibi parcior, bibendi appetentior ultra morem. Propter quod pulmone siccato, internum patitur ardorem, tensis oculis in obliquum respicit, nec facile cubet. Hūc suspirium uocant & insanabilem, nisi ab initio secura curatione subueneris.

### Signa morbi subtercutanei. Caput .V.

**S**ubtercutaneus morbus autem his proditur signis: Vulnere in cornu spore eius scabiei similia nascuntur, ex quibus humor effluit liquidus & uiridis, qui pruriginem mouet, ut scalpere parietibus uel cornu animalia sepe fricare compellat, quo ulcera corticem ducent. Huic nec humor per nares emanat, nec anhelat, nec cibum recusat, nec respuit potum. Propter quod diu bibet. Et ideo si cura non desit, ex hoc plurima iumenta liberantur. Quidam uero scabiem subtercutaneum morbum dicere testauerunt, quod similia supradictis signis uideatur ostendere, & contagionem transferre per proximos, & tardius sanari. Sed quia nec necem, nec gregi infert facile periculum, à pestiferi illius mallei societate discretus.



discretus est, & seorsum ab illa dicitur.

Signa morbi articularis. Caput .VI.

**A**rticularis autem morbus, quem ἀρθρίδης Græci uocant, per hæc monstratur indicia: Interdum paucis, interdum plurimis diebus ab articulis claudicabit, ut aut ictu calcis animalis alterius percussus, aut negligentia impactus, aut saxo uel fuste uideatur elusus. Sed hæc solet esse distantia, ut illa quælibet læsio loco figatur, hæc autem passio, quia erratica est, subito ad pedem alterum migrat. Præterea ossibus astringitur cutis, & ad tractum tractanti dura resistit, Rigescit spina, corpusq; contrahitur, pilus erectus & horridus, ac deformis aspectus, macie corpus affectum. Et quamuis non recuset alimenta, nec curat si desint, indies tamen deterior fit & tristior, difficulterq; curatur.

Signa morbi farciminosi. Caput .VII.

**F**arciminosum uocabulum ex genere passionis euenit. Huiusmodi deprehenditur argumento: In lateribus & in coxis, & in uerendis quoque partibus, & præcipue in iuncturis membrorum, uel in toto corpore collectiones instantur: rursumq; his uelut sedatis, aliæ renascuntur: cibum potumq; ex more recipiunt, macrescunt tamen. quia digestio eis plena non prouenit, hilares aspectu, sanisq; similes creduntur ab indolis artis mulomedicinae, quia exterius agitur causa; quibus imperitia artificum sanguinem festinat auferre. Sed contraria ista curatio est. Nam affectis farcimino, quicquid superest uirium, tollit. In initio tamen ne morbus increseat, uel in fine cum iam uires redire cœperint, emissio sanguinis iuuat.

Signa morbi subrenalalis. Caput .VIII.

**S**ubrenalalis morbus nō minus noīe, quā ipsa passione monstratur.

A a Nam



## ARTIS VETERINARIAE

Nam animal uelut renibus lesis, à posteriori parte deficiens, prodit mortiferæ necessitatis indicium, tussiet grauius, horrebit aspectu, cutis duritia ex spinæ rigore proditur, partius potum, partius appetit cibum. Huic quia tota uis morbi possidet lumbos, à femoribus incipit prima curatio.

### Signa morbi Elephantiasis.

### Caput. IX.

**E**lephantiasis autem dicitur ex similitudine elephantis, cuius naturaliter pellis dura & aspera, morbo nomen & in hominibus, & in animalibus dedit. Cuius signa hæc sunt: In toto corpore uredo nascitur, præcipue in dorso, squamas similes corticibus facit. In naribus, in pedibus etiam, & in capite, papularum feruor emergit, uel oxæne asperiores frequenter oriuntur. Priusquam hæc ostendantur indicia, uentre soluto erit, & marcescit, et aspere tussiet. Cuius os totum cum lingua asperum & simile creditur esse combusto. Quæ passio pullis à matre depulsis plerumque perniciem consuevit inferre. Hunc diligenter curare cupientes, non ante desoris aliquo medicamento fouere contendunt, nisi prius positionibus datis, pestis eleuetur interior. Nā extrinsecus cepta medicamenta morbum non eximunt, sed ad interiora compellunt, & hac ratione periculum generant. In animalibus eiusmodi morbo laborantibus generalia ista sunt uitia: tussis aspera & crebra suspiria, spina contracta & rigida, macies semper increscens cum studium & alimenta non desinant, demissior ceruix, stupentes oculi, tardior incessus. Nunc signis omnibus generaliter singulariterque digestis, singulorum morborum speciales, propriasque curas oportet adiungere. Post hæc de generali minutione singulorum, et adustione docens, concludam librum primum.

## DE MORBORVM CVRATIONIBVS.

### Cura morbi humidī.

### Caput. X.

**M**alleus morbus si humidus fuerit, ita ut per utranque nares uirides defluant muci, inter exordia caput eius adhibita curatione purgandum est ita: Olei optimi uncias. 3. liquaminis floris uncias. 1. uini

# VEGETII LIBER I.

1. uini ueteris cyathos. 3. sereno tranquilloq; die pariter commisceas, & cum tepesceris infundes in naribus, caput religabis ad pedes, sensumq; iumentum impeditum compelles incedere, ut omnis humor emanet. († ad siphonem autem paulatim infundes non semel à cornu) Quod si sanguis postmodum coeperit fluere, nihil timendum, sed potius sciendum est, animal legitime fuisse purgatum. Post quod seuum caprinum resolutum oleo miscebis, sic infusis naribus exulcerationis illius mitigatur asperitas. Radicem quoq; laseris consam, & per fistulam uento naribus insitam, ut sternutum prouocet, adhibere commodum est. Caput etiam extrinsecus auricularsq; oleo calente diligenter perūges, & lana cerebro indita, ab omni perfrictionis necessitate munibis. Nasturtij quoq; semen bibendum dabis ex aqua. Præterea potionem dabis, qui diapenton uocatur, et hac ratione conficitur: Murræ, gentianæ, aristologiæ longæ, baccis lauri, rasuras eboris benetratas et cribratas æquis miscebis pōderibus, seruabisq;. Exinde prima die unum coclearium cumulatū cū sextario uini ueteris, secūda die unum & semis, tertia autem die duo coclearia tepescēto mero aspersa, & diligenti agitatione permista dabis ad cornu. Postea ex ceruice de matricali uena sanguinem detrahes, permixtūq; acerrimo aceto, omne equi corpus perunges, & contra pilum diligenter fricabis, ut ad similitudinem glutinis adhæreat. Tumentum quoq; in loco calido cōstitues. Si cibum fastidit, † æstate dūtaxat farinæ hordeacæ sextarium unum quinq; sextarijs aquæ permixtum equo dabis in potu. Triticeam quoq; farinā simili mensura & ratione offēres ad bibendum. Si autem fastidit, nō ideo aliud dabis, quousq; hoc ex ista necessitate sanitatem percipiat. De palato quoq; postea sanguinem detrahes, ut omni ex parte, si qua morbus prægrauare coeperit, releuetur. Scito nisi diligenter occurras, hūc esse periculosissimū morbum. Nam cito in suspirium, hoc est, anhelitum transit, & spem omnem salutis excludit.

Potio diapente.

† al. statim.

## Cura morbi aridi.

## Caput .XI.

**A**ridus uero morbus, qui & suspiriosus præcipue dicitur: & hic negatur à quibusdam posse curari, propterea, quod phihisi, quæ

A 3

homini



## ARTIS VETERINARIAE

hominibus mortifera est, similis inuenitur. Quotidie enim macie crescit  
 et exilior redditur, penitusque siccatur. In omni autem ratione medicinae,  
 facilius est quae abundauerint diminuere, quam quae uidentur deesse sup-  
 plere. Salus tamen iumentis etiam in hac passione praestatur, si inter prin-  
 cipia possit occurri. Sanguinem siccis detrudere contrarium est, Sed ui-  
 no et oleo sufficienter admixto et tepesfacto, perungendum toto corpore  
 animal est, ita ut caput et maxillae, et extrinsecus fauces eidem largius  
 infundantur, et contra pilum usque ad sudorem diutissime confricentur.  
 Intrinsecus autem a prima die hac potione curandum est: Succum pitu-  
 sanae, adipem suillum remissum, et anilum ex melle passo, quae decoctum  
 per cornu in potione dabis, ut canalis gutturis eidem, maxillarumque com-  
 pago laxetur, quam siccitas astrinxerat morbi. Quo facto, in loco calido  
 stabit. Infusum hordeum herbarumque uiridem, si inuenta fuerit, debet acci-  
 pere, ut omni ex parte periculosa ariditas temperetur. Consequenter talis  
 eidem potio praeparatur: Passi optimi sextarium unum, iridis illyricae un-  
 ciam unam, piperis nigri senuunciam, croci scrupulum, mirrhae (et trigo-  
 nitis) semiunciam, pollinis thuris unciam unam, oua cruda quinq; pari-  
 ter mixta prima die dabis ex integro, ita ut per triduum ipsam misceas  
 semper et offeras, ut tam grauis morbi asperitas, potionis dulcedine mi-  
 tigetur. Post haec, melle, butyro, axungia, salibus, et (et paulicaophis) pro  
 aequa omnium portione confectis, succo pitusanae ac passo inuolutis, ad tin-  
 ctum animal replebis, et die prima quinq; pillulas, sequenti septem, ter-  
 tia die nouem daturus ex more. Expensis autem his, nec ungere cum ui-  
 no et oleo tepesfacto desit industria, nam amarissimus morbus cum sit, ali-  
 ter non potest, nisi amaris potionibus solui. Contraria enim non nisi con-  
 trariis medicinis curantur. Potionem diapenten, sicut superius monstra-  
 tum est, non solum per triduum cum uino, sed per dies plurimos dabis,  
 ut tantum discrimen possit euinci. Quod si grauior tussis et strangulatio  
 urgebit, accipe fabam fractam sextarium unum, seui caprini uncias tres, allij  
 capita maiora tria, permixta decoques, et cum passo, uel succo pitusanae  
 hordeae et tepidum dabis ad cornu. Quod si tardius profecerit ista cura-  
 tio, ficos siccae pondera duo diligentissime tondis in pila, saenugraci sex-  
 tarium

ariu[m] decoques, quousq[ue] aqua ad medietatem ueniat, post colabis, et foenugraecum in mortario cum sicu conteres, alij quoq[ue] uncias tres contundes similiter in mortario, et tam rutae quam apij fasciculos ternos: quibus oib[us] pariter mixtis diligenter tritis, addis dracontij uncias duas. Aqua in qua foenugraecum coctum fuerit, superfundis, potionemq[ue] facias quae per cornu possit effluere: quam etiam tuſſientibus uel uulsis aut ruptis animalibus per triduum dabis. Sequens remedium ad aridum morbum: Inter nares iumenti scalpello secabis, et aquam frigida[m] per fistulam latam eius ori suppones, naresq[ue] ipsius assidue diebus plurimis merges, ut suspirium distabescat in aqua. Potionem quoq[ue] ei quotidie dabis huiusmodi: Succum ptisanae cum seuo caprino decoctum, sextarium unum, sulphur, uinum, thus quoq[ue] masculum aequis ponderibus deteris atq[ue] commisces: ex eo coctearia singula diebus singulis cum ptisana permixta defundis ad cornu. Cum autem coeperit esse ualidior, de ceruice sanguinem detrahes, additoq[ue] aceto animal perfricabis.

## Cura morbi subtercutanei. Caput .XII.

**S**ubtercutaneus morbus, cum humor pestifer intra corium et uiscerum commeat, hac ratione curandus est: Fistulam ei facies uel cauterium, inter armos eius et uentrem loco consueto ad mensuram incisa cute, die sereno, et si spacium est, luna minuenta, indis ut mos est, per quam ois e uisceribus humor educitur, coloris aurei uel crocei, languoris tunc corruptus. Quae si minus traxerit, radicem herbae tytimali eodem uulnere inseres septem diebus, quae residuum uirus educat. Est et aliud remedium. Radiculam quam quidam consiliginem uocant, quam pulmonaceam, quam multo medici frequenter et bubulci utuntur, in pectore aialis hac aegritudine laborantis eatenus pones, ut acuto cuprino circines locum. Postea corio perforato radiculam inseris, quae ibidem sponte tam diu permanebit, quousque cutis quatenus cuprino signata, in putredinem sit uersa, et a toto corpore ad illum locum humor trahatur, et per uulnus emittatur. Hinc potionem diapenten superius designatam, cum uino ueteri optimo, per triduum, uel si necessitas erit, per dies plurimos dabis. Apium quoq[ue] uiride, et baccas.



## ARTIS VETERINARIAE.

Et baccas lauri. uel istae res si non inuenirentur, lauri et cucumeris syluatici folia, per partes minutissimas concides, hordeoq; miscebis, ut animal sicut est potione diapenton, ita ex cibo sentiat medicinam. Huic tamen aqua tepidam cum farina hordeacea uel triticea dare te conuenit, et in loco tepido stabulare. Nam frigus humoris augmentum est, et reumatis. Cibum quoq; magis siccum quam uiridem in hac passione debet accipere, et exerceri uehementer, ut sudore siccetur humor infestus.

### Cura morbi articularis. Caput XIII.

**A**rticularis morbus his declaratur signis: Claudicabit alternis pedibus, modo prioribus, modo posterioribus, et quasi tumor eide in articulis circa coronas, uel certe in genibus apparebit. propterea quod pestilentia morbi corruptus sanguis, neruos et uenas implet, et laedit atq; debilitat. Huic sanguinem primo de ceruice, hoc est, de maxillari uena detrahes: quem aceto acerrimo permixtum, per totum animalis corpus induces, ita, ut illa loca, quae uexata sunt, diligentius ungas. quod creditur sanguis emissus est corpore, et corpori rursus cum aceto impositus, uita morboosa siccare. Quod si uel in genibus, uel articulis se morbus ostenderit, de eisdem locis sanguinem detrahes, cui adijcies cretam cinnamiam, id est, albam, urticae libram, tres sextarios aceti, cimini triti libram, resinae frixae libram, picis liquidae libram, salis communis pugillum, steracis bubulinum recens quantum creditur posse sufficere: ex hoc ubicunque tumor apparuerit diligenter saepius illinies. De palato specialiter sanguinem detrahes, ne contagio caput occupet. Ab armis quoq; deplendum est, si in prioribus pedibus claudicatio apparuerit. Vel certe de coxis aufertur sanguis si à posterioribus coeperit claudicare. Dabis quoq; ei potationem aduersus omnes morbos probatissimam: Centauream, absinthium, peucedanum, serpillum, sagapinum, betonicam, saxifragam, aristologiam rotundam. haec omnia aequis ponderibus tondes diligenter et cernes: si febricit animal, cum aqua: si uero non febricit, cum uino optimo dabis, ut singulis diebus per sextarium uini uel aquae tepidae cocti praedicti medicamentis singula maiora coquearia plena et cummulata commisceas, et per fauces diges

Potio probatissima  
contra omnes morbos.

ces digerat, ut amaritudinem morbi herbarū amaritudo compugnans possit expellere.

Cura morbi farciminosi. Caput .XIII.

**F**arcimosus autem morbus à similitudine farciminis appellatus est: quia uelut per fistulas quasdam inter cutem & carnem corruptus humor emanat, & per totū corpus collectiones plurimas facit, et alijs uelut inuentibus aliæ rursus nascuntur. Sed passio licet contagiosa sit, facilius tamen inter principia curabitur. quia interna eorū adhuc sana sunt, sed corruptus humor ex morbo, inter cutem & carnem uersatur. Huic tamen in initio tantummodo, antequā incipiat marcescere, aut in fine, cum iam bene fuerit reparatū, detrahendus est sanguis. Nam in media passione si flebotomia uti uolueris, ægrotū animal nequāq; curabis. Sed collectiones quascunq; fecerit, inuri rectis cauterijs cōuenit: & ut efficacius prosint, cuprinis cauterijs est utendū. quæ uulnera pice liquida, admixto oleo & melle, curantur. Potiones catharticas, uel nimis amaras debet accipere, id est, diapenten cū uino, sicut superius dictum est, quæ ad omnia genera morborū animalium efficaciter prōdesse consuevit. Præterea radices ebuli lib. i. infundis per trid. i. sextarijs tribus uini optimi. Post semiunciā optimi aloes, cētaureæ unciā. i. opopanacis unciā. i. diligentissime teres, & de illo uino, in quo ebuli radices infusæ fuerint, sextariū. i. mittes, & tepidum per cornu dabis. Quā mensuram triduo custodire te conuenit, ut etiā per uentrem huiusmodi catharticis potionibus digeratur humor infestus. Quē exercere in cursu, quousq; ad plenum sudorem ueniat, sæpius conuenit: & curatum obseruatione prædicta, in pascua mittes, ut diu noctuq; æstiuo tēpore sub diuo & libero aëre pascatur, quatinus & uarietate herbarum oblectatus, & solis calore siccatus, rursumq; noctis aura & rore contactus, facilius digerat morbum.

Cura morbi subrenalisis. Caput. .XV.

**S**ubrenalisis morbus, ut periculis plenus est, ita ad intelligendum aptissimi inuenitur. Nā renes iumentis occupat atq; dissoluit. Propter quod animal in primis partibus alacre, posteriora trahere consuevit. Huic hac ratione succurratur: De utroq; latere, uel de femore incisis competenti loco uenis, copiosus sanguis emittatur, qui acri aceto permixtus, p omne cor-

B pus, &



## ARTIS VETERINARIAE

pus, & precipue super renes animalis inducitur. Potionē notissimā diapente ad cornu per os debet frequēter accipere. Sed & per anū calidissimis speciebus clysterij ingestioe curandū est. aloes uncia .i. pyretri uncia .i. euphorbij uncia semis, pulegij bene trita uncia .i. baccarū lauri uncia .i. castorij semis uncia, seminis sinapis uncias .i. salis triti hemina: hæc oīa diligenter cōtusa in tres diuides partes, & diebus singulis cum aqua, in qua surfures tritici decocti fuerint, tepida, sicut curæ exigui ratio, quasi singulos semisextarios clystere per intestinum aīalis infundis, ut calefactis intrinsecus renibus, resolutus humor possit per uentrē cū stercore euiti. Præterea lumbi ipsius oleo laurino uino calido permixto confricandi sunt uehementer & sepe, ut de foris & intrinsecus acerbissima passio possit euinci. Cauteria quoq; renibus imponuntur, ut uis morbi ignis ardore siccetur. Danda quoq; est potio octo specierū decocta, cuius in articulo morbi fecimus mentionem, quia in omnibus efficaciter prodest.

### Cura morbi Elephantiosis. Caput .xvi.

**E**lephantiosis morbi causa superius est indicata, cui talis est adhibenda medicina, ut non extrinsecus uredem uel uulnuscula ipsius curare tentemus. Nam morbus refugiet intus, & penetrabit uiscera, ac periculum gignet. Sed primū de matrice tollendus est sanguis, & acri aceto cōmiscendus; ac toto inducendus est corpori. Postea de palato, & si uires permiserint, de cæteris locis quæ morbus infestat, pro modo & tempore minuendus est sanguis, & cum aceto rursum imponendus. Pulli autem à matre depulsi, & ad stabula religati, præcipue solent hūc morbum incurrere. quia digestio cibi, qua in pascuis utebantur, primæ exercitationis aufertur, & nondū ad residendū robusti, ad præsepia stare coguntur. Elephantiosi morbo, & omnibus malis passionibus non solū diapente, cuius experientis indubitata sunt uires, & sine quo Mulomedicus mutilus est, sed hæc quoq; potio præparanda atq; seruanda: Mirre trigonitis librā .i. thuris masculi lib. .i. corij malipunicij selibrā, piperis uncia .i. croci uncias 6. acacie rusæ selibrā, absinthij pontici selibrā, serpilli libram .i. betonicæ librā .i. centaureæ libram .i. sagapini uncias .i. saxifragæ uncias 6. tensedoni uncias 6. hæc omnia tusa & bene cribrata cū melle optimo decoques, et in uase uitreo uel stagnæo recondita seruas  
bis nam

bis. nam per uetustatem magis ualet. Ex quo med. camēto singula cochlearia cumulata singulis animalibus morbidis cum sextario aquae calidae & tribus uncijis olei optimi permixta per triduum dabis. Vbi proficere coeperit, cum uino optimo & oleo dabis (sicut dictum iam est) cochlearia singula cōtinuis diebus. Ex qua potione nō minus q̄ diapēte quolibet morbo correpta aīalia liberātur. Pulli tamē beneficio etatis euadūt facilius: sepe incurati moriūtur.

Causae & cura generales morbi mallei. Ca. XVII.

**E**A quae ad morbi mallei execrabilis curationem pertinebant, abundanter constat exposita, sed tanta uis ipsius morbi est, ut nihil expediat omitteri. Nam gregum in pascuis funestus interitus, animalium quoq; in stabulis mortes innumerae ex ipsius contagione proueniūt, & ab imperitiis uel negligentibus curam, aut diuinæ iracundiae imputatur aut fato. Deniq; sicut supra declaratū est, ab uno animali incipit ipsa perniciēs, & festināter ad ceterorū transit exitiū. Propterea semper sunt separāda in qbus suspitio tanta pestis coeperit apparere, usq; eo, ut etiā corpora mortuorū aīaliū quae ab illo morbo intercepta fuerint, exporiāda sint ad ea loca, p̄ quae aliorū aīaliū transitus non sit, & profunde obruēda sub terra. Nā & uiuorū, quae corrupta fuerint, & mortuorū foetidissimo odore, sana primo iumenta corrumpūtur ac pereūt. Cuius morbi causas plurimū Mulomedicinae authores reddere tentauerunt; asserentes ex nimia lassitudine cursus uel saltus uiolenter extorti, aut ex calore aestatis, uel frigidityte hyemis, aut si uolētes emittere lotium, non sinantur, uel si hordeum sudantes acceperint, et si post cursum calidi biberint, et si plena uestica uel post potum cogantur ad cursum, aut foenum comederint, hordeumq; corruptum. Ex his uel huiusmodi causis malleus morbus consueuit generari. Vitanda q̄dem sunt ista omnia, nā ex his periculosa aegritudines iumentis sepe proueniūt. Malleus autē morbus ex acri corruptione praecipue descendit. Nā Austro & Africo uento flantibus, interpositis annorum spacijs, recursu (ut asserunt) catastematis, sicut certo tpe hoēs pestilentia corrūpuntur, sic aīalia ille aer corrumpit & perimit. Vnde probatissima & plures necessariae sunt potiones, quae aduersum tantā uim praestare ualeāt salutis auxiliū. Quarū p̄tē supiori iā pagina cōprehendimus, p̄tē ex oībus autoribus collectas cōsequēter adiūximus. Remediū p̄ficiēs ad omnes



# ARTIS VETERINARIAE

ad omnes generales morbos. Semen cucurbitae aegyptiacae. i. colocynthidem  
quantum acetabulum capiet, frangis & conteres, addita uini optimi hemina  
una, quod diligenti agitatione permixtum linteolo colabis, & per dextram iu  
menti nares infundes, ut peruenire possit ad uiscera. Quae compositio ad dy  
senteriam plurimum prodest. Alia quoque uilior, sed non minus apta cura  
tio est; Radices cucumeris syluatici uirides contundes, et in aqua nocte una  
macerabis, deinde sublatas contundes & colabis, ex quo succo tria cochlearia  
cum nitro trito permixta, cum uino, si animal sine febre fuerit, tepesfacto quoti  
die faucibus ingeres, ita ut septem diebus continuus curare non desinas. Ni  
trum quoque bene tritum, & cucumeris syluatici radices minutatim concisas,  
addita hemina uini tepidi, in hordeum bene purgatum animali languenti ad pa  
bulum infundas, ut non solum potum, uerum etiam pabulum medicamentum tem  
peratum faciat ad salutem. Item aliud. Radicem ebuli, & radicem urticae  
aequis ponderibus minutim incisas, & infusas in liquamine optimo macera  
bis, colabisque per linteum. ex quo mensura unius oui tepesfactum per nares ani  
malis triduo digeres. Consequenter ita facturus, ut iumentum quod morbum pa  
titur, hordeum cum apio & cucumere syluatico minutatim inciso, semper acci  
piat, contusumque ipsum agrestem cucumerem, & aquae sufficienter admixtum,  
bibere cogatur. Laudatur etiam haec potio Herbae sauinae librae .i. trixan  
ginis uncias tres, centaureae uncias 2. aristologiae uncias 4. baccarum lauri un  
cias 4. murrinae uncias 4. omnia contundes & cernes, & in puluerem minu  
tissimum rediges, & cum necesse fuerit cochlearium magnum plenum cum sexta  
rio. i. uini tepesfacto faucibus tedeantis infundes. Haec quoque aduersus omnes  
morbos medicina succurrit, si quatinus uires patiuntur, interpositis diebus,  
cum praescriptis minutionis obseruantis, primo de ceruice, post de palato, &  
in quibuscumque locis se (si humor) ostendit, ut si in facie de capite, si in primis  
partibus de armis, si in posterioribus de coxis sanguis est auferendus, & cum  
aceto miscendus, ex quo animal perfricetur. Cui haec per triduum potio dabi  
tur: Pannaces radicum uncias tres, yringij radices ponderis tanti (yringion  
autem herba melior est, quae in littore uicina marinis fluctibus nascitur, car  
do syluestri pene similis, flore galbino, cuius eruendae sunt radices, nam lon  
gus penetrare dicuntur) feniculi quoque seminis uncias 3. aloes uncia una semis  
contusa & cribrata in tres particulas diuidentur, & cum fracti & moliti tri  
fici sunt

ad. si morbus.

tici farinæ sextario candenti aqua misceatur, et ad cornu per fauces triduo animali infundantur. Pelagonius aduersus omnes morbos efficacissimū puluerem credit esse, si pullū ciconie nondum adhuc stantē, sed iam plumas habentem uiuum in cacabū mittas, et gipses, perustumq; uapore furni, in puluerem redigas, et tritum uirio uase custodias, grāde, cumulatūq; cochlearium cū uini sextario animalis faucibus infundas, donec recipiat sanitatem. Chiron uero Centaurus præter alias cōpositiones quæ iam relatæ sunt, asserit catulum lactantem uiuū in aqua feruenti missum ac depilatū ita decoqui ut ossa separentur à carne: quibus diligenter ablatis, eius caro cum aqua in qua decocta fuerit liquamine optimo uino ueteri et oleo et pipere cū melle condita usq; ad sextariū debere seruari, ac singulis animalibus binas cotylas tepesctas, donec ad sanitatē perueniant, diebus singulis dari debere per fauces. Caput quoq; hædinū, omne sūq; pedes depilatos ad caldarium eadē ratione, quæ catulū, excoqui, ablatisq; ossibus condiri, et binis cotylis per diē in potione per cornu sæpius datis, animal morbidū liberari. De gallo quoq; gallinacco albo, eadem quæ de catulo obseruanda demonstrat. Radicem quoq; herbæ tithymali decoctam cum uino dulci dare morbidis animalibus suadet. Ei quoq; animali, quod profluuiū attico cœperit laborare, ita ut uiridis ei uel pallidus per nares humor erumpat, ex lotio humano aut arietino duas cotylas cum uino, et cyatho olei rosacij putat esse miscendas, et pnares, quæ humorem funestum egerunt, digerendas. Quam curationē et pulmoni sanitatem, et naribus siccitatem præstare confirmat.

Potio anniuersaria physica. Caput .XVIII.

**P**ro physico autem et anniuersario remedio tradidit ulpicum beticū uel allium maius, quod quidam gallicum uocāt, capitella singula cū singulis semiuncijs sagapini, et singulis cyathis olei optimi diligenter trita, singulis aquæ heminis oportere misceri, et heminas singulas per caput animalium dari octauo Kalendas Iulias, hoc est in initio caniculariū dierū, septimo et sexto; quo factō, trinis potionibus stagnata, ut dicuntur animalia armentina uel domita integro anno à morbo intacta seruari.

Compositio suffimētōrū cōtra malleū. C. XIX.

**A**duersus morbū malleū, cuius diuersæ sunt species, quæ in potiōibus

B 3 tam per



## ARTIS VETERINARIAE

tam per os quàm nares dirigendis, uel clystere, quæq; in cauterijs uel flebotomo faciēda sunt declaratū est, sed restat alia nō minus necessaria efficaciorq; curatio, quæ suffimentorum genere & odore præstatur. Nā cū ipsa tabes ex corrupti aëris fœtore nascatur, et usq; in pulmonē & uiscera penetrādo descendat, nō minus austeritate odoris, q̃ potionū amaritudine cōsueuit expelli. Pro numero itaq; aīaliū eliges locū humilē ex omni parte clausum, in quo induces aīalia iā egrotātia quæ curare desideras; uel adhuc sana & separatim quæ nō uis morbi contagione perfundi. Origanū asium, mentam, asphaltum, peucedanum, castoreum, & opopanacem, æquis ponderibus permisceas, & exinde quantum tribus digitis cleuare poteris in carbones uiuos mittas, animaliumq; os & caput super fumum tenebis, ut austeritas odoris per os & nares intrinsecus ingressa, omnia compleat, & ad pulmonē usq; penetrādo perueniat, & præstet animalibus medicinam.

Alia compositio uehementior ad lustranda animalia,  
quæ & fascino tollit. Caput . x x .

**E**st & alia compositio suffimentorū ad morbos prohibendos, sumptuosior quidem, sed putatur utilior. Sulpharis uiui libras 2. bituminis iudaici lib. 1. opopanacis uncias 6. achanti uncias sex, galbani & castorei, yreos crudi aī uncias 6. salis armoniaci uncias 2. salis capadoces uncias 3. cornu ceruini, lapidis gagatis masculi, lapidis gagatis fœminæ, aī uncias 3. lapidis ematitis, lapidis sideritis, lapidis argeritis aī uncia 1. equuleos, id est caballiones marinos numero septē, caudas marinas, ungues marinos aī numero septem, uuae marinæ uncias tres, medulle ceruinæ, cedrei, picis liquidæ aī pondera tria, ossa sepia numero vij. auri semiunciā, ballucæ siliquā: hæc uniuersa cōmixta atq; succēsa, odore suo morbis tā hoīm q̃ aīaliū resistūt, et dæmones fugāt, grādines prohibere, et aērē defecare dicūtur. Sed si memoratos lapides aut inuenire nequiueris, aut enormitate pretij ab emptiōe cessaueris, reliqua efficaciter prosunt.

De ratione flebotomi. Ca. x x i.

**M**edicina oīs aīaliū, uel si uerū querimus, etiā hoīm, nisi rationē curationis ante cognouerit atq; prædixerit languētibus piculū, errabit frequenter. Exposita enim curandi ratio, & cum genere congruēs passionis

passionis, indubitāter praeſtat auxiliū. Ideoq; pluribus mēbris ac morbis generale remediū diligenter oportet exponi, qđ praeſcipue in ſanguis detractioe conſiſtit, ſi rationabiliter pro tempore & uiribus animalū, et pro æquitate pfecti mulomedici adhibeatur industria. Qui ſi ignarus fuerit huius ratiois, nō ſolū p detractioē ſanguinis nō curabit, uerū etiā piculū iumentis frequētiſſime generabit. Nā cum uita uirtuſq; aīantiū conſiſtat in ſanguine, rursus tēpeſtiue detractus ſanguis corpori praeſtare adſolet ſanitatē. Cuius rei talis redditur ratio. Sanguis enim ciborū humorūq; indigeſtioe corruptus, p mēbra diſcurrit, et languorē dolorēq; aut uniuerſo corpori, aut ceriſ qbusdā partibus conſueuit inferre. Nam per cōſtrictionem neruorū, uenarūq; tensionem, inflatio, indigeſtioq; generatur: quæ tenſura (ut ita dixerim) corporis aliter laxari, niſi p detractioē ſanguinis nō poteſt. Vnicū enim cōpendiū atq; remediū eſt, corruptionē illā quæ nocet, et quaſi infeſta tabe ægri tudinē uel periculū gignit, cum ſanguinis ipſius uitioſa parte detrudere.

Quę diligentia adhibeatur in ſanguinis detractioe. Caput .XXII.

**H**inc pleriq; ueris tēpore quotannis de ceruice iumētis ſanguinē demere, & ſic in herbā mittere neceſſariū putāt, ne ueteri corruptoq; ſanguis nouus admixtus natura caleſcēs, debilitatem, ualitudinisue periculū faciat. Veteres autē, prudētioreſq; authores abſq; neceſſitate depleri animalia uetuerunt: ne conſuetudo minuēdi, ſi tempore aliquo facta nō fuerit, ſtatim intra corpus morbū ac ualitudinem generet. Rectius ergo eſt minoris ætatis animalibus & bene ualētib; ex nulla parte corporis ſanguinē detrahi abſq; palato: de quo aſidue tā minoribus, q̄ maturis detrahendus eſt humor, ut caput, oculi, cerebrūq; releuētur. Maturis uero aīalibus nō incomodū eſt pulſare uenā cū mītiūtur in paſcua. Illa tamē in omnibus, q̄ deplendi ſunt, conſeruanda eſt conſuetudo, ut pridie quā uena pulſetur, ſubſtententur leuioribus & parcioribus cibus, ut per diaſtema compoſito corpore ſint, non turbato per indigeſtionem. In ſolo autem æquali ſtatues iumentū, ceruicemq; illius loro cinges, quo ſtriſtius ſuper ſcapulas tangatur, ut uena poſſit ab aliquo clariuſ intueri. Tunc ſpongia cum aqua uenam ipſam lauabis, & ſæpe deterges, ut altius emineat. Pollicem quoque ſiniſtrę manus



## ARTIS VETERINARIAE

manus interius deprimes, ut non ludat, sed tumidior atq; inflator uena red-  
datur. Consequenter iuxta præceptum artis, uel animalis ipsius positionē,  
sagittam dari calibis exiges cotibus bene acutatam. Obseruabis quoq; ne al-  
tius imprimas manum, et gulam atq; gurgulionem rumpas, et arteriā præ-  
cidas. Hoc enim uitæ consuevit inferre periculum. Percussa uena, foenū uel  
farraginem ad edendum apponas animali, quatinus agitatione maxillarum  
per uenā melius erumpat sanguinis impetus. Cū aut niger uel corruptus hu-  
mor egeretur, uel coeperit manare purior, statim iumentum tolles à cibo, et  
imposita fistula uenæ plagam astringes. In plaga uero pitaciū imponas, ut di-  
ligentius claudat, licet quidam utantur et creta. Deinde in tenebroso loco  
et calido statues iumentum, et farraginem si tempus est, uel foenum molli-  
mum dabis septem diebus ac noctibus. Aquam etiam offeres, ut si uoluerit bi-  
bat. Sed trititia farrago hordeaceæ præfertur: quæ si defuerit, hordeaceam  
dabis. Memento etiam quod ea melior sit, quæ uicinior marinis fluctibus fue-  
rit. Propter quod uentrem facilius soluit, humoremq; deducit. Pulsata etiā  
quocunq; loco uena, omnem sanguinem diligenter excipies, et aceto oleoq;  
permixtum, uel alijs medicaminibus quæ ratio deposcit, animalis ipsius cor-  
pus perunges, præcipueq; illum locū, ex quo detractus est sanguis, et qui  
esse putatur in causa. Constat enim, naturali quadam ratione atq; beneficio  
(ut quidam aiunt) ipsum sanguinem, cum superfusus est languentibus mem-  
bris præstare medicinā, uitiumq; siccare. Quam curatiōis sollertiā nō opor-  
tet omitti. Præterea interpositis diebus post flebotomū animalia producuntur  
ad solem, et sanguis detrahitur eis de palato. Despumantur etiam tertio gra-  
du à dentibus caninis, quos oportet suspendi altius propter sanguinis fluxū.  
ita ut ea die molliſſimis cibarijs utantur et fursure. Sequentibus aut diebus  
non ex integro hordeū consequantur, sed à uilibus incipiant, et ad consuetu-  
dinem per singulorum dierum augmenta perueniant. Consequenter tepido  
die ducantur ad mare uel fluuiū, diligenterq; loti tergantur. Vino quoq; et  
oleo in sole perungendi sunt diligenter, et confricandi, ut corpora eorum ca-  
lescā aut repellant, aut perferant perfricationis iniuriam. Quibus perſe-  
ctis equinobiles tunc demū ad labores cursusq; itineris reuocentur.

**S** Castrata animalia nō deplenda. Ca. XXIII.  
Sciendum est præterea, castrata animalia nunquam oportere depleri  
cause

causa herbae, quae iam partem uirium cum testibus amiserint, et si depleta fuerint, uehementius eneruantur. Hinc est enim quod asinis non detrahendus est sanguis, quia naturaliter minus habent sanguinis, gracilioresque sortiti sunt uenas.

Admissum facientes non deplendos. Ca. XXIII.

**A**dmissarios etiam equos flebotomare non est opus: partem enim uirium et sanguinis in coitu natura digerit. Si tamen ab admissura cessauerint, nisi annis omnibus herbarum tempore depleantur, incidunt in caecitatem, quia id quod coitu digerere consueuerant, declinat in oculos.

In quibus passionibus, & ex quibus locis sanguis auferendus est. Caput .XXV.

**N**unc ne quid relinquatur ambiguum, in quibus passionibus, et ex quibus locis sanguis emitti debeat indicabimus. Morbidis et quibuscumque totum corpus in causa est (sicut febrientibus, unde infra dicendum) de matrice detrahendus est sanguis. Cephalargicis autem, arpiosis, insanis cardiacis, caducis, freneticis, bistrutitijs, sicardicijs, rabiosis quoque modo praecipitur de auriculis sanguinem demere. Verumtamen melius est de temporibus, quae in dextra ac sinistra sunt parte, detrahatur, id est, sub cauitura temporum tribus digitis ab oculo interpositis inferius uena perquiritur, et ex utraque emittitur sanguis. Eis uero quibus suffusio contingit oculorum, uel cetera uitia quae oculis nocent, inferiores uenae sub oculis posita, quae descendunt sub angulis oculorum inferioribus, quatuor digitis inferius quam oculi sunt, inciduntur. Quibus quidem fastidium inhaeret, uel arteriarum uel faucium tumor, uel praegratio capitis, de palato auferendus est sanguis. Quibus autem pulmo est in causa uel iecur, uel caetera quae his uicina sunt membris, de pectore minuendus est, ex uenis quae posita sunt in dextra ac sinistra, ubi brachio la coniunguntur, et flexura fit cum armus plicatur. Quibus quidem armus est in causa, de brachiolis sanguis minuatur; quae uenae posita sunt interius, ubi centuriae, id est, musculi brachiolares sunt, sex digitis superius quam genu, tribus uel duobus digitis inferius quam centuria. Haec uenae sagitta percutiuntur, sed caute modesteque tangantur, propter debilitatem animae, quia haec commixtae sunt nervis. Quibus autem articuli in causa erunt, uel si articulus inferius uel intortus fuerit, uel aut aquatilia habuerit, uel quiduis simile in articulis contigerit, de

C subcirro



## ARTIS VETERINARIAE

Subcirro sanguis subtrahi debet: quæ uenæ posite sunt inferius quàm articuli tribus digitis sub coronâ. quæ uenæ cum summa cautela tangendæ sunt, quia articularum coniunctæ sunt neruis. Creciaco uel si basim mouerit, de coronis rectis tollitur sanguis.

De his quibus sanguis in ungulam tollitur, alis, qui ungulam cogunt uel eiecerint, quomodo sanguis tollatur. Caput .XXVI.

**Q**uibus aut iumentis uel suffusionis uitio, uel p uoluntate ex cruciata ungula fuerit, uel quibus remorata basis longi temporis claudignem fecerit, eiusmodi curatiõe sanatur. Componis omnem ungulam quasi ad uiuũ, ad lidesq; uirantiũ, hinc suffraginẽ illius alligatã lino uehementer stringes, totũq; simul ungule solũ in circuitu scalpelletur, et circũgyrabis ut à corona ungula subleuetur ex pte, tũc circũcisorium inferes inter unguẽ et solũ, et cũ bene elimpidaueris, suffraginẽ soluis, et inuenies de calcaneo uenas fluere, et cũ sufficiẽter effluerit cruor, sale pfricabis, postea aceto et oleo inunges, et linteolis munies diligenter. Sparciã calciare curabis, ut post egestionẽ humorũ ungula reparetur. Huiusmodi aut curã nũq; nisi singulis pedibus adhibere debebis, ut in tanto dolore aĩal duret ac stet. Si aut in alio pede similis est causa, cũ in illo q; prius curatus est, firmiter aĩal stare coepit, tũc eũ elides, et ut dictũ est, simili obseruatõe curabis. Si uero in his causis aĩal cremare uolueris, semissabis illud hoc modo. Compones ungulam eius ad uiuũ, et contra uenã addita sagitta ptũdis, ut possit sanguis acõtizare p solũ quod sagitta ptuderit. Si aut modo sale fricabis, oleoq; et aceto, linteolisq; munibis, dumtaxat singulos pedes, ita ut portare se possit. hi plane q; semissantur nõ eliduntur

Epistomicis, uulsis, colicis, strophosis, & qui morbo subrenali tenentur, unde sanguis tollendus est. Caput .XXVII.

**E**pistomicis, uel qui morbo subrenali leduntur, uulsis etiam, colicis, et quibus uenter frequenter dolet, de cauda sanguis emittitur, licet melius puteatur propter huiusmodi causas ortas de uisceribus debere sanguinẽ tolli. Quod si de cauda tollere uolueris, sic facies: Erige et resupina caudã ad lumbos

lumbos, quatuor digitis ab ano ubi pilos nō habet cæde caudam cū tabula ali qua nō ponderosa, quousq; se uena demonstraret, & in caudæ media diuisura quatuor digitis ab ano sagitta percuties uenam, ut acontizet sanguis, post de cursionem fasciola colligabis. Cum autem de uisceribus emittere uolueris, sub inguibus de dextra sinistraue in singulis femoribus eminentes uenas medias sagitta pcuties, post decursionem sanguinis cretam impones, sed caute, pro pter uicinā mixturā neruorū. Si laccæ in gambis fuerint, aut aliqs dolor co xæ uel gambæ, sanguis detrahatur gābis: sunt enim uenæ à uisceribus descen dentes p gambas interius, quas medias propter uicinā mixturā neruorū cau æ transuerso flebotomo percuties, & post decursionē fasciola ligabis.

## De ratione foci atq; cauterij. Caput .XXVIII.

**I**N animalium curis ac medicinis duplex remedium authores esse uolue runt, Minutionem sanguinis, per quā constricta laxantur, & Vstionem cauterij, per quod laxata firmantur. Sed cū flebotomi ratio euidenter ui deatur exposita, Cauterij quoq; licet nouissima cura sit, apicēda uidetur utili tas. Nā adustio laxata cōstringit, inflata attenuat, humectata desiccatur, coagu lata soluit, fārcinomata præcidit, ueteres dolores emēdat, alienatas corporis partes ex qualibet causa ad statū suū reuocat, sup naturā excreſcētia, subla ta, et adusta crescere nō patitur. Nā cū candēre ferro rupis cutē, uitiū oē con coquitur atq; maturatur, et beneficio ignis dissolutū, p forāmia q̄ facta sunt ef fluit cum humore. atq; ita sanatur passio et tollitur dolor. Post q̄ cicatricibus clausis, cōstrictior et robustior redditur locus, ac prope insolubilis cutis. Sci endū uero cuprina cauteria plus effectus ad curandū habere q̄ ferrea. Præ terea si in capite morbus est, inuritur ceruix: si subrenalis est, lūbis ignis ad hibetur. Interdū aut puncta infiguntur, interdū ad similitudinē linæ candēs deducitur ferrum, aliquando uelut palmulæ fiunt. In hoc enim laudatur Mu lomedici ingeniū, si ita animal cauterio curauerit ne deformet. Pro locis aut in quibus est passio, & pro pellis æstimatione cauteria uehementius imprimuntur aut leuius. Memoria aut retinendū est, † quassaturas, emota uel extorta, aut alis † fracturas eiecta de locis suis, uri penitus nō debere. nā ppetua debilitas cōsequitur. sed me lius est cū locis suis reposita fuerint, & ligaturis diligētius cōmunita, atq; ita nature industrieq; beneficio cōroborata, colasticis unctiōibus et malagmis, C a postremum



## ARTIS VETERINARIAE

postremū causticis eadem percurare ad spem perpetuae sanitatis. Quod specialiter ad nonendum est, ne Mulometi i festinantes, dū loco curare cupiūt, animalia debilitent aut leformēt, cū flebotomis, potionibus, unguentis, syringis, medicaminibusq; diuersis ante sit temptanda curatio, & si nihil profecerint, ad extremum ignis adhibetur.

### De passione & curis februm. Caput .xxxix.

**Q**uacumq; passionēs plus iumentis periculi inferre consueuerunt, & difficilioribus obscurioribusq; indigent curis, has primo amplectimur libro, ut et facilius reperiatur quae in exordiis ipsius occurrēt, et legentibus fastidium nō possint adferre. De curis quae prima sunt. Febrētibus itaq; aīalibus primū cōuenit subuenire. Nā nō amplius q̄ triduo caloris uim sustinere posse creduntur. Intra quod si curata nō fuerint, moriuntur. Oportet igitur prius passionis huius signa causasq; praedicere, & mox medicinas exponere. Febrēns iumentū deiectū caput ē terra alleuare uix poterit, erit oculis apertis, labijs demissis, tristitia turpis & grauitas totius corporis insequitur, testiculi tumidiore laxius pendent, membra caloribus feruent, uenae uehementi pulsu saliant, anhelitusq; creber & calidus, tussis asidua, incessus nutans, fastidium cibi, bibendi cupiditas, uigiliae iuges. Causa autē huius passionis ex magno labore et fatigatione est, si negligentia cōsequatur. Interdū est nimio, aut perstrictione uehementi, uel ex cruditate ciborū, aut sudoris subita infrigidatione, uel ex feruore hordei nouelli euenire cōsuevit. Curatio autē ista solennis est. Continuo sanguinem eis de facie, uel de temporibus, aut palato oportet emitti, ab omni esca prima die penitus abstineri, scēni optimi aut herbae uiridis subinde pusillū offerri oportebit, & quiescere etiā ab omnibus rebus, & etiā sequestratū temperato tpe, et inambulationibus leuibus aīal cōmoueri, calidis quoq; locis cooperitū stabulari. Cū coeperit melius esse, herbam minutatim concisam porrigito, quae si defuerit, hordeū maceratum, ablatisq; suis folliculis tufum in modum ptisanae paulatim offeratur et frequenter exigui.

### De lassitudine quae uidetur febribus similis. C. xxx.

**P**lerumq; autē equi ultra uires ad cursum coacti, aut ponderibus praegratiati, ac sudore defecti, similia febricitantibus signa demonstrant.

Quo.

Quos sic intelliges: Oculi sublachrymantes erunt, et tanq̃ subfusi sanguine, præterea spiritū crebrius agitat, scœnumq; fastidit, et de posterioribus pedibus melius se sustentabit. nā primos quasi subitius tardius ponit.

## De febribus internis. Caput .XXXI.

**Q**uod si febris interna fuerit non facile aīal dormiet, et quotidie deterius fiet, interdū furunculos in dorso uel in lateribus habebit. Scias eum à morbo qui superius disputatus est malleus, detineri. Cui lotiū aliquot dierum tam hoīm quā arietum per nares infundes. Et sic potiones quæ de isto morbo superscriptæ sunt, dabis.

## Si in autumno febricit. Caput .XXXII.

**S**i autem autumnī tempore cœperit febrē iumētum, statim de ceruice sanguinem detrahes, uel gradu tertio de palato; post herbæ trixagnis sextariū, draganti, rosarum atq; uinciā i. in pila lignea pistabis, cernesq; subtiliter, ex aqua cū mulsā et oleo potionabis, atq; ita restitues sanitatem.

## Si in æstate febricit. Caput .XXXIII.

**S**i autem æstatis febrē cœperit, totū sudabit, sataget salientibus uenis, mincturam et naturam simul dimittere, ad terrā transuerse ambulabit. De coxā media quatuor digitis ab ano uenam ingris, et ex ea sanguinem detrahes. Si autē nō inueneris, de ceruice tollendus est. Cui hanc positionem pro tempore dabis: Herbam portulacæ plenā manū tundis, succūq; eius cū dragante et thure, et succo rosæ campanæ mulsā addita offeres, positionem non satis grandem ne plus quā oportet infrigides: quia cum quasi plene car. at simul et deflectione sanguinis calore priuatur.

## Si hyeme febricit. Caput .XXXIII.

**H**yeme uero si febricit, supradictas species aridas contūdito, diligenterq; misceto, et per sinistram narem dato, sanitas consequitur. Febricitantibus autē hæc potio utilis traditur: Mannæ thuris uncias ij seminis, yrisillyricæ uncias 6. piperis uncia i. baccarū lauri, seminis apij atq; uinciā i. cū passo potionabis. Item post detractionē sanguinis de matrice aut de palato sic potionabis febricitantē: Hyssopi librā unam, abrotani uncias 6. la



## ARTIS VETERINARIAE

Etis caprini sextarium, amili cyathum, olei optimi uncias 3. herba urciolaris succi cyathum unū, misce cū ceteris, & per cornu faucibus infunde, erit salutare remediū. Item alia potio. Lactis sextariū, olei cyathos 2. croci scrupulū 1. mirræ 2. appij seminis cochleariū plenū, miscebis piter, et dabis ad cornu. Hyeme farinā triticeā cū aqua tepidā, estate aut farinā hordeaceā cū aqua frigida dabis in potū. Si febrient mensuram nō des, iliorū aut loca cauterio inurenda sunt, & usta curāda. Item alia potio. Lactis caprini heminā, amili cyathū, oua 4. olei cyathū, succū herba urciolaris quotidie potū dabis usq; ad sanitatē. Item unctio qua pficandi sunt febrientes. Rosæ librā, olei ueteris librā 1. aceti heminas 3. lactis caprini librā semis, portulacæ seminis et nucis amaræ añ uncias 6. menthæ uel rutæ quantū expedit. s. teres et com-misces, et tepēfacto utere, ita ut diutissime confrices contra pilū, et in loco tepido unctū aīal coopertūq; statues.

Item potio alia si hyeme febrierit.

Gentianæ unciam unam, aristologiæ, hyssopi, absynthij, abrotani, singulorum unciam unam, caricarum uncias 6. seminis apij uncias tres, rutæ fasciolum 1. omnia in cacabo cum aqua decoques ad tertiam, & cum nigrescere uideris, coctum est. Exinde uini heminam misceto sicut superscriptum est, & per cornu faucibus infundito.

Si ab indigestione uel pletura febriat. Ca. xxxv.

**S**I quod iumentū ab indigestione uel pletura febricitauerit, naribus spiritum ducet, & illa frequenter agtabit, anhelitusq; erit feruēs et aridus, spinam facilius flectet, nam qui ex perstrictione febrit, rigidus est: quia calor membra dissoluit, frigus astringit. Ex pletura igitur febrienti, copiosus sanguis emittitur de ceruice, nares aceto perfricātur ut sternutet sepius. Venter quoque febrientis si durior fuerit, per anum iniecta manu, stercus extrahatur, à cibo abstineat, paucissimum potum per interualla suscipiat, & unctum superscripto medicamine, diuq; fricatū, loco stabit calido horis tribus aut 4 cooptū, postea ad ambulandū producelur, nihilominus inuolutū.

Si ex uulnere oris aut faucium febriat. Ca. xxxvi.

**S**I quando ex uulnere aliquo uel suppuratione oris aut faucium nascitur febris, de temporibus, nec non etiam de palato detrahendus est sanguis.

De max

De maxillis quoq; siue de ceruice, & ad postremū quicunq; locus febrienti doluerit, ex eodē cum mensura sanguinem oportet auferri. Quod si cibū penitus respuerit, farinā aquā mixtā ad cibi instar faucibus eius infundes. Offas quoq; de passo facies iustæ magnitudinis, et septenas cū oleo digeres, ut possit habere substantiā. Ita deniq; febrienti ualis est, ex quacūq; pte detractio sanguinis fiat, si consideratis uiribus animalis mēsurā seruetur. Nā ut emissus rationabiliter releuat, ita enormiter ablatuſ euirat uel turbat.

De coactiōe. i. de nimia lassitudine. Cap. XXXVII.

**C**oactio in animalibus passionis est nomen, ex qua ægritudinū diuersa genera nascuntur, ideo sic appellata, quod ab iniuria uel labore uel ex coactione contingat. Quoties enim lassū aīal fatigatione itineris, uel nimietate cursus, uel magnitudine ponderū, non studiose resouetur, uel æstate sitire, uel hyeme algere compellitur, uel certe penuriā sustinet cibi, aut hordeo nouo, aut fœnopessimo lædatur. et p dies aliquot circa curā eius nulla adhibetur industria, & sic totius corporis compago, & interiorum uiscerū dispositio per iniuriam & fatigationem uitatur.

Quæ genera ægritudinū ex coactiōe nascent. C. 38.

**E**x qua coactione hæc passionū genera nascuntur. Ex perstrictione enim sunt epistomici, podagrici, phthysici. Ex æstu autē euenit grauedo febris, insania, capitis dolor. Ex sudore oritur tumor in cruribus, suffusio in pedibus, febris, spasmus, et tussis. Ex humore quoq; q de naribus profluit, passio aptissima declaratur. A' cerebro enim uel à capite uenit multa pituita crebra et spissa. A' pstrictiōe erit humor tenuis, aquaticus, & frigidus: ex qua re fiūt coriagrosi & epatici & phthysici. A' colibus & glandulis & arterijs humor erit candidus & uiscosus, ex quo euenit fistidū & faucium præfocatio & synanches. A' pulmone autē humor crassus, sanguinolentus, & maleodoratus emanat, colore pallido. Ex qua causa fiūt peripleumonici, uomicosi, ortomici, et phthysici. A' morbo autē malleo uenit humor multus et crassus & pallidus. Ex qua re fit ortomicus, profluuius atticus, et suspiriū articulare. A' iecore humor erit liuidus, yricus, et uiridis, et tabidus, non ualde crassus, neq; olidus. Ex qua re fiunt sciatici, hydropici, febricosi. Ideo autem signa passionum causas que diuissimus, ne ingratus

error



# ARTIS VETERINARIAE

error noceret, & facilius euidens doctrina curaret. Absyrtus huiusmodi de  
coactionibus prodidit medicinas: Si equus, inqt, coactus de uia uenerit, oculi  
eius intro abibunt uel uersabuntur, spirat calidum frequenter atq; suspirat,  
& auriculæ huius ac reliquū corpus extensum erit. Cuius talis est curatio:  
ut parū hordei accipiat, fœnūq; nō multū. Potio aut huiusmodi preparabi  
tur, hysopi, abrotani atq; uncia 1. sampuci uncias 6. fœnugræci librā unā, li  
ni seminis pondo duo: hæc omnia tusa & cribrata in cacabo nouo cum sex  
aqua sextarijs infundis, addisq; nouem duplices ficus, quæ cū ad partē dimi  
diam decocta fuerint, uniuersa conteres atq; liquabis, præterea uini ueteris  
optimi sextarios tres, mellis heminā, piperis triti drachmā adijcies supra  
scriptis, rursumq; feruere facies oīa, ex qua calidā potionē plurimis diebus  
dabis, quæ mirifice iuuare consueuit. Si de labore itineris suffusio pedū for  
te prouenerit, caue ne sanguinem calido detrahas, sed requietū pausatūq;  
flebotomabis, huiusmodi beneficio potionis usus: Turis masculi drachmas  
2. foliorū caprifici librā, grana piperis 25. fermēti uncias 3. croci drachmā:  
Omnia bene trita in tres partes diuides, & expausatū iumentū triduo cum  
oleo potionabis & uiuo: si hyems fuerit, tepida os ablues, æstate frigida: si tar  
dius, aut non recte ambulat, † sulphurē & resinā calentē ungulis imponis,  
als † fursurē non semel tantū, sed aliquoties donec rectus incedat. Si uero ista nō profue  
rint, semissabis eum ut de ungulis sagitta contactis cōpetenter profluat san  
guis, & uulnera traumatico curabis pharmaco. De laxis hæc signa erūt:  
toto corpore grauabitur, & posteriora crura quasi inligata habebit. posca  
itaq; & pulegio nares eius & totam faciē fouebis, panem & merū dabis  
ut manducet, offere sūq; ei lactucas uel gramen diligenter lotū atq; cōsum,  
consequenter daturus huiusmodi potionē, Succū ptisanæ, passum, oua, oleū  
rosatum, quæ omnia pariter mista per triduū dabis, ita ut hordeū primo de  
corticatum siccaturūq; māducat. Præmonendū autem est, ne iumento ex co  
actionis iniuria laboranti pulses uenas calenti. continuo enim neruorū con  
tractio & debilitas cōsequitur. Oportet aut armos corū & genua uino cali  
do & oleo tepido suffundere, totūq; corpus mul'torū manibus diutissime cō  
fricare, & loco statuere tepido, mollia de siccato stercore uel de paleis strata  
præbere. Posteriorē pte flebotomo laxis nō oportet cōtingi, ne penitus euire  
tur. Qd si uenæ in cruribus tumēt, et plenæ sunt humore, de coronis sanguis  
auferatur.

## De diuersis passionibus uentris. Caput .XXXIX.

**N**on minus multæ & obscuræ ualitudines in internis animalium quàm hominum existere consueuerunt. Imò si uerum quærimus, propè pares atq; consimiles sumus. Nam animalibus quia rationales sumus, sola mente præstamus; corporis uero natura cõmunis est, maxime in doloribus. Dolorem uentris in iumentis Veterinorũ impitia putat facile posse curari, quod graue, nescit, Et ex uentositate, uel constipatione uitiũ, torsiones uocāt & interiorũ incisiones. quibus aut præcantationes anicularũ more, aut aliud quod quasi physicũ remediũ adferre conantur. Cũ quid enim intrinsecus iumentis dolere inceperit, statim se aliudũ & uolutat, et solius uentris creditur esse causa, cũ plures & difficiles sint passiones, ex quibus dolor & uolutatio illa contingit. Et nisi singulis pro causarum genere competens medicina sub uenerit, sanitas redire non poterit. Efficaciter autem curare potest nemo, nisi qui internarum ægritudinum signa rationesq; cognouerit.

## De aqualiculo. i. stomacho. Caput .XL.

**P**rimus uenter ipse, qui aqualiculus nominatur, totius corporis obtinet dominatum, in cuius capacitate cibis potioq; miscetur, ac per digestionem naturali calore decoctus, separatis humoribus, partẽ ad substantiã membrorũ conuertit in sanguinem, & partem in urinas resoluit, partemq; secũ trahit in stercora. Quod si loca illa præstrictio longi temporis uiciauerit, intestinorum dolor, & corruptio digestionis necessario sequitur. Nã pars humoris coagulatur ex frigore, & fit conglutinosa in præcordijs, atq; in intestinorum partibus, quæ ducuntur ab aqualiculo usq; ad collum, qd appellatur t̄ enteron, retinetur & hæret, quod latine ieiunũ dicitur, per quod in collũ humor pessimus transit, & interclusione sua cibũ nõ patitur ad interiores partes more solito peruenire. Hinc etiam tortura & extensio uentris dolorq; cũ magno periculo generatur: quæ passio græce emphragma, latine præoccupatio dicitur.

## De colo &amp; coli dolore. Caput .XLI.

**E**xoritur & alia causa doloris asperior, quæ græce chordapso appellatur, cum præclusa intestina uiscerũ uento sumõue se urgente colligat.

D usque eo



## ARTIS VETERINARIAE

usq; eo, ut aquā, & cibum, & stercus an. mala etiam interdū reuomere cogātur. Præterea ad similitudinem hominū propter inflatōis iniuriā, coli quoq; dolore uexantur, propter quam necessu arē animalia diuerse uehementerq; uoluēdo rumpuntur, quod curari iam non potest, & ideo moriuntur.

### Cura longanonis & ilei. Caput .XLII.

**I**Lei quoq; uitia ex persfrictione huiusmodi humoris nascuntur: qui cum intestina maiora & præcluserit, & in eorū sinibus stercore coeperit detinere, prohibet illa ad catachlytum longanonis decurrere (Longanon autē intestinum uocatur, per quod stercus egeritur) tunc uenter crassius uel præclusionē ipsa intra uiscera increfcit, ac sibi met dolores morsusq; excitat uehementes, ex quo iumenta se proijciunt ac uolitant, extensisq; pedibus calcitrant. sed per impatientiam se sæpe iam iactando uentus increfcit, & mixtus stercore usq; ad intestina descendit, nec iam, ut supra, rumpitur, sed iumento qđ in uitium, quod ileos uocatur (ex eo, qđ intestina locis suis exclusa, aīal quasi eiles facere faciunt) inciderit, ea ualetudo periculosa est, nisi cum celeritate subueneris. Huiusmodi autem sunt adhibenda remedia: Aqua calida renes animalis diutissime fomentabis, foenumq; cum calida, ut uapor magis penetret, frequenter apponis, post cilicij diligenter absterges, oleum uetus & picem liquidam, & oleum laurinum musces, calefacies, & diutissime persfricabis, ita & testiculos eius perunges, & in auriculas calidum medicamen infundes. Tam diu autem fricabitur, ut sudare incipiat & uentū emittere, ex quo spes ostenditur sanitatis. Quod loco calido statues, ac sagis cooperies diligenter, hanc daturus quotidie potionem; Piperis grana quinquaginta, petroselinum quantū quatuor digiti comprehendunt, cimini alexandrini tantūdem, cimini quoq; africani tantūdem, semen apij, murrā, nepitā, trixaginē, æquis ponderibus, quibus ad dimidiam omnium partem nitrum admiscere te conuenit. Quæ omnia bene trita ex uino calido & oleo æquis ponderibus, et melle quantum satis fuerit dabis. Hæc autem potio & calefacit, & uentrem resoluit. Quod remediū sit tardius subuenerit, saccellos cum sursure calentes per totum dorsum & renes animalis imponis. Clysteriabis etiā ex aqua calida & oleo, quod cum sale & melle afro, et nitro, ouoq; miscebis, & ita uentre laxato & stercorea emittuntur & uentus. Quod si clyster defuerit, sal bene tritum

tritum & mel coques, pastillosq; longos & duros facies, & in anum iu-  
menti interius immittes. Quæ res omnem spurciciem humoris intus stantem  
abstrahit, & ad sanitatem perducit, nec est aliud qd magis ualeat subuenire.

Causæ & curæ strophii. Caput .XLIII.

**S**unt animalia quibus assidue uentris impendit dolor, qui strophus ap-  
pellatur, & hac ratione concipitur. Interdum sudor animalium uel ni-  
mio cursu, uel labore profluens, in internis reidat intra uentris intesti-  
norumq; compaginem, q; punctiones doloresq; præstat interius. Et cū totū à  
labore cessauerit, ac refrixerit corpus animalis, cessat & dolor. Sed cū à la-  
bore calefieri cœperit, rursus exoritur, & ideo strophus uocatur. nā frequen-  
ter uolutatur, et cū surrexerit, terrā pedibus tundit, & interdū terrā quasi  
manducare conatur, et iacēs uidetur quasi pusillū regescere, et surgēs citius  
ambulare se cogit. Sed ex hac iniuria frequēter uolutado uerū sibi nui-  
rit intrā  
secus, et fit tympanites, ex quo et iumentū rūpitur, et præsens uitæ piculū cō-  
sequitur. Quittū si in ppetuū auferre uolueris, paracenthesis facies sic: qua-  
tuor digitis sub umbilico ueretū uersus, medio climate uētris sagittā iniicies  
ut non solū cutē, uerū etiā periconiū ipsum aperias. Periconiū enim dicitur  
membrana quæ intestina omnia continet. Ad mensurā autem cū magna cau-  
tela periconium aperies, ne intestina lædas, & præsens discrimen inferas.  
Post exempta sagitta subijcies fistulā centimalem, quā Mulomedici portare  
cōsueuerūt, minutis foraminibus multisq; pertusam, p quā foras humor ema-  
nat, quē suscipies in uase, et inuenies limpido lotio similē, tolles uero non mi-  
nus sextario. Hæc cura etiā illa animalia sanabit, quæ uel stupida uel macra  
sunt ex coactiōe longi tps, qbus nitrū diligenter cribratū in hordeū dabis &  
aspergere, qd omnes asperrimos humores et spurcicias corporis purgat. Sed  
strophosis dabis potionē superius declaratā plurimis diebus. Etiā acopo ter-  
matico renes eorū, totūq; corpus pungen, et diebus aliquot à pluribus facies  
cōfricari. Ad ultimū renibus eorū causticū induces, et sic reuoces ad laborē.

De lūbricis, collicis, tincis, et pediculis. Cap. XLIII.

**I**ntolerabilē dolorē intestinis inferūt lūbrici, uermes, et tineolæ, quas alij pe-  
diculos appellāt. Nā coagula et aqualiculū itus erodūt et uulnera faciūt.  
ex q; necessitate aialia macrescūt, et coriagnosa fiūt, et sine fetore nō erūt

D 2 & celer



## ARTIS VETERINARIAE

& celeriter moriuntur. Huiusmodi passionis signum est, cū inuenitur humor  
 in ano sabæ coctæ similis: est nāq; sanies ex illis uulneribus quæ bestiola in-  
 trinsecus fecerunt. Ieiuna animalia ex hac necessitate uehementius torquētur.  
 Nā cū his deest cibus, magis uitalia consumūtur à uermibus. Hi nō sunt in-  
 flati, & tamen per dolore se uolunt, et in spinā se proijciunt, & caput sibi  
 intra pedes mittūt, & ostendunt doloris sui locū, dentibus illa sibi quasi scal-  
 punt, & rodunt nonnūq; lumbos, & caudam parietibus confricant. Cū ista  
 signa ostendere cœperint, & crebro clamare, hoc est, uehementer hincire,  
 scias eos iam morti esse uicinos. quibus adhibetur ista curatio: Olei uiridis et  
 amari sextarios 2. fasciculū absynthij pontici concoques. præterea nasturcij  
 seminis, santonici, coriandri seminis, radicū seminis, sinopidis pontici uncias  
 singulas, mirtis & foenigræci selibrā: hæc infusa et decocta in oleo illo facies  
 permanere, ex quo heminam olei, & aquæ tepide heminā dimidiam per cor-  
 nu dabis. quæ uirtus medicamentorū, & lenitas olei animala ipsa intus occi-  
 dit, & foras eijcit. Ex qua potione si per multos dies acceperit, p̄mixto nitro  
 tunso & castoreo, oēs lūbricos & tineolas & uermes discludit à corpore, et  
 cū stercore eijcit, & restituit sanitatem. Alia potio ad lūbricos, tineolas,  
 & cæcos: Santonici, absynthij pontici pulueris, lupini crudi, seminis nastur-  
 cij, scobis cornu ceruini, seminis radicū uncias ternas, sinopidis pontici pa-  
 stillos tres, pollinis crui uncias 3. uini austeri sextarios tres, olei hispani sexta-  
 rium unū, opopanacis uncia 1. seminis coriandri heminā: hæc omnia dilige-  
 ter trita decoques, & quotidie ieiunis heminas singulas dabis.

### De clysterijs ad curam lūbricorū & tinearū. C. XLV.

**S**ed quia pestes ipsæ sæpius ad coagula se conferunt, & potio quæ per os  
 data, ad loca ubi morantur rarius peruenit, ideo etiam per anum adhi-  
 benda sunt clysteria: aceti acerrimi sextariū unū semis, olei uiridis tan-  
 tumdem, opopanacis uncia 1. centaureæ uncias 2. absynthij pontici uncias 3.  
 santonici uncias 3. farinæ lupini crudi uncias 3. crui uncias 3. seminis rasan, se-  
 minis coriandri uncias ternas, nitri triti uncias 3. radicis capparis tunse un-  
 cias 3. hæc oīa decoques cū oleo & aceto, & per tridū singulos sextarios be-  
 ne calentes per anū de clystere diffundis animali. Memēto aut quoties per os  
 potione das, animal contra cliuū teneri debere, ut facilius quod acceperit ad  
 interiora

Interiora descēdat. Quoties autē clysteriabis, caput animalis in ualle statues, & clunes ad altiora conuerteres, ut quod per clysterem diffundis ad interiora perueniat. Diutissime autē post potionē in talibus locis animal retinetur, ut facilius necentur uel eijciantur pestes internæ. Ad cossos & lumbricos specialis potio. Herbe cameleontis radicem ex aqua ad tertiam decoques, et cū opopanax duabus uncijis misces, ac uini heminā, & ad cornu per sinistram uarem diffundis. Item alia ad lumbricos. Seminis coriandri quantū una manus cœperit friges, nasturcij quoq; seminis tantundē diligenter teres, quæ utraq; cū aqua tepida per triduum faucibus infundes. Ad matricis dolorem medicamen. Aloe, epaticū, masticē, castoreū, lauri baccas, amoniacū, uino & melle mittis in ollam, & bullita atteres, dabisq; ad bibendum.

## De iumentis calculosis. Caput .XLVI.

**S**I quod iumentū calculosum fuerit, hæc signa monstrabunt: torquetur, gemit, extendet se ad conatum mingendi, stillat ueretrū eius guttis materiam, modicum mingit & plene mingere nō potest, quod quotidie patitur. Sed huiusmodi uitii teneris ætatibus plerunq; contingit, quod sic inuenies: Manū ad interiorē partē mites, et à ceruice uesticæ sub ipso ano ad hip pocentaurū uersus palpabis digitis, & calculū ibi inuenies. Quod uitii difficile curatur. Nam interdū nimio conamine prope ipsum anū uestica disrumpitur, & lotiū per anū emittit, & quasi aquæ adsimilatur. Ideoq; missis digitis per foramen quod fecerit, longanoni & ipsius uesticæ aculeo calculum eximis, & curabis clysterijs collecticijs, id est, quæ glutinent, ut foramina illa sanentur. Potionabis autē illos duritica potione. Difficilis autē huiusmodi cura est quia uim patientes ex corruptione uesticæ tortione moriuntur.

## De emphragma. Caput .XLVII.

**Q**Uodcumq; iumentum ex qualibet causa inueneris uolutare, oleo manum perunges, & ipsum anū oleo satiabis: post quod manū in interiorē partem longanoni protendis, & si inueneris ipsum longanoniem clibano subtili patere, scias eū strophū pati, & continuo stercora eijciet paulatim ad manū, quibus egestis cito noueris animal percurandū. Si uero manu iniecta longanoni præclusionē inueneris, & stercoris mod cū, hoc est, duas aut tres pillulas squibala, et præfoctū longanoniem qua manus uix

D 3 introeat



## ARTIS VETERINARIAE

Introeat, scias eum emphragma pati et periclitari, & ideo curadi sunt remedia medicaminibus superscriptis, & clystere utendum, quod indignationem intestini resoluat & curet.

### De ileo. Caput .XLVIII.

**S**i manum inieceris, & totum uentrem tympano similem pertractando senseris, scias eum ileum pati, & cito periclitari. Et ideo unctionibus calidis fricandus est uehementer & diu. Si uentum coeperit emittere, tunc in illo spes incipit esse uiuendi.

### De dolore uentris. Caput .XLIX.

**I**tem si manum miseris, & inueneris ualde pati longanone, & stercora non multa habere, nec esse uehementer inflatum, scias ipsum uentrem dolere, id est, aqualiculū. Cito regescere solet, si celeriter supradictas et calidas accipit potiones, diligenterque ex calido unguento fuerit perficatus. Si moram curationis non abstuleris, difficile euadet. nam ex hac passione chorda psum fieri consuevit.

### De dolore coli. Caput .L.

**S**i manum miseris, et similiter longanone pati sine ulla inflatione repereris, & non frequenter uolutantem se, sed proijcientem subinde in dexteram partem, et quasi extensionem interdum ad conamem minutionis, inuenies duriciem in intestinis ingentem cucurbitae similem, scias animal coli dolore uexari: & quanto durius intestinum inueneris, tanto pluribus diebus dolore cruciatur. Ex qua causa raro periclitantur, & dolent biduo, uel triduo, uel si minus quinq; diebus. Sed quanto inueneris molliorem ipsum locum, tanto uelocius mitigabitur dolor. nam quodam stercora in longanone repies, et erit salubris curatio si post clysterem uel potionem multum stercoris adsellatus ediderit. quo facto statim intestinum, quod a colo induratum fuerat, & tumebat, non apparebit redditum sanitate.

### De dolore uesicae. Ca. LI.

**S**i currendo fuerit inuersa, similis dolor sine inflatione ex cursu iniuria & nimietate frequenter emergit. Huic manum subijcies in anum, & depressas usque ad ueretrum uersus, ubi inuenies uesicam eius loco plenam, quam a dextra & sinistra parte leniter adducis sursum ad anum uersus cum oleo, et unctionem

tionem prouocas, tã diu donec urinã faciat: liberabitur piculo de quo animalia difficili'e euadũt.

Colli & lũbrici qua cura tollant ad manũ. C. LII.

**S**VM alij qui assidue dolorem uentris patiuntur sine ulla inflatione, neque uehementer se uolunt, & quasi in cursu prouocant, aliquando se proijciunt, et ilia sibi corrodunt, et quasi scalpunt. In huiusmodi dolore manũ imitis in longanone per circuitũ et interiore per plurima loca diligenter tentabis, & inuenies uermes collectos exisse in singulis locis, et intestinũ pertundere. Ex qua necessitate nascitur dolor periculosus. Digitis euelle eos, qui quidem uix euelluntur, & ipsa tibi in manu coheret ut difficile eos proijcias. ex qua ratione multa iumenta caudam frequenter parietibus fricant, propter morsum uermium, quos purgare de longanone studiose debebis, & potionẽ dare per plurimos dies eam, quẽ ad lumbricos faciat, ita omnes uermes, quos cossos appellamus & tineolas purgabis. Similiter etiam qui lumbricos habent in uentre, sic eos conuenit mederi: Pice liquida & oleo calido renes & totam spinam cum dorso perfricari oportet tam diu, donec calefactionem patiantur ex manibus. & auriculas eorum et anum ex oleo complebis, uentrem quoque & testiculos perunges, sal tritum cum melle decoctum mixtum in anũ subijcies, animal potionibus crebris ambulatiõibus potionatũ exercebis. Si ex hac ratione non mitigauerit, clysteriabis eũ calida, & afronitro et sale. Præterea super renes & dorsum sacculos calidos ex fursure plenos imponis, & tam diu innouabis calefactionẽ donec uentum reddat. Potionatũ eũ potionibus supradictis & clysterijs ut à discrimine liberetur.

De syncopatis & confixis. Caput LIII.

**S**I quod iumentum syncopauerit his agnoscitur signis: Pigrius ambulabit, tanquam suffusione constrictum. Inter suffusos autem & syncopatos hæc distantia est, ut suffusi licet tardius à terra leuent pedes, flectentes crura incedere solent: Syncopati autem uniuerso corpore constricti & rigidi sunt, etiam cum se proijciunt, non sine genũ & toto corpore decidunt. Hi uero non sine febre erunt, cibum & potum fastidiunt, magis iacere cupientes. qui cum se leuare uoluerint, impetu conantur exurgere, sed propter dolorem omnium membrorum tardius exurgunt. Quod contingit ex magno



## ARTIS VETERINARIAE.

ex magno labore & cursu nimio, uel ex humoribus nimijs, cū plurimus sudor fatigatis neruis mēbra conquasset, unde syncope, id est, defectio nascitur: cuius ista curatio est. Calida cum flore sceni cū somētabis à spina, armis, et renibus, tepefactumq; diligenter tergendō siccabis, Tunc uino et oleo calido totum perūges, diutissimeq; confricabis: coopertū deinde locis calidis statues, molliq; substernes ut dormiat. Quod cū per triduū feceris, hac potione refuebis. Mirræ uncias 2. dragāti uncias 4. croci drachmas 4. meliloti uncia unā, anagallici librā, thuris masculi pondus unū. quæ omnia cribrata in puluerem rediges, ex quo duo coclearia cū aquæ calidæ hemina, & mellis coclearibus duobus, et olei rosei cyathis duobus potionē dabis plurimis diebus, donec sanum fiat. Etiam uulsis hæc potio, & tensione laborantibus prodest.

De his qui sanguinē per nares mittūt. Ca. LIIII.

**S**æpe ex cursu nimio iumēta sanguis infestat, & per nares emanat, quod difficile ueluti ruptis uenis labore & calore subsiringatur, & uelocissimam etiam postulat medicinā. Succū itaq; uiridis coriandri, uel si defuerit, porri satiui succū in naribus periclitantis infundes. pollinis triticeī drachmam, thuris puluerizati drachmā 1. anagallici uncia 1. amyli semiuncia, commixta & in tres partes diuisa, ex uino nigro suffundes naribus, sanguinemq; præcludes.

De infestatione sanguinis. Cap. LV.

**A**nimal sanguine laborare hæc signa declarant: Oculi tumbunt, frigidum erit corpus et ceruix, tristitia fastidiumq; iungetur, difficileq; curabitur. Hac ratione curandum. A cibo potuq; temperabitur, somniq; indulgebatur copia mollibus stratis, tum de matrice quantū ratio postulauerit sanguis auferatur, nec potionis cura cessabit. Succū itaq; uiridis coriandri, uel si defuerit, porri sectiui, trixaginis quoq; & centaureæ uiolæ, & nitri æqui ponderis mixtura inungitur. Ex quibus tunsis atq; cribratis diurnū cochleare ex hemina aquæ tepidæ infundatur faucibus. Quæ potio humores & sanguinē imminentesq; alios morbos purgat, phibet et sanat.

Quæ adhibēda diligētia, ut aīalia sana perdurent. C. LVI.

**O**bscuras difficilesq; curas prima fronte digestimus, consequenter ad cætera pergentes: sed necessarium credimus ostendere rationes, ex quibus

quibus incolumitas iumentorum incorrupta seruetur. Melius enim est diligēti studio custodire sanitatem, quā aegritudinibus pręstare remedia. Diligēs itaq; dominus stabulum frequenter intrabit, & primū dabit operam ut stratus pontilis emineat, ipsumq; sit non ex mollibus lignis, sicut frequenter per imperitiam uel negligentiam euenit, sed roboris uiuacis duricia & soliditate cōpastum. Nam hoc genus ligni equorum ungulas ad saxorū instar obdurat. Fossa pręterea quę lotium recipiat, deductoriū debet habere cuniculum, ne pedes iumentorum redundans urina contingat. Patena, quę appellatur, hoc est, alueus, ad hordeum ministrandū sit munda semper, ne sordes aliquę cibarijs admisceantur et noceant. Loculi pręterea uel marmore uel lapide uel ligno facti distinguendi sunt, ut singula iumenta hordeū suum ex integro nullo pręripiente cōsumant. Nam sunt animalia ad edendū auidiſſima, quę cū celeriter propria deuorauerunt, partem consortis inuadunt. Alia uero naturali fastidio tardius comedunt, & nisi separatim acceperint, uicinis rapientibus macrescūt. Cratis, quę iacca uocatur à uulgo, pro æquorū statura nec nimis alta sit, ne cū iniuria guttur extendatur, nec nimis humilis, ne oculos contingat aut caput. Luminis plurimum stabulo infundi oportet, ne tenebris assueta, cū producuntur ad solem uel caligent, uel aciem uisus imminuant. Acstate in apertis locis tā noctibus quā diebus iumentis libera aura pręstanda est. Hyeme uero tepere debent stabula potius quā calere. nam nimius calor licet custodiat pinguedinem & reficere uideatur, tamen indigestionem facit, & uehementius nocet naturę. Propter quod diuersa genera morborum ex uapore ipso animalibus generantur. Si producuntur ad frigus insolitum, statim aegritudinem ex frigoris nouitate percipiūt. Curandū est pręcipue, ut siue foenum, siue paleas, uel manipulos uicię pro regionum usu uel copia animalibus prębeas, incorrupta ac bene olentia & munda mittantur. De hordeo quoq; non erit sollicitudo dissimilis, ne aut puluerulentum sit, aut lapidosum, aut mucidū, aut uetustate corruptū, aut certe recens de areis sumptum, & ipsa nouitate pręferendum. Aqua etiam limpida ac frigida, etiam perhennis ac profluens ministranda est. Nā quicqd importunius fluit, uirus non admittit. Bis in die multorum manibus animalia sunt toto corpore confricanda: quę cura & mansuetudinem docet, & laxata cute pinguedinis pręstat augmentum. Hordeū quoq; non semel nec bis, sed pluribus portioni

E bus prę



# ARTIS VETERINARIAE

bus præberi conueniet. quicquid enim paulatim acceperint, legitima digestione conficiunt. Quod uero semel et enormiter sumpserint, cū simo indigestū integrūq; transmittunt. Vicinum uero stabulū conuenit esse loco arido, stercore uel paleis mollibus adopertum, in quo ante potum animalia uolunt. Quod exercitium & sanitati proficit, & ægritudinis uitium commonstrat. nam quoties animal, aut non solito more se transuoluit, aut omnino detrectat accumbere, scias illud ex tædio laborare, & ideo separari debere, atque curari. Ad quod opus quoque plurimum iuuat, si sæpius & cum moderatione animalia sedeantur. Nam imperitia rectoris & incessus eorum debilitat, & mores, præcipue seruorum impatientia, qui absentibus dominis ad cursum equos uehementer stimulant, & non solum flagellis, sed etiam calcatribus cædunt, dum aut inter suos uelocitatem cupiunt experiri, aut cum alienis uehementi obstinatione contendunt, nec reuocant aliquando currentes, nec temperant. neque enim de damno domini cogitant, quod eidem contingere gratulantur. Quam rem diligens paterfamilias summa seueritate prohibebit, et iumenta sua idoneis & moderatis hominibus, scientibusq; tractare committet. Post sudorem quoque si æstus sit, pusca os ablui conuenit: si hyems, muria. Vinum quoque & oleum faucibus infundi oportebit ad cornu, æstate frigidum, hyeme tepidum, ita ut hyeme meri sextario, olei unciae tres, æstate autem duæ tantummodo misceantur. Nec conuenientium potionum debet cura cessare. nam languor, macies, & tussis, & interiorum dolor facile submouetur, si sulphuris uiui semiuncia. i. 3. 12. myrræ 3. 4. redactos in puluerē, ouoq; crudo imixtos cū hemina uini optimi pos dederis. Est alia sumptuosior, sed accommodatior potio ad oēs morbos, quæ et celeriter reficit et cū intrinsecus purgauerit, curat oēs morbos, tussim ueterē, phthisicos, uulsores, et quæcūq; uexata sunt in operis. Ptisanæ sextariū 1. seminis lini heminā, scenigræci heminā, croci uncia 1. acronē salsum porci pinguis, uel lōgano, uel si porcina defuerint, caput hædinū depilatū, cū pedibus suis, et cordubis intestinorū mūdis, hyssopi fascēs duas, cochleas germanas xv. bulbos xv. ficus duplices xx. rutæ fasciculū 1. baccarū lauri cū uirēt sextariū, dactylos xx. allij capitata tria, seui caprini uncias 6. pulegij sicci fasciculū; hæc oīa purgata leniterq; cōtusa decoques in aqua cisternina, donec acron ille, uel certe caput hædi liquecat et dissoluatur ab ossibus. propter quod assidue aquā refundis

fundis ne cōburatur, sed seruēdo pinguescat, uel succus ipse pinguior efficiatur. Post hæc diligentissime colabis ad colum, tū draganti uncia 1. in tres diuīdes partes, ita q̄ exinde in unā potionē missurus es pridie infundas in calidū ut inturgescat. tunc addis passi sextarios 3. et tribus diebus sigulos sextarios dabis, oua numero sex, († indie secundo olei rosati oua plena nūero 2) butyri uncias 3. (In die tertio) anagallici uncias 3. amyli uncias 3. pulueris quadrigarij selibrā, lomenti fabæ selibrā. Quæ oīa misces, ut dictum est, æquis ponderibus p̄ tridū diuides, et ieiunū aīal potonabis, et horis aliquot deābulare facies, usq; ad septimā, a cibo abstineatur et potu. Animalia uero macie attenuata, nō absq; studio diligenti reuocantur ad corporum firmitatē. Nā oleo ueteri uinoq; permixtis, et tepēfactis in sole, per totum corpus unguntur, et contra pilum multorum manibus perfricantur, ut et nerui mollescant, et cutis laxetur, et sudor erumpat. Quo factō cooperta in pontili strato collocantur. Et si hyems fuerit, condita cū semiuncia appij seminis triti, et olei tribus uncijis calefacta p̄ os ipsius oportet infundi. Si æstas fuerit, absynthiū uel rosatum cū 4 scrupulis croci, et duabus uncijis olei frigidū p̄ os similiter debet accipere. Quorū si nō suppetit copia, uinū simpliciter conuenit præberi cū cæteris. Præterea eiusmodi species tpe hyemis cū hordij modij 4 misces, fabæ sextarios 8. tritici sextarios 4. ciceris sextarios 8. fœnigraci sextarios 4. erui sextariū 1. et si meritū equi uel facultas domini suppetit, uux passæ et nuclei sextarios singulos. quæ omnia sollerter cōmista cū fuerit, unū modiū in aqua mundissima pridie debes infundere, et paululū mane siccare, ex quo equo semimodiū ante prædiū, ei semimodiū ad uesperā dabis p̄ plurimos dies in loco optimo. uiginti uno die ita stabuletur ut intrinsecus bibat. Quod si ultra modum sagina prouenerit, ne pletura noceat auferendus est sanguis a matrice. Præterea graminum radices, quas aratrum frequenter euellit, studiose collige, et quā potueris longas minutatim concide, hordeoq; cōmisce, et quotidie præbere nō dubites. Aestate uero, excepto eruo, species illæ quas dixi, pro estimatione mensuræ ferragines adinuicem præbeantur, hoc est, hordei uiridis plures maioresq; fasciculos, tritici uel ciceris uel fœnigraci minores et pauci. Quæ oīa cōtusa oportet apponi. Præcauēdū tamē ut in lōgiore uestitōe uel itineribus, iumētis urinae copia nō negetur. quæ res nō sine piculo plerūq; differtur. Pedes quoq; eorū post uia erundi sunt diligēter, ne quid luti

E a uel sord



# ARTIS VETERINARIAE.

uel sordium in articulis basiꝑ; permaneat. Vnguēto etiam confricādi sunt, quo ungulae nutriantur, & medicaminis beneficio subcrescat quod itineris attriuerat iniuria. Alij capita tria, ruta ueteris fasciculum, aluminis scissi et cribrati uncias 6. axungiae ueteris pondo 2. stercoris asinini recentis manū plenam, quibus cōmixtis atq; decoctis domi, ut uolueris in itinere uteris ad uesperam. Præterea aliud quod ungulas nutrit & firmat. Picis liquidæ libras 3. absynthij librā 1. alij capita 2. axungiae librā 1. olei ueteris librā semis aceti acrioris sextarium unum, uniuerſa contundes & misces, et decoques, & ex eo coronas uel ungues animalium confricabis. De palatis singulis mensibus minuenta luna sanguis detrahatur. quo factō si qua est capitis passio releuatur, & ciborum fastidium tollitur. Oportet autem ferramento concisso-rio animalium soleas ramulasq; purgari, quod euaporat atq; refrigerat, & fortiores ungulas reddit. Si animal domi forisq; perfrikerit, calidioribus unguentis, quæ multa sunt, lumbi eidem confricentur & cerebrū, potionibusq; & pigmentis, & herbis quarum feruentior est uis, per os continuo oportet infundi, ut perfriktionis incommodum euincatur atq; pellatur. Nā si in uisceribus permanserit algoris iniuria, diuersos, periculososq; procreat morbos. Si uero dierum canicularium tempore aestu animal fatigabitur, uel aquis frigidis est perfundendū, uel in mare flumen ue mittendum. frigidis etiam potionibus recreandum, ut necessitati laboris aut temporis aptior medicina succurrat. Sed in equis non solum utilitas, uerum etiam decoris ratio seruāda est. Nunquam itaq; nisi necessitas passionis exegerit, de articulis refecandi sunt cirri. Naturale enim ornamentum pedum natura in illis conſtituit. Cericē etiam ipsam diligens debet ornare tonsura. Multa enim sicut currulibus, ita & sellaribus iumentis pressius colla radunt. Quæ res licet præstare creditur augmentum, tamen sub honesto seffore deformis est. Alij ita tondent, ut arcū uideantur imitari. Nonnulli Armeniorum more crines aliquos in tonsura ipsa per ordinem derelinquunt, Sed gratiora sunt quæ translata de Persis posterior usus inuexit. Nam media iuba ad omnē accurationem ex sinistra parte tondetur, à dextra uero omnino insecta seruatur. Et nescio quo pacto plurimū deceat, quia illud quod naturaliter laudatur Vergilius inuitatur:

Densa iuba, & dextro iactata recumbit in armo.

Quod si bicomis fuerit, ut uulgus appellat, mediæ ceruicis setas æqualiter oportet

V. Gesn. de quadrio animalium soleas ramulasq; purgari, quod euaporat atq; refrigerat, & fortiores ungulas reddit. Si animal domi forisq; perfrikerit, calidioribus unguentis, quæ multa sunt, lumbi eidem confricentur & cerebrū, potionibusq; & pigmentis, & herbis quarum feruentior est uis, per os continuo oportet infundi, ut perfriktionis incommodum euincatur atq; pellatur. Nā si in uisceribus permanserit algoris iniuria, diuersos, periculososq; procreat morbos. Si uero dierum canicularium tempore aestu animal fatigabitur, uel aquis frigidis est perfundendū, uel in mare flumen ue mittendum. frigidis etiam potionibus recreandum, ut necessitati laboris aut temporis aptior medicina succurrat. Sed in equis non solum utilitas, uerum etiam decoris ratio seruāda est. Nunquam itaq; nisi necessitas passionis exegerit, de articulis refecandi sunt cirri. Naturale enim ornamentum pedum natura in illis conſtituit. Cericē etiam ipsam diligens debet ornare tonsura. Multa enim sicut currulibus, ita & sellaribus iumentis pressius colla radunt. Quæ res licet præstare creditur augmentum, tamen sub honesto seffore deformis est. Alij ita tondent, ut arcū uideantur imitari. Nonnulli Armeniorum more crines aliquos in tonsura ipsa per ordinem derelinquunt, Sed gratiora sunt quæ translata de Persis posterior usus inuexit. Nam media iuba ad omnē accurationem ex sinistra parte tondetur, à dextra uero omnino insecta seruatur. Et nescio quo pacto plurimū deceat, quia illud quod naturaliter laudatur Vergilius inuitatur:

portet attondi, ita ut tam dextri quàm sinistri limitis continuata serie iubæ relinquantur intactæ. Quod nihilominus inuētum constat à Parthis, quibus consuetudo est equorum gressus ad delicias dominorum hac arte mollire. nō enim circulis atq; ponderibus prægrauant ut soluti ambulare cōdiscant, sed ipsos equos, quos uulgo Trepidarios, militari uerbo Tottonarios uocāt, ita edomant ad leuitatem, & quædam blandimenta uecturæ, ut Asturconibus si miles uideantur. In sicco itaq; æqualiq; solo quinquaginta passus in longum, & qnq; in latum plenis cophinis digeritur per ordines creta, ad similitudinē stadij, quod aulicibus asperius sit, tum difficultate coronam uelocitatis optantibus ingerit, in quo spacio cum equus frequētissime exerceri cœperit, in illos aulices necessario offendit, et priores & posteriores ungulas impingit, et aliquādo uel cedit, uel sic offendit ut cadere uideatur, post quod admonitus iniuria, tollit altius crura, & inflectione geniculorum atq; gambiarum molliter uehit. Præterea minutos gressus imitatur, ut inter aulices ungulas ponat, nā si extendere uoluerit, offendit in cumulum. Minutim autem equus ambulās commodius uehit, & pulchrius uidetur incedere. Potiones etiam hyemales æstiuasq; conscripsimus, quibus aut conseruetur sanitas perpetua, aut uehemens ægritudo pellatur.

Potio æstiuo tempore danda. Ca. LVII.

**D**um æstus incanduit, hæc potio animalibus commoda est, quia humectat & refrigerat: Croci uncia unā infundes in uino ueteri, draganti uncias tres infundes in aqua calida, his adiunges fasciculū uiridis porri .i. item fasciculum uiridis apij, herbæ portulacæ succi heminam, lactis caprini sextarios tres, oua septem, olei rosei librā, mellis uncias 3. passi sextariū .i. uini ueteris quod sufficiat. Ex quibus omnibus diligenter commistis atq; contritis, ad cornu per triduum sextarios singulos animalibus dabis. Alia quoq; refrigeratoria potio: Vini ueteris sextarium, olei librā semis, oua tria, succi coriandri cyathum .i. lactucarum cyathū .i. sollerter admisce, & in tres diuides partes, daturus per triduum iumentis æstuantibus salutare remedium. Tamen eo momento quo potionem defusus es, per singula animalia singulas heminas aquæ frigidæ & recens sumptæ potioni debes adiungere.

E 3

Potio hy



# ARTIS VETERINARIAE

## Potio hyemalis Caput .LVIII.

**H**Yeme quoq; potio ista præbetur: Vini ueteris sextarios 3. olei selibræ, pipis uncia 1. rutæ uiridis uncias 6. cerefolij uiridis uel seminis ipsius uncias 3. draganti uncias 3. seminis feniculi uncias 3. baccarū lauri uncia 1. mellis uncias 6 oua quot uolueris, et passi quantum usus exegerit.

## Potio in Autumno et uere præbenda. Ca. LIX.

**C**osti semiuncia, castæ fistulæ uncia, celticæ semiuncia, petroselini semiuncia, betonice semiuncia, glicericæ semiuncia, sagapini semiuncia spicæ indicæ semiuncia, saxifragæ, eupatorij, meliloti, irisillyricæ, aff semiuncia, centaureæ, gentianæ, aristologiæ longæ, aff uncia 1. amomi, aristologiæ rotundæ, aff semiuncia, scinoanthos semiuncia, asari, aloë, aff semiunc. murræ uncia, opopanacis, radice dracontæ, aff semiunc. croci uncia, draganti unc. 6. castorei uncia, absynthij potici fasciculos 2. hæc oia in puluere redacta ad. xij. aialia p triduum sufficere creduntur, ita ut cū uino optio digeratur.

## Potio omni tempore necessaria. Ca. LX.

**C**osti, meliloti, hyssopi, irisillyricæ, aristologiæ, sampsiuci, dracontij, asari, draganti, centaureæ minoris, marrubij, gentianæ, spicæ celticæ folia, æquis ponderibus misces, redactaq; in puluerem cernes. sed si æstiuā dare uolueris potionē, cōmises croci, mellis, et draganti quod sufficiat. Si autē potionē facies hyemalē, addis, piperis, appij seminis, et semis sinapis. utroq; autē tpe cū boni uini sextario plenum cochleare miscetur, faucibusq; animalū diffunditur.

## De difficultate urinæ. Ca. LXI.

**D**E urinæ difficultatibus ordine suo multa dicenda sunt, sed uiatorium istud, & physicum, & semper paratum te scire conuenit. Lutū ex cuiuscūq; equi lotio factū uino p̄mises, colatūq; p̄nares infundes, et confestim prouocat urinā. Itē allium conteres et in anū incies et ueretrū, mox egerit lotiū. Itē, Puluerem quoq; thuris cū ouo uinoq; p̄mixtū, addito succo apij et caulū, si potionē dederis, prouocabit urinā. Itē, Betas ac maluas ad tertiā decoques, ex qbus aquā calentē ad med ū sextariū cū melle cōmises, et p os digeres, proderit minctioni. Itē, Cimicē quoq; uinū in aurem equi nūt

equi mitte, et alterum supra naturam in ipso foramine quo mingit confica, facillimum certumq; remedium est.

## De stropho. Ca. LXII.

**I**Tinerum casibus subuenire cupientes, de pluribus pauca, sed manifesta libabimus. Nā aīalia sub seffore uel onere dolor uentris frequenter affligit, ut uolentur et procūbant. Semē itaq; rutæ syluestris uel hortēsis si illa defuerit, diligenter tritū cū uino calido per fauces oportet infundi. Præterea aquā in qua usq; ad tertiā betæ decoctæ sunt, succūq; earū nitro trito solenter admisces, oleiq; addes heminā, tepefactaq; in intestinū per clysterē diffundes, cū prius pronū aīal statueris, ut iniectū ad interiora perueniat. quæ si forte defuerit, mel coctū cū tertiā pte salis triti cogis in pillulas, ita ut collyria ad oui magnitudinē facias, similiterq; pronō aīali in intestinū uel qnq; uel septē, aut nouem collyria inferere curabis. post soluturū et mitigatur dolor. Item, physicū traditur os limacis neq; manu immunda, neq; terra, neq; dente contactum alligare umbilico dolentis curare continuo.

## De dorso curando. Ca. LXIII.

**P**LERUNQ; dorsum aīalibus aut sarcina ledit, aut sella, propter stramētū negligentia uel oneris iniuriā. qđ in itineribus interdū necesse est euenire, sed recēs tumor hac ratioe curatur: mallonē ceparū uel ipsas cepas in feruentē aqua decoques, et calētes quantū coriū ualet sustinere, tumori super impones, et fascia ligabis. una nocte oīs aufertur inflatio. Præterea sal tritum cum aceto miscebis, additoq; uitello oui, loca quæ tumere cœperint perfricabis, recens indignatio descripta siccabitur.

## De probatissima potione diapente. Ca. LXIII.

**C**VI cure est aīaliū salus, potione supius declaratā, quā specierū nūcro diapenten græco uocabulo nūcupāt, Gentianæ, aristologiæ, murræ, baccarū lauri, rasuræ eboris, paria pondera diligenter trita atq; pmixta, domi, siue in itineribus prius cōdita, habere oportet in promptu, ut quoties mœstū aut horridū uideris animal, aut morbi alicuius labe tentatū, statim plenū cochleare ex puluere memorato cum sextario uini optimi per fauces diffundas, et per triduū, etiā equo in labore constituto, digeras, ut aduersus uirus internum subueniat. probata curatio. Tusienti autem cum passi hemina dabis, et statim sentiet curam. Si liber, cui iam ponendus est finis, legem



## ARTIS VETERINARIAE

tium non offendit auditum, sequenti uolumine inchoantes à uertice usq; ad ungulas ex diuersis authoribus enucleatas animalium publicabimus curas, ut ordo, qui à natura datus est, in medendi dispositione seruetur, ne indigesta ac membrorum consequentiæ repugnās pagina quærentē confundat aut tardet.

## FINIS LIBRI PRIMI.

### IN SECVNDVM ARTIS VETERINARIAE VEGETII LIBRVM, PROLOGVS.



**M**l medicina ars iam dudum uitio cupiditatis, et exitu mercedis, nullo studiosius discere, collapsa est. Nūqd uero exemplo Hunnorum siue gentium aliarū artis ipsius etiam usus intercidet, dum homines resurgentes expensas, barbarorum cōsuetudinem imitari uelle se simulant, & incurata animalia hybernis pascuunt, & negligentia casibus dedunt? Quæ res nulli cōpendium, plurimis attulit damnum. Primo quod Barbarorum animalium alia naturæ, & ad omnem iniuriam durius corpus est. Deinde quod sic instituntur à paruulis, ut nec potionē medicinalem requirant, & hybernis pascuunt, ac sine pernicie frigora pruinaeq; sustineant. Nostra uero iumenta & mollioris generis sunt, & tectis frequentioribus assueta, calidissimis etiam stabulis imbuta, cum indignationem ex aliqua necessitate contraxerint, continuo in aliquod genus incidunt morbi. Diligens itaq; paterfamilias, cum mortibus animalium suorum & cum medicinæ expensis atq; mercedibus faciat rationem, intelliget unius uilissimi iumenti pretiū ad multorum, quæ sine dubio peritura sunt si curata non fuerint, salutem posse sufficere.

# VEGETII RENATA

TI ARTIS VETERINARIAE LIBER  
BER SECVNDVS.

## DE VALITVDINIBVS CAPITIS. Caput primum.



**I**N VNIVERSO ANIMANTIVM genere caput obtinet principatum, quod eminentius cæteris, dominatum quendam circa loci ipsius conditionem sortitur. In eo est odor, gustus, auditus, ac visus: quod quantum habet potestatis, tantum sustinet ex labore discriminis. Causas itaq; ex quibus ægritudines generentur, & signa, per quæ qualitas eorundem possit agnosci: curas etiam, quarum medela sanitas reuocetur, per ordinem indicare tentabimus. Plærunq; autem in corporibus iumentorum indigestionis uitio sanguis corrumpitur: quod euenit cum ex aestu uel frigore debilitata sunt mēbra, & in capite frigus sanguis uertitur in uirus. Tunc enim repletis uenis cerebri membrana distenditur, & somni salubritatem frequenter excludit. Ex quo necessario dolor capitis, mœstitia, & imbecillitas subit. Quæ ualetudo & prima uidetur, & leuior, si uelox medicina subuenerit.

### De Appioſo. Caput .II.

**C**Aeterum cum noxiuſ sanguis membranam cerebri & ex una parte pertuderit, & eandē dolore nimio cœperit prægrauare, efficitur animal appioſum: cuius & mens hebetatur, & uiſus. Nam cerebri incomitatus, & oculos paſcit & ſenſus. In qua paſſione quia una pars capitis prægrauatur, tanquam ad molam uadit in gyrum.

### De Frenetico. Caput .III.

**C**VM uero medium cerebrum corrupti ſanguinis uirus inſecerit, animal freneticum redditur, ut repente ſaliat, & uelut eſſugere uelit, pa  
F rietibus



## ARTIS VETERINARIAE

rietibus se tanquam irregibilis impingat, nec possit ratione aliqua contineri.

### De cardiacis. Caput .IIII.

**C**ardiacus is est, cui cor dolet. Cardiacus autem fit, quoties sanguinis illa corruptio stomachi uel thoracis impleuerit uenas, cerebrūq; percussit, cor etiam pestiferi humoris labe constrinxerit. Quae ualendo inducit mentis alienationē, & corporis sudore monstratur. ex quo difficillime liberatur.

### De rabioso. Caput .v.

**Q**uod si Appiosum, simul passio thoracis inuenerit, facit cōtinuo rabiosum. Ex ardore enim nimio iecinoris & sanguinis, uenae cordis neruūq; praefocantur, ex qua constrictione fit dolor ipsius loci usq; adeo, ut mordendo se comedat. Ex quibus ualitudinibus si animal fuerit liberatum, & post curationem aliqua pars cerebri fuerit imminuta, uel tumor subreuerit, ineptum iumentum, pigrumq; redditur. & in illa parte capitis ubi uitium remansit, difficile se gyrahit, & ex eo latere se parietibus iungit, & tarde incedens, non sentiens plagam, ambulaturae gratiam perdit, et erit submisso capite, & cum stare coeperit cum tarditate se mouet, minus etiam uidebit, nec cibum nec potum recusat. Quem si curare uolueris, cyclo curabis. In omnibus superscriptis ualitudinibus, primum de temporibus minuendus est sanguis, sed & de matrice aliquando tollendus. Cura autē penē omnium similis est, cuius ordinem sequentia declarabunt.

### Qua obseruatione cyclo curentur anismalia. Caput .vi.

**M**emineris autem omnes ualitudines capitis, praecipue ueteres, periculosos, cyclo oportere curari. Cui haec obseruatiō et ordo est adhibendus: Triduo ab hordeo abstinbitur animal, temperabitur etiā mollibus cibis, post diem tertiam de dextra ac sinistra, prout aetas aut uires, uel ualutudo permiserint, de matrice sanguis auferetur. Quo facto, per triduum uiridi cauliculorum ac lactucarum sustentabitur cibo. Primo uno die a cibo eum sustinebis & aqua. nouo autem die offas caulium cum liquamine & oleo optimo temperatas non minus uiginti digerās, cui nihilominus lactus cam dab

cam dabis in cibo ter in die. post potionē bibere semper incipiat. Si uero uenter uehementer solui incēperit, caulū offas dare desistes: sed dabis paleas et fursures, ita ut sequente die penitus nihil manducet, sed solam aquam percipiat ad bibendum, ac postero die inducatur in cellam balnei calidā et sudet. Opus est autem diligentia ut reducatur celeriter de calore, ne intercluso spiritu pereat: tunc extergetur diligenter, uinoq; et oleo largiter perfricatus, accipiet cum nitri puluere folia rasani conspersa, quantum commodum est. Postmodum cum radicibus cucumeris asinini uiridis minutatim concisis oleum optimū misces, et in uase nouo ita decoques ut tertiam perdat. ex quo singulas heminas per capita animalium per triduum dabis, ut potio uentrem resoluat. Sed si ultra modum fluere cōperit, lenticulam et hordeum pari mēsurā frigēs, et de his singulas bilibres per dies singulos cum fursure et paleis dabis. Quinq; itaq; diebus operam refectōis eius impendes, et leuiter exercebis, ut intelligas quantum uires corporis sanitāsque profecerit. Post hēc cum pro arbitrio despumabis. Sequēte die caput eius purgabis exorica, uel radice dianaria, quam Artemisiā dicimus: si hēc nō fuerint, ex liquamine optimo cū oleo mixto. cuius caput pedesq; connectis, cum bene purgatum agnoueris, soluito, butyrum ex oleo roseo solutum infundes in nares, ut illo purgationis mitigetur asperitas, ita ut singulæ cotylæ singulis naribus infundantur. Si supradictæ potionēs non soluerint uentrem, mellis, hellebori albi pondus unius denarij cum hemina dulcis uini bene tritum in potionē recipiat, uel certe scammoniæ pondus duorum denariorum diligenter tritæ cū dulcis uini hemina simili ratione diffundes in fauces. Quod si uenter ultra modum dissolutus discrimen importat, anagallicum succo ptisanæ ad restrictionem ipsius dabis, lenticulamq; et hordeum frixum, singulas bilibres cū paleis et fursure præbebis in cibo. Ad ultimum, partes quæ in causa sunt, sinapizabis diligenter, sinapizatum cautere ferreo, uel quod utilius creditur cuprino combures, uisita curaturus ex more. Potionem quoq; ex antidoto polygresto per dies plurimos dabis, et exercebis leuiter, et ad cibaria ipsius aliquid per partes semper adiunges, donec ad pristinam consuetudinem reuocetur. Insanabiles ualētudines cyclo affirmantur posse curari, id est, insani corroborari, caduci cyclo curati uruntur in capite; morbi uero, dysenterici, coriaginosi, orthopnoici, strophosi, cyclo curentur in renibus.



## ARTIS VETERINARIAE.

### De cerebro commoto. Caput .VII.

**C**erebrum plerumq; diuersis passionibus commouetur, quod his deprehenditur signis: Ambulabit prauus, & frequenter offendet, & toto se corpore commouet. Cuius ista curatio est: Baccas lauri numero xx. nitri selibrā, rutae manipulum: quæ omnia diligenter trita, cū aceto non acro, & oleo optimo rosaceo cōmixta, hyeme calefacies, perunctoq; oleo capite eius & cerebro, uel auriculis, cerebellū de lauata pelle cōuoluis. Quæ si forte defuerint, farinam hordeaceam resināq; miscebis, ex quo cataplasma cōfectum cerebro oportet imponi. Præterea ceram oleo cyprino coniungis, & linteolo inter auriculas ad ceroti instar imponis. Sed & reliquum corpus potionibus resouendum est. Tres fluuiatiles canculos cōteres diligenter, et cū duabus uncis succi caulii, addito lactis sextario olei duobus cyathis, pmiscebis, & colatum per os diffundes ad cornu. Quorum si inopia est, mellis cyathos duos, aquæ calidæ sextariū i. coquito, ex quibus pastillos facies, & in aqua frigida dilues, & dabis in potum. Præterea si hyeme curaueris, farinā triticeam: si estate, hordeaceam, aquæ frigidæ adinuicem amuli permixtā in potione præbebis.

### De dolore capitis. Caput .VIII.

**D**e capitis dolore multi authores multa dixerunt. Cuius hæc sunt signa: Tumor circa oculos apparebit, pabulum recusabit, lingua eius & palatum labiaq; tumbunt, quanto uehementius increuerit morbus, tanto exoritur amplius tumor: ambulantes toto corpore uacillāt, umbrāq; suam uelut odorantes expauescunt. Cuius passionis ex corruptione sanguinis nascitur causa, cum indigestio ciborum naturali meatu intercluso, uel certe derelicto, in eas uenas, quæ circa tempora sunt, defluit, membranāq; cerebri uitiat. Cui sanguinē de temporibus oportet minui, & cōtinuo oleo acetiq; permixto caput largiter perungi. Quod si hyems fuerit, hordeum pridie infundes in aquam & decoques, calidāq; in saccellos immittes, iumentorumq; caput fumentando diutius uaporabis. Alij authores tolli de palato sanguinem iubent. Tunc cimoliam cretam ex aceto infusam, & merdā bubulam recentem cum nitro trito miscent, & in cacabo super carbones decoquunt, calidāq; cerebro languentis imponunt, aceto rigantes ne creta astrin-

gatur.

gatur ad pilos usq; cum prius calida sumentauerunt caput. Dolorē capitis propē ad insaniam ista signa demonstrāt: Quoties graue est, & in præsepio se deponit, lachrymæ frequenter oriuntur, auriculæ stabūt, oculi grauiores erunt, anhelitus creber, aridus pilus, tremores frequentes, tristis aspectus. Quem in primis ab aqua abstinebis ne nimium bibat, de utraq; parte colli sanguinem detrahes, caput sicut scriptum est curabis.

## De Distentionibus. Cap. IX.

**D**istentionis quoq; ualitudo ad capitis præcipue causam refertur. Cuius hæc erunt signa: Impediente caligine obscurabitur uisus, tremor & sudor totius corporis insequitur. Quod uitiū contingit ex aqua, si sudans iumentum biberit: uel ex indigestione cibi, si non dormiat, uel substrictus manserit. Huic capitis membrana distenditur. Quæ passio caterarū ualeitudinum & fons probatur & mater. Nisi enim inter initia curaueris caput ut animal dormiat competenter, fiūt appiosi, insani, rabiosi, frenetici, capidiaci. Igitur cū aīal distentiōis ægritudo comprehēderit, de ceruice eidē sanguinē tolle pro magnitudine corporis & ætatis. Et si æstas erit, oleo & aceto caput totumq; corpus perunges, & diutissime confricabis, loco refrigerato & opaco inclusum continebis, substernes etiam stercorea sicca uel paleas, ut prouocet ipsa mollicies ad cubandum, locum calidum declinabis, nam impedit somnum: fursure uel paleis uel folijs lactucarum reficies. præterea potum præbebis exiguum: cum cōualescere cōeperit, modicis ambulationibus exercebis, ubi idoneum uisum fuerit ad cibaria largiora infusum hordeū ad pristinam consuetudinem paulatim per incrementa reuocabitur. Si die septimo non profecerit, sanguinem iterum de temporibus emittes, & caput sine intermissione curabis. potionem dabis qua sanātur appiosi: Nasturcij seminis, appij semis, seminis lactucæ, anagallici, petroselini, aneti, papaueris syluatici seminis uncias singulas, piperis scrupulos 3, croci drachmā unā. Quæ oīa bene cribrata atq; cōmixta ex aqua temperabis, trochiscos facies, ut habeant minus quā singulas drachmas. In dieta unū trochischū in aqua dissolutum per os digeres. quod quotidie oportet fieri donec sanitas redeat. Si non appetit cibū, singulos trochiscos solutos cum succo ptisanæ quotidie præbebis. Vinū nūq; dabis. Capitis enim ualeitudo sumpto mero deterior efficitur.

F 3

De app



## ARTIS VETERINARIAE

### De Appioso. Caput .X.

**S**i quod iumentum appiosum fuerit, in praesepio incumbit, oculos ten-  
sos habebit, micabit auriculis, uisus caliginem patietur, & gyrat in cir-  
culo tanquam ad molas.

### De rabioso. Caput .XI.

**Q**uod si etiam fuerit conuersus in rabiem, sic intelliges: Subbito hin-  
niet tanquam sanus, parem suum appetit morsu, uel hominem, praese-  
pia aut illa sibi mordicās rodit: quē sicut appiosum curabis. Pro-  
sus abstinebis ab hordeo, mollibus cibarijs sustētabis. Praecipue tamē apiū ui-  
ridem quantum uoluerit praebēbis. Sanguinē de temporibus aut de ceruice  
emittes, loco tenebroso statues, caput eidem huiusmodi acopi cōfectione cura-  
bis: Opopanacis librā 1. resinæ, terbentinæ atq; uncias 2. galbani uncia 1. resi-  
næ frixæ uncias 3. mastice tritæ uncias 2. olei ueteris librā 1. ex hoc ei cere-  
brum & auriculas confricabis, oleū tamen solum ac liquidum in aures eius  
suffundes. cuius tamen prius quā acopo utaris, saccellationibus caput cere-  
brumq; uaporare te conuenit, & caput apposito cerebello communire. Pon-  
tiones quoq; ex trochischo supius memorato quotidie praebēbis, collyrio acri  
inungis assidue ut caligo ex oculis possit auferri. Quæ cura si non profice-  
rit, caput & tempora sub ipso protocomio semisse inuris cauterio, quod &  
sup uenas tēporales facies. Plēriq; tamē facies ne deformet iumentū solo ta-  
al's † usto. bulare palati († confecto) sani fieri possent. Feruor enim foci debilitatem ca-  
pitis tollit, & membranam menti pristinae, sanitatiq; restituit.

### De Infania. Caput .XII.

**A**lij authores insanientis iumentū ar dentes & sanguineos oculos et  
humore suffusos, stantes auriculas dicunt uel micantes, ut ad instar  
indomitorū nec capi possit, & captum, parietibus se illidens conetur  
effugere. terram pedibus fodiet, et multum flegmatis ex ore profundet. quod  
hac ratione curatur, ut auferatur ei sanguis de angularibus uenis, de palato,  
& post de cruribus. a cibo eadem die abstineatur & potu. Alia autē die aquā  
frigida dabis ei bibere. Auferātur stercora quæ in ano eius sunt, p quatruiduū  
continuato clystere, curabitur uenter, ungetur cerebrum, secreto conlocabi-  
tur loco

tur loco, accipiet in substantiam porros, & herbam molliſſimā, aut molliſſimum ſcēnū. His potionibus percurandum: pulueris turis drachmā 1. aceti albi ſextariū 1. radicis panacis unciā 1. herbæ ſaxifragæ uncias 3. ex aqua mulſa per os dabis. Lactis caprini ſextariū unū deſundis in fauces. quod ſi deſuerit, ciminū ruſticū pondo duo in puluerem rediges, additoq; olei optimi uno ebulo, ex aqua mulſa diſfundis ad cornu. Sed cæteris potio hæc aptior creditur: apij unciā 1. iuſquiami unciā 1. ſeminis apij unciā 1. ſeminis lactucæ uncias 2. papaueris ſylueſtri unciā, quæ oīa in puluere redacta cōmiſces, et unū cochlearium magnū ex aqua dabis, uel ſi cibū non accipit, ex ſucco ptiſanæ: obſcuro et frigido & laxiore loco ſtatues, ſilentiūq; præbebis ut dormiat. prius tamen oleo ac pice liquida caput perunges, auresq; complebis, tempora etiā munies cerebellare uel ſiſcijs, mirtam quoq; aridā conteres, & aceto oleoq; miſcebis, corpusq; eius totum diutiſſime confricabis. Solent conſtringi & obrui ſtercore ut ſudent & dormiāt. Quibus ſi ſomnus uenerit, aſſeret ſanitatē. Rabioſum uero iumentum eadem omnia, & maiora oſtendit quā inſanum. Nam & alia animalia comedit, & facit ipſa cotaſione rabioſa. Pleurūq; etiā morſibus inteſtina ſua extrahunt & ineunt fortiter. Quæ ualētudo ex nimia ſanguinis abundantia & ardore contingit. Curatur aut obſervatione & potione ſuperius declaratis.

## De Chirurgia. Caput .XIII.

**C**hirurgia appellatur quodcumq; ſecatur ferro, uel cauterijs uritur. quæ cum ſit omnibus membris aīalium, præcipue tamen capitis neceſſaria eſt medicina. Quodcūq; igitur iumentū in qualibet parte ſergerit caput uel nudauerit caſu, ſollicite curandum ne indignatio uulneris in neruos cerebrūq; penetrādo piculū generet, nec in primo medicamētis uti acrioribus cōuenit, ſed magis melle curare, cū ad maturitatē uenerint illa quæ fracta fuerant, oſſa laxantur, tenta ſollertiter, et mobili manu uel ſorſicibus eximito. Reliqua fragmenta oſſis, quæ aſperata ſunt ferramenti cedito atq; prædito, ut carnē facilius inducāt. Nūq; enim clauditur uulnus ſi non raſeris, donec ſanguis per os ipſius reſpōdeat. In quo maior eſt adhibēda cautela, quæ ſolet in locis oſſuoſis et cōmiſſuralibus fiſtula fieri. quæ cū euenerit, parum per iniuriā aſſicit uulnus, per quod non ſanies, ſed humor liquidus emanat. nec unquam deducta cicatrice ſolidatur. Quod ſi euenerit, hac ratione curabis.



## ARTIS VETERINARIAE

Papyrus per ipsam fistulam traicies, ita ut capita papyri, quæ extra fistulam eminent, ex utraq; parte alligas lino ne cadat, et diebus v. uel pluribus, donec callositas fistulæ papyri distentione turgescat, et maius vulneris foramen fiat. Tunc ad mensuram vulneris ex fistulari medicamento collyrium faciens, ex empto papyro in eam fistulam injicies, ut impleatur ex integro, plane ne excidat munies diligenter. Post dies quatuor uel quinque soluis. si fistula ceciderit, traumatico curabis, quod vulneri semper immittes, donec spissa sanies et non multa in eo loco reperiatur. Cum autem iam limpidum uideris collyrium, fac pollinem herbi, et thus masculum tritum æquis ponderibus cum melle decoquito, et plagæ ipsi imposito, per dies plurimos quotidie curato ita, ut depriimas ipsas partes vulneris, quatinus iunctæ citius coherescant. Si grauius offenderit caput, ut cerebrum uexet intrinsecus, continuo de temporibus sanguinem eidem oportet auferri, et spongiam aqua, si æstas fuerit, oleo roseo, et aceto æqua parte commixto capiti eius imponi, fasciâq; connecti, et cibos uirides præberi. si nec ipsos appetit, quia omnem cibum recusat, fabam moles et conuerteris in pollinem, farinam quoque triticeam pariter admisceas, et cum mulsâ per cornu ad substantiâ animali tam diu succibus eius infundes, donec cibos uirides appetat, quos aqua marina uel salsa oportet aspergi.

### De auribus. Caput .XIIII.

**A**urium ut uicinitate proxima, ita periculi non discrepans cura est. Quæ si casu aliquo fuerit à radice contusa, et collectionem fecerit, eam cum maturauerit, scalpello secato, et pus finito fluere, tum linis aceto acerrimo et oleo per triduum, quarta die traumatico curato donec sanetur. Etiam si cartilaginem uexauerit, eiusdem medicinae obseruatione proficiet. Si uero à radice auriculæ, uel commissura capitis tumor magnus cum duricia extabit, ex scæni græci et lini semine et tritici polline cataplasma imposito, maturatam collectionem scalpello secato, ita ut inferius plaga spectet, quatinus humor per prona decurrat. Vino, oleo, et sale mixto infusos lenius inducis, et uulnus per quatríduum fouebis post traumatico uteris. sed difficilis cura est, quia fistulæ in talibus locis frequenter oriuntur. quæ si cernerint, suprascripta curatione curantur. Si tamen ægritudo uulneris ulterius etiâ post medicamenta procedat, uicina urendæ sunt partes, et cauterio in ipsis coll



ipsis collectionibus infigenda sunt puncta uehementius, ut et cutis et causa perrumpatur interior. post solerter uista curanda sunt. Non enim aurium est negligenda curatio, ne ex dolore nimio generetur insania. Primum purganda est auris diligenter intrinsecus, ut auferatur quod dolorem mouet, aut lædit. Si nihil inuenitur, spongiā nitro et aqua molliter infundes et dilues, unamq; noctem intra auriculā infusam spongiā manere patieris. Die tertio nitro et aqua calida fouere incipies frequenter et diu, donec dolor recedat. Quod si aqua fuerit ingressa, oleū uetus et acetum æquis ponderibus adiecto nitro in aurem mittito, et succidā lanam superimponito. Si uulnera fuerint lyparem auribus inferes et curasti.

## Depilis qui nascuntur in oculis. Cap. xv.

**Q**uodcumq; iumentum in oculis tritiacem patietur, id est, ut pili aliam palpebram urentes lachrymas moueant, uisumq; conturbent hac ratione curatur. Non longe a pilis ab interiori parte scalpello plagam dabis in cute palpebræ, post forpicebus per longū ad mensurā oculi fasciolam præcides, et impositis fibulis consues palpebram foris uersus, ut oculus sine deformitate recipiat uisum et gratiā naturalem. Tūc uero optimo oleo, necnon etiam muria infusam spongiā superpones, et oculū fasciabis. Post die quinto soluis, tunc intrinsecus oculum collyrio curabis. de foris uero tetracharmum impones, nō prius fibulas ablaturus quā duxerit cicatricem. Nihilominus et cadentibus fibulis, collyrij cura non deerit, ne caro rursus superflua excreseat. Sed pleriq; adhibent cum deformitate cōpendium, ut partem quæ prominet ad mensuram naturæ forpicebus amputet, pusca quæ frigida sunt propter fluxum sanguinis foueant, oculum collyrio intrinsecus curent, ne indignationis necessitate lædatur.

## De suffusione oculorum. Caput. xvi.

**S**uffusio sicut hominum, ita iumentorum impedit uisum, cuius tria genera ab autoribus indicantur: Stenochorialis, ptochorialis, hypocho-  
riasis, græce papula nōiatur. Stenochorialis dicitur, cū constringitur uisus et uires amittit. Quæ hac ratione curanda est, ut sanguis de temporibus auferatur: radicē quoq; feniculi, et herbam celidoniā uel rutā decoques ad tertias, et cotidie ex ipsa aqua quantū manus patitur, oculum foucat. Innum-

G

gesetiam



## ARTIS VETERINARIAE

ges etiam collyrio opobalsamo, quod suffusionibus prodesse consuevit. Aduersus infestantes pilos tertia cura est, ut leni tenuiq; cauterio genæ quæ procreuerint inurantur, quo factò, ducta cicatrice conteritur pellis, & palpebra alterius eleuata à pupilla cursu pilorum arcet iniuriam. Platochoriasis autem est cum se ultra naturalem modum pupilla diffundit, & eripit uisum, nec curari ullatenus potest. Nam sicut oui uitellus casu aliquo disruptus in priorem formam coire non potest, ita semel pupilla diffusa recipere non potest usum uidendi. Quod euenit equorum sudore dum membrana quæ cõtinet lumen, indignatione caloris disrumpitur: uel certe sollicitudo longi itineris ad indignationem iumenta compellit, aut læsum oculum dominus curare neglexerit. Quod cum accidit, oculus uidetur incolumis, nullis lachrymis, nullo sanguine, nulla indignatione prodit iniuriam, sed uisus tantum declaratur indicio, quod in pupilla ipsius imaginem tuam tanq̃ in speculo uidere nō potes. Hypochoriasis autem à capitis humore descēdit, & in uno oculo sese primo ostendit, postea etiam ad alterum transit, intelliguntur autem humore uel lachrymis. Continuo sanguinē ei de supercilio uel de ipsa parte temporum detrahes, fomentabis ex tepida aqua, in qua radices feniculi decoctæ fuerint cum ruta. Preterea iunges collyrio opoponato & opobalsamato. Quod si insisteris medicinæ per lachrymarum cursum consuevit sæpius caligo sanari. Temporales quoq; uenæ cauterijs inuruntur, & meatum humoris excludunt.

### De paracenthesi in oculis. Caput .XVII.

**Q**uod si uis passionis intulerit cicatricem, diligenter attende quo colore sit membrana, quæ apposita pupillæ impedit uisum: si auroso colore fuerit, insanabilem scias. Si candida nimium, etiam noueris nō posse curare ipsam. Si uero spissa fuerit colore oleagino muco similis, per paracenthesin ad hominū similitudinem, cum fuerit maturata curatur. Iumentum igitur pridie temperabis à cibo, uel potu maxime prohibebis, in loco mollielides, caputq; eius & ceruicē apte collocabis, ita patentē oculū facies, ut claudere nō possit. deinde ab ipsa fronte paracetheriū inter tunicas oculares subijcito, ne pupillam tangas, aut aliquid lædas interius, sed ipsum albū de superiori parte ubi hypochisis posita est, capitello paracetherij deorsum deprimis



primis ad palpebrā inferiore subtiliter. Quod si depositū fuerit, nō prius paracetherium eximas, nisi clausum oculum penicello calido diutissime uaporaues, solet enim resilire. Quod si ita euenerit, reprimito, donec ita componatur ut resilire non possit. Cum itaq; intellexeris claritatem pupillæ sine ullo obstaculo hypochisis, tunc eximes ferrum, & inuenies aīal uidere. curabis sic. Ex oleo roseo & oui albo anacollima facies, lanam infundes, & super oculum curatum impones, ac desuper fasciabis. Caueto ne ipsa die manuducet, & moueat oculum agitatione maxillæ, sed tamen si uoluerit bibat. Altera die soluis & calida fomentabis diutissime, deinde fœnigræci succum in oculo subfundis, & rursum anacollima supradictum similiter imponis, fasciabisq;. Quod cum per triduum, aut quatruiduum feceris, oculum soluis, & fœnigræci succo fomentabis, ex melle optimo attico unges donec cicatrix se confirmet & oculus.

## De oculolunatico. Caput. XVIII.

**E**st aliud uitium eiusmodi, ut interdum oculo album inducat, interdū limpidet: ex qua passione lunaticum oculum ueteres non nauere. Cuius ista curatio est, ut de ipsa parte temporum detrahatur sanguis, interpositis diebus sub oculo. Nihilominus sanguinem oportet minui. Cotidie quoq; calido fomento oculum curabis de foris, Intrinsecus autem inunges collyrio thermantico et acerrimo per plures dies donec recipiat sanitatem. Si nihil ex hac ratione profecerit, uenas superiores in temporibus supra ipsum locum qui sustinet passionem, diligenter perquires & inures, ut humor uoxius possit arceri.

## De staphylomate oculi. Caput. XIX.

**Q**uodcumq; iumentum in oculo habuerit staphyloma, incurabile est: talis tamen curatio consueuit adhiberi; De sub oculo sanguinem ei detrahes, & fomentabis calida cum radicibus fœniculi & rutæ decocta, inunges etiam collyrio non ualde acri, si uulnus fecerit & deplauauerit, ex succo fœnigræci fomentabis, & inunges collyrio leni, quod facit ad tunicas ruptas, donec se cicatrix cum planitie claudat, tunc uteris acriori collyrio, & per dies plurimos, donec quacunque pars æquari possit



## ARTIS VETERINARIAE

aquari possit ad naturæ similitudinē, cōpleaturq; ut nō deformatur obtutus.

### Ad album de oculo tollendum. Caput. xx.

**S**i casu aliquo aīa oculū impegit, aut cōfricauerit, uel ex percussura laeserit & albū induxerit, etiā si totus oculus praelusus sit, tamen expi-  
mētis hac ratione probatū est cito posse curari. Hederam colliges terre-  
strem & in pila mundissima diutissime contundes, succum exprimes, ex hoc  
animal inunges; potestate medicaminis quīvis desperata, consumitur albugo.  
Sed si terrestrem hederam nō inueneris siue bacca hederæ siue folia contū-  
des, & succum exprimes, & ex eo succo inunges. Si hoc quoq; difficile ui-  
debitur, aut morosum, paululum aquæ frigidæ cū folijs hederæ diutissime cō-  
tundes, succum exprimes, & per siphonem ei in oculum defundis. Quod  
cum per dies plurimos tam mane quā ad uesperam feceris, albū omne to-  
letur. Sed si uinū miseris optimum & recens efficacius curata sanat.

### De suffusione curanda per nares. Cap. xxi.

**A**liqui authores dixerunt, si dexter oculus suffusione suscepit, uel  
album incurrerit, dexteram partem naris, si sinister sinistram dili-  
genter inspiciet: in ipsa callositate narium foramina subtilissima in-  
ueniet, quibus tenuis inferenda est fistula, per quam ille qui curare debet  
os plenum uino insufflet, ut merum per foramen illud penetret. Quo facto  
oculus incipiet lachrymare. Velocius autem proficiet, quia per interiores  
uenas meri uirtus ad oculum penetrat.

### De diuersis passionibus oculorū. Cap. xxii.

**I**umentum in oculo in osse percussū, si tumorem fecerit durum, callo-  
sum, & ossilagini similem, hac ratione est curandum: Deiecto animali  
contra causam ipsam, cutem aperito, & ossis cisorio gingiuam, uel  
cartilaginē uel os quod ex se excrecere coeperit, cedito, ut deplanes ad simi-  
litudinē partis alterius. Si apte deplanaueris, aceto et oleo lincolis uel licinio  
ad dito, locum ipsum complēs, & fasciabis. tertia die solues, & similiter cura-  
bis p̄ dies .r. donec feruor desinat. post traumatico uteris. Catastolico quoq;  
medicamento libraturā cutis consumis, quam diu lymphidum uulnus curetur et  
adequetur. Quod si ipsum os concarnari non potuerit tam diu cotidie era-  
dicato,



dicato donec sanguinet atq; concarnet, ita ut medicamenta congruentia vul-  
neri imponas. Quod si post sanitatem causa eadem crescere cœperit, pun-  
ctis cauterio subaliter urito. Oculorū epiphora infra oculū detractus sanguis  
emendat, si usq; ad sanitatem melle optimo inungatur assidue. Preterea pro-  
dest eidē passioni; myrræ pōdus denarij unius, crocodili stercoris semiuncia,  
salis armoniaci semiuncia, sepiæ ossiū semiuncia, mellis attici cyathos 2: ex  
quibus omnibus tunsis atq; permixtis oculū perunges. Magnæ lippitudini  
adhibetur tale remedium: Murre trogloditis uncia 1. thuris masculi, croci si-  
culi, limpidis cipriæ, eris usti, añ uncias 2. teres simul, consparges & cernes,  
aque cœlestis, & falerni uini, mellis attici adijcies quantū sufficit, in uase ui-  
treo condes, & cum necesse fuerit uteris. Si casu ciliū ruperit, fistulam dabis  
& mannā thuris cum ouo impones. Discutit cicatricem oculorū eiusmodi  
compositio: Spicæ nardi uncia semis, salis armoniaci uncias 3. catiniæ uncia  
semis, croci uncia 1. piperis semiuncia in puluerē conuerter & uteris. Albi  
uitia deterget ista curatio: Sepiæ marinæ ossis rasi 3 decem, croci 3 duos, salis  
armoniaci scrupulos 2. myrrhæ, crocodili stercoris scrupulos duos. Item,  
album siue glaucomata emendat: uini amenij ueteris sextarij tres, gariofilī  
sextarius, mellis uncia tres, quibus omnibus decoctis uteris. Album tollit  
si ex humore uel percussura euenerit: Sandariæ uncia 2. ossis sepiæ combu-  
sti uncia 4. piperis albi semiuncia, salis armoniaci uncia 2. cum melle permi-  
xtis. Cicatricibus oculorum medetur ieiuna salina, si cū sale mandatur in  
ore, & expuatur in oculum. Sal quoq; tritū cū osse sepiæ, & sinapis agre-  
stis semine. Collyrium nardinum; opopanacis scrupulos 2. uiolæ uncias 2.  
spicæ nardi, cassiæ, marrubij añ semiuncia, croci siculi uncia semis, olei semi-  
unciam & scrupulos 4. piperis albi uncias sex, gummi scrupulos 5. Item  
alia confectio collyrii: Eruginem eris & salē optimum æquis ponderibus  
& aceti quantum sufficit musces. Necessaria compositio: rute scrupulos 4.  
thuris masculi, stercoris columbini, murius, olei, croci, mellis, catiniæ, olei  
rosati añ scrupulos 4. diligenter trita miscebis & uteris. Si uero oculus ictu  
uulneris insanabilis redditur, & (ut Mulomedici dicunt) canchremata fece-  
rint, ne periculum mortis incurrat, erui pollinem cum oleo roseo & ouo si-  
mul immittito. Cū purgatum uulnus fuerit, cum melle attico inungito. Sunt  
& alia multa collyria, quæ quia eandem uim, easdemq; species continēt, enu-  
merare superfluum duximus.

G 3 De stru



## ARTIS VETERINARIAE

### De strumis iumentorum. Caput XXIII.

**P**lerumque strumæ, uel parotides, aut scrophulæ iumentorum guttur infestant, & faucium tumorem producunt. Nam & subrecto sunt capite, et tanquam ab stranguria prefocantur. Hos primum fomētis calidis, et cataplasmate ex polline hordeaceo & resinæ uncijis tribus mero ualido coctis, curari expedit: & cum collectio fuerit maturata, scalpello secari opus est, & quicquid collectum fuerit emittere, et aceto, et sale, & oleo infusos lemniscos subijcere. ceteris quoque diebus traumatico, et medicamentis aptis sollerter curare si uulnus pateat, dum sanetur. Nam in his locis ex præclusionione cito solet fistula fieri: quæ si euenerit, ut supra demonstratum est, papyro & collyrio poterit persanari.

### Deglandulis. Caput XXIII.

**G**landulæ quoque aialibus, et præcipue pullis, usque ad periculum interdum moleste sunt, et in morbum transeunt aliquando. quæ inter maxillas inferioresque fauces nascuntur, et ad similitudinem pillularum maiores, aliæ uero minores connexæ ex carne obdurescunt, et tumore sine doloribus faciunt. Quæ inter initia perunctæ oleo, picula perfricari solent, uehementiusque manibus corrumpi, et ita uelut uanescente sanari. Quod si excreuerint amplius, deiecto animali, ita ut per medium secentur scalpello subtiliter cum radicibus eximuntur, ne aliqua uena tangatur. Quo facto, aceto & oleo cum sale, medicamentisque superius declaratis sananda sunt uulnera. Plerique urenda dixerunt. Sed si parue sint prodest, ceterum maiores excandæ sunt ferro.

### Depullaribus. Caput XXV.

**D**um caput pullorum calefecerit prima dentitio, inter gingiuas atque maxillas tumor, collectioque generatur, quæ pullaria uocatur. Cuius passionis tanta tensura est, ut māducare uix possint. Sed cataplasmatibus studiosissime maturanda sunt, deinde scalpello aperienda, post sale et aceto & oleo curanda. Plerique etiam, cum ferro exemptæ fuerint glādule, propter sanguinis fluxum loca uri debere præcipiunt, post sale & oleo octo diebus utuntur, nec non ex nitro et aqua calida diluunt. Si nitri inopia est, lotio calido aut lixiuio utuntur. Deinde uinum & oleum & farinā de eruo imponunt per triiduum, consequenter de uino ac oleo, & farina hordeacea, et melle percurant. Addentes, quæcumque plaga fuerit aut strumæ uel parotidis, glādule, quæ tolluntur



luntur licio medicamento, uulnera percurari ita, ut de mali granati sicci puluis aspersus, celeriter adferat sanitatem.

De fistula maxillæ, Vel de conficiendo collyrio  
fistulari. Caput .XXVI.

**S**I ex aliqua huiusmodi curatione iumentū fistulam in ore fecerit, hac ratione curabitur: papyrum injicies in fistulam, ut pars eius in ore extet, quam lino diligenter ligabis ne possit elabi: pars uero foris exeat, quæ nihilominus constringenda est lino ne cadat, triduo permaneat, quarta die papyrum eximes, Collyriumq; ad longitudinem & cauituram uulneris ad arctum fistulæ subijcies, & ne forte labatur, fasciabis locum, ita ut ad māducandū possit maxillas agitare: tertio die solues. Si fistula ceciderit, diebus septem unguento traumatico curabis. deinde collyrium ex melle & erui polline decoctum subijcies ad plenitudinem foraminis diebus plurimis. Ad ultimum, anapleroticum ipsi uulneri medicamen imponis, donec omnis plaga, ducta cicatrice, solidetur. Fistulare aut collyriū hac ratione conficies: anisi uncia .i. ferule uncia .i. æruginis æris uncia .i. battitur & calcetis uncia .i. cimini seminis uncia .i. teres cū aceto acerrimo, et secundū qualitatem uulnerū, cū usus exegerit, collyria formabis.

De expositione fistulari. Caput .XXVII.

**F**istulæ nascuntur, quoties neruus, aut cartilago, aut os negligentia uel impitia curantis, ex plagæ alicuius tabido humore uiciatur. Tūc enim quæ commeauerit ad instar cuniculi carnem indurat & incallat, & fit fistula, quæ nulla ratione sanari potest, nec aliquando coire, nec solidari, nisi penitus eximatur. Huius à diuersis autoribus tradita est diuersa curatio. Alij enim scalpello refecari & apiri iubēt, et stringotomio decarnari, medicamentisq; acerrimis cōsumi, et sic postmodū uulnus ad cicatricē coire. Quod cū laboris ac discriminis habeat plurimū, minus tamē prodest. Alij uero cauterio omnē fistulam inurendā, uicinasq; partes eius punctis feruentibus præripendas esse duxerūt, quatinus per ignē callositate submota, astalticis medicamentis uulnera pcurētur. Sed melius est fistulā, sicut supius declaratū est, papyri iniectione curare. quia neq; neruus, neq; uena, neq; cōmissura uexatur. Nā scalpello uel cauterio sæpe fit causa deterior, et piculū creāt. Collyriū uero

omnem



## ARTIS VETERINARIAE

omne callositate fistulae de alto à radice eius eximit. Quod si os fuerit uexatum quod oporteat radi patens uulnus, per medicamenti curam non potest impediti. Si uero in alto tabes aliqua uel nervus aut cartilago remanserit, ex eodem collyrio puluerem facies, & frequenter iniicies. Omnia enim uulnera elympidat atq; persanat.

### De tumore faucium uel capitis. Cap. XXVIII.

**I**nterdum ad similitudinem synanches animalibus fauces & caput intus intumescunt, adeo ut bibere aut manducare non possint. Cuius totum & os & lingua, aqua calida fomentatur, & taurino felle perlinitur. Potio autem datur huiusmodi ad cornu: olei ueteris libras 1. uini sextarium 1. commiscet quoq; noue caricas cum noue capitibus porrorum, decoques, & diligenter contres, & in aqua ipsa nitrum alexandrinum tritum quantum sufficit misces, & ex his omnibus potionem mane & ad uesperum heminas singulas dabis, ut tumoris ipsius relaxetur ac mitigetur asperitas. Manducet autem herbam uiridem, aut quod melius est pascatur. Quae si defuerint, farinam de hordeo facies, cui nitrum admiscebis, & sic apponis. Foenum quoq; molissimum eliges; quod nihilominus nitro & aqua consperges, sanguinem non detrahas nisi forte de palato, despumes, cum coeperit conualescere, nitrum tunsum & cribratum, pulueres de radicibus cucumeris asinini syluatici commiscet & uini sextarium, coctearia pulueris ipsius iunge, ut huius potionis ui resolutio uentre purgetur. Alij authores tumorem capitis ac linguae uel faucium, etiam si obdurauerit, ita festinantes propter periculum curare nituntur: lapides molares plures igne succendunt, cum candere coeperint, caput equi cooperiunt, & uas plenum lotio sub ore & naribus supponunt, & per uices singulos candentes lapides in lotium immittunt, ut ille uapor ac fumus à calore lapidum concitatus, os equi & nares impleat, et fuste transversum, ut apertum os habeat debet accipere. Quod cum diutissime feceris, aquam marinam calescito, uel certe salem in aqua dulci miscebis, fouendoq; dissoluis, addito aceto acerrimo, caput eius & os & gingivas diutissime confricabis. Postea simum bubulinum cum acri aceto miscebis, & tepes facies, ex quo caput totum frontemq; & labia perunges. tunc farinam hordeaceam cum aqua rapida sufficienter pro cibo dabis & potu.

Si ex ple



Si ex pletura sanguinis fauces tument. Cap. XXIX.

**Q**uod si ex sanguine tumor ille indignationis euenerit, ita intelliges, si uenistis obturabitur halitus, et oculi sanguinei apparebunt, cui de <sup>als auditus.</sup> temporibus si non tument, aut certe de palato si ibi indignatio non erit, sanguinem oportet auferri. cretam cimoliam duabus partibus et tertiam pari crete nigrae, ex uino austero temperabis, et dum calet illinis caput.

De intomatibus. i. de Tuberibus. Cap. XXX.

**S**ciendum est autem tubera in corporibus iumentis frequenter excrecere, quae graeci intomata uocant. horum uariae qualitates et diuersa sunt nomina. Stechatoma est tuber quod in se adipem uel pinguedinem continet. Meliceris est tuber in quo caro inspersa, quo modo in uerrucis inuenitur. Aneutrisma est tuber in quo sanguis cospiratus uberis uenae similis inuenitur. Acteroia est tuber in quo farinosa coeries reperitur. Ganglion est tuber quod fit ex duplicatione nerui, similis tubero cum dolore immobili. Horum omnium una est curatio. Iumentum colligatum deponitur, et contra locum causae sagitta aut scalpello in longum dextra ac sinistra pro mensura tumoris aperitur, ita ut media fasciola cutis, quae supra tuberculum est, intacta permaneat. Post egestis uel euersis omnibus quae tumorem mouerant, medicamentis competentibus, ea quae supra declarata sunt, producit ad cicatricem.

De lingua incisa. Caput. XXXI.

**S**i iumento lingua fuerit incisa, statim cum fibulis consuito, deinde uino lauato, post gallam tundito et puluerem cernito, ex eo imponis donec sanetur: cui dabis scenum molliissimum concisum, et pro hordeo sursum res. Alij postquam fibulas acceperint linguaque uino fuerit elota, mel imponendum esse duxerunt, ut plagam purget et curet. Ad ultimum ex malo granato puluerem iniecerunt.

Degingiuus & dentibus. Cap. XXXII.

**S**i iumento loculamenta dentium. i. ginguae uel dentes doluerint, hijs agnoscitur signis: hordeum solidum glutiet, macescit, saluarum plurimum effundit, ginguae intumescunt. Cretam cimoliam cum aceto acer

H rimo ma



## ARTIS VETERINARIAE

rinto macerato, & calentem extrinsecus maxillis inducito, ne minus quā quibus: gingivas autem interius cum puluere corticis maligranati, & melle triti die diutissime confricato donec egesta sanie conualescat. Quod euenit, cum humor acrior ex capite, in maxillarum defluerit uenas.

De osse fracto.

Caput . XXXIII.

**Q**uod si animal iuxta collum uel molares, uel alio oris loco os freg-  
rit, ut morsum claudere non possit, et apertis dentibus horreat pro-  
pendentibus labris, continuo calida fomentabis, & labrum & quae  
sunt disrupta componis, fasciola tenuissima aceto & oleo madefacta diligen-  
ter unam partē, deinde alteram cōpingis ad locū, & similiter fasciato, ne iterū  
dissipetur: Cui & corbē cōstrictam oportet imponi, ne deprauet dentes  
& labia. Cum solueris ad curandum, manu quae ante composueris contineto,  
fursurem & farinam hordei mixta in cophino ad manducandum dabis, ita  
ut quamdiu manducat, manus tua à loco quem continet non recedat. Cum  
iam manducare noluerit, offero ei aquam ut bibat. Cum biberit curato sumi-  
liter, ut supra scriptum est. cui ei succum ptisanæ conuenit dari, si minus for-  
tasse manducauerit. Quem tali obseruatione per dies quadraginta curatum  
restituēs sanitati.

De cartilagine narium si sanguis fluat. Ca. XXXIII.

**I**mento nariū cartilago si corrupta sit, & sanguis reprimi non possit;  
spongiam asram & thuris masculi pollinem commixtum impone ad lo-  
cum qui latus est, et si uulnus factum fuerit in cartilagine, hac ratione  
curato. Interdum animal deſpumatum remissus semel de palato sanguis nō  
potest reprimi, propter quam necessitatem, sicut supra scriptum est, in loco  
in quo sagitta ruptum est palatum, spongiam imponis, caputque eius sur-  
sum constringe, & aqua frigida renes cerebrumq; testiculosq; perfundis.  
Quae res si tardius subuenit acatiam nigram & thuris pollinem aequis pon-  
deribus ex aceto acerrimo temperabis, totumq; caput illinies, donec sanguis  
ipsa cōstrictione claudatur.

De palato, si uena se nō clauferit. Ca. XXXV.

**M**ature piculū creat cū incisa uena claudi nō potest in palato, sed cō-  
tinuo sanguis pſuū inhibetur, si aut candē cauterio fuerit me-  
tus ille cō-

tus ille cōbustus, & suspēsum altius caput. Cū per nares sanguis defluit, nec potest aliter retineri, coriandrū uiridē sufficienter tundes, uccumq; eius ex pressū, substricto equo, naribus infundes, frigore naturali uenas prius claudis: chartā etiā et lanā cōbures, ipsumq; puluerē p̄ fistulā insufflabis naribus

De genere & qualitate mucorum qui per nares fluunt. Caput . XXXVI.

**M**ucorum etiam qualitates, qui per nares effluūt, conuenit nosse, ex quibus genus passionis ostenditur, & causa cognita facilius curari potest. Mucus lymphidus cotidianus est, & nisi minus fuerit, non debet esse suspectus. Crassus autem & candidus à cerebro defluit, & admonet ad medelam capitis festinandum. Rubens, tenuis, frigidus, ueteris perfrictionis prodit iniuriam. Propter quod thermanticis potionibus calefieri animal oportet. Cœruleus, i. fuscus leuis ab interioribus uenit, q̄ indicat febrē. et ideo conueniēs leptiperisis. i. piretran adhibenda curatio est. Crassus autem, spumosus, & pallidus, à pulmonibus nascitur, qui suspīriosos ostendit: quibus difficile, nisi festinatum fuerit, subuenitur. Fabaceus uero à glandulis serpit, quæ celeriter aut eximēdæ sunt, aut ferro curandæ, ne cōuertātur in morbū.

De cuserino. i. cum post cursum sanguinis de naribus fluit. Caput . XXXVII.

**S**æpe sine ictu uulneris animalibus per nares sanguis fluit quod uittū cuserion uocant, quod præcipue contingit, si equus ultra uires agatur ad cursum: omni corpore oleo & aceto perungendum est animal, ac loco tepido statuendum, cooperiendum etiam diligenter, dandaq; opera ut mollior cubet, nec ad deambulādum cogatur, sed cibo diligentius reparetur. tunc erucæ unciam i. cum lacte cōteres & per cornu naribus infundes. Quod si eruca defuerit, aristologia unciam i, croci semiunciam cū uino dulci conterito, & deijcito per nares. Similiter coriandri uiridis succum exprimes & naribus infundes.

Depolypo. Caput . XXXVIII.

**S**i polypus oritur in naribus, præcluso spiramine strāgulabitur. stertet, humidi profluēt muci, picula passiōis plurima. hæc medicina subuenit. Si prope polypus fuerit, acutissimo excabatur ferramēto. Curādū his

H 2 rebus



## ARTIS VETERINARIÆ

rebus quibus circuncisa sanatur. Si uero altius fuerit, cauteriū plumbeū quādratū facies, ex quo calefacto polypū frequēter inures, & sic polypū sanas.

### De siderato. Caput .XXXIX.

**I**umentum si fuerit sideratū, his agnoscitur signis: Labia eius & maxilla nec non etiam nares eius deprauantur in parte, ita ut uix cibaria dentibus inlidat. Quæ etiam humoribus plena reperies, & cum uoluerit bibere, os usq; ad nares demerget in aquam; quia infirma sunt labia, quibus haustus attrahitur: aceto & sale lingua eius & labia diutissime perfricantur, donec sanguis emanat. Tertia die causticum crudū in illa parte labij imponis, quæ sentit iniuriam, cū cautela, ut prius alliges linguā, ne medicamentū uolentia noceat. Cum medicamento labia perusta uideris, aqua lauabis, deinde aceto & oleo fouebis, sicut alia uulnera, & hac ratione curabitur. Si uero maxillā sideratam habuerit & tortam, hæc est cura: De temporibus partis ipsius sanguinem detrahis, sinum bubulum acerrimo aceto permiscebis, & diutissime decoques, & parti temporum ex qua sanguinem extraxeris, calidū inducis sepius, ut exsicceat & curet, hac usus potione: Trixaginem, hyssopum syluaticum, origanum, serpillum, aristologiam, mannam croci pro æquis ponderibus cōundito atq; cribrato, ex quo puluere plenum cochleare cū aqua mulsa oleo & uino per narem sinistram ad unam heminā quotidie oportet infundi.

### De obseruatione flebotomi. Caput .XL.

**C**onuenit de ceruicis curatione dicturo, obseruationem indicare flebotomi; quia circa ea loca frequēter operatur. Detrahturus sanguinem animal à cibo abstinebis & potu, equali loco constitues, tunc locū supra ceruicem alius teneat et adstringat ad normā, ut uena facilius appareat, Deinde supra laqueū de sinistra manus pollice uenā deprimas, ne ludat, tum sagitta tangas. Dux autem uenæ à capite summo descendunt, & conueniūt se sub maxillis usq; ad gulam, inde à geminis uenis inferius quatuor digitis, feramentum deprimis, ne in gulam mittas, & bifurcum tangas, & iumentū oculis. Statim sagittam duobus digitis tenebis, nec plus ferri imprimas, quā extra digitos eminebat. Nihilominus etiam mediano digito manū tuā moderatō suspende, ut sit leuior, ne uehementius imprimas quā oportet. quia nō plus debet quā mucro descendere. Si parum apte profluat sanguis, iumento

foenū

foenum dabis, aut aliquid quod manducet. Agitatione maxillarum plus sanguinis uena profluat.

### Decerucibus. Caput .XLI.

**S**I iumentum ceruicem eiecerit, aut laxauerit, aut certe uertibulas eiecerit, uel extorserit, hac ratione curabitur: Deponito iumentū atq; constringito, & ceruicem eius extendito supra fossam, donec omnia uertibula laxentur. Post oleum uetus & axungiam ueterem tunsam colatāq; permisce, & cum calefacto eodem unguento ceruicem diligenter infundis, in locū reponis, & fasciā tenuem & amplam ex oleo tepido & uino madesactā alligabis ad corpus. Lanas quoq; succidas ex oleo & uino infusas supra conuerter, post regula solcagnijs nō minus quatuor digitis, ita ut tantum spacijs sit inter regulas alligatas & cōnexas, & lino constringes. Et si aestas fuerit quater in die suffundis; si hyems, bis. Cum modum fecerit, regulas solues. hoc die quinquagesimo & primo, post unctionibus iteris, donec ad sanitatē perducas. Si tardius confirmabit uires, regulatim & sollemniter uita curabis.

### De malandria. i. de uulneribus ceruicis. Ca. XLII.

**S**I iumento malandria de ceruice auferre uolueris, ita facies: Candentia prius cauteria pręparabis, deinde ferramento decarnabis, sic, ne neruos tangas, & uenulas quasunque uideris emitte sanguinem, aduris. ut possit cruoris fluxus inhiberi. Caue autem ne cauterijs plus aduras, et indignatione neruorū periculū facias. Post axungia ueteri ceruicem perficabis, & fascia munies. Sequenti quoque die cataplasma imponere incipies, ablataq; († serunta) lotio calido fovebis, deinde aceto & oleo dilues, & medicamentis aptis curabis. Si iam uideris cicatricem pilos renouare, puluerem ex canino capite combusto, & adipem suillum recentem permisce, & inducis; ex quo medicamento & sanitas consequitur, & pilorum redit ornatus.

### De distillatione ceruicis. Caput .XLIII.

**S**I ceruix distillationē patiatur, tumidior uidebitur quā oportet, foetorem habebit canceraticum cum humore nigro & liquido. Cuius foramina scrutaberis diligenter, ne ulterius inter neruos aut armorsum distillationem fecerit. Quod si accidit, pauca hinc difficulter euadunt.

H 3 Nam



## ARTIS VETERINARIAE

nam his signis discriminē ostenditur: stridet de pectore, & per nares humorē liquidū proijcit. hac ratione curabis. Foramina de super marrubio et sale pariter contuso implebis, atq; calcabis, subter autē cataplasmate aposto laxabis. Et si loci cōditio patietur, dieresim dabis ut foras per plagas humor emanat. tertio quoq; die calida urina lauabis. deinde traumatico & pannis lineis lymphida & purata iā uulnera sanare incipies, Cuius cōpositio talis est: erui pollinis sextarium, irisillyricæ uncias 2. thuris masculi uncias 2. miscebis, & facies cephalicum medicamentum, quo uteris ad consumptionem medelæ.

### De dissolutione scapularum. Caput. XLIII.

**Q**uod si iumētō scapule fuerint dissolutæ, diligēter inspicias, ne quas inter nervos & cōmissuras pendignes faciat, quod si inueneris quācūq; parte plagas accipere poterit, cataplasmatibus mollire, & scapello uel cauterio aperire curabis, ut sanies illa atq; collectio defluat. Foraminibus autē traumaticū & linteola sicca dabis. Si quod inter nervos foramē factū fuerit cautissime curato, ne ulterius aut ferrū aut cauteriū procedat, neq; putorem neq; putredinem lauis, sed magis siccis omnibus curare festina. Nā omnis humor distillationi præstat augmentū, Quum incisa uel iusta duxerint cicatricem, pro confirmatione in ultimo causticum imponitur.

### De armislæsis. Caput .XLV.

**S**i armus læsus erit, in medio crure utræq; soluētur uenæ, et puluerē thuris cum eo qui profluit sanguine copiosissime immisto armi lineantur. Quod si plus profluat q̄ necesse sit, stercus ipsius iumētū fluctibus imponitur uenis & fascijs alligatur. Postero quoq; die quasi apofersis sit, & ex eisdē locis sanguis detrahatur, atq; similis in omnibus cura procedit, Ab hordeo abstinebitur, scæno sustentabitur exiguo per triduum. deinde porri tres cyathos olei heminā miscebis, & per cornu faucibus infundes. Post sextum diem lente ingredi cogatur, & cum ambulauerit, mittatur in piscinam uel flumen aut mare ut natet, cum sparcia & pannis uincto pede, postea firmioribus cibis ad saginam pristinam reuocādus. Si leuiter dolebit, uino & oleo tepesfacto perfricetur in sole: si ualidius dolebit uentum in armū mittito, atq; pertundito à summa iuba infra digitos octo, ne cartilaginem tangas. Et cū inflaueris, ferula uel uirga molli armum cedito, sale & oleo perfricato. ipso die postre-

die postero stracta uteris; cuius hæc erit compositio: simile sextarios duos, si defuerint pollinis triticei sextarios duos, cum aceto acri & cum tribus ouis miscebis: sed ouorū solū albū mittes: adijcies etiā pulueris thuris uncias semis. Quæ omnia manu subigis, & in armos inducis, & per dies multos armum aqua calida cū flore sceni fouebis diligenter, ut mollescat, stractam quotidie imposito, de uino puro armum lauato, Additurus unguentum: baccas lauri selibrā, olei sextariū, uini boni sextariū, nitri uncias 3, sed nitrū et baccas lauri in puluerē rediges, & cribrabis. Ex quo in sole, cū calida armus fomentatus fuerit, inungatur ex tepido, & diutissime confricetur. Post syncrisma ad curandos armos inducitur, & cum melius habuerit natatum mittito. Quod si eiecerit iuxta consuetudinem ad rotam armum reponito, & supra scriptis medicamentis curato. Si non senserit, ultimum est ut uratur. Armi doloris hæc sunt signa: pedem priorem tantum quasi rigidum a foris extrahit (sed conuenit inspicere diligenter uirum ex percussura uel casu coeperit eā) & si ex iectura fuerit, prius locis suis reponenda sunt membra, & sic reliqua facienda. Quod si ex humore uel sanguine armi grauabuntur, sanguinem emittis à pectore uel unctionibus uteris.

#### Degenuemotouelbasi. Caput .XLVI.

**G**enu uel basim si semouerit ad tormētum rotæ uel macine, locis suis eiecta restitues, lanam succidam ex oleo & aceto infusam imponis, et alligabis ex more, tertio die solues fomentabisq; , post resinam induces & piculam, ad ultimum malagma uteris aut caustico.

#### De fractura articuli, cruris, uel coxæ. Cap. XLVII.

**I**mpulsu axium uel rotarū in circo uel in alijs locis uarietate casuum animalibus crura franguntur, aut coxæ uel articuli, in qua necessitate si extracutē fractura ossis erupit, hoc est, si exbercens fuerit, difficile noueris et prope insanabile curā. Similis desperatio est, si coxam fregerit, aut tacrocearia, aut supra gambam, insanabilis est casus, quia non recipit ligaturam. Si uero fractura sit sine uulnere in his locis, quæ constringi possunt, hac ratione curabis: Primo fracturam recompones, & facies, mundis scissilibus infusis ex uino & oleo conligabis, Insuper lanarū munimenta coniuges et regulas circumduces, lumen autē in cauterio uel in scalis uel in suspensio loco, ut

als. tatrocola.



## ARTIS VETERINARIAE

als. ne fractus loco, ut fractura uelut leuiter commeet, cui quotidie mane & ad uesperam  
ra flexibiliter. suffundes, tertio die solues, & expleta curatione ligabis. Quinto quoq; vii.  
aut ix. die eadem facies, donec corpus inducat. Post hæc adijcies muscum de  
uitice, aut salicis radicem, & oua cruda quinq; uerum non regulis, ut prius,  
sed circumductis ferulis alligabis. die tertio solues & fomentabis, de resina &  
axungia perunges: ubi cura profecerit, malagma uel causticum inducis, non  
ante tamen permittis stare iumentum quàm dies quadraginta prætereant.  
hoc autem tempus est quo diuulsa uel fracta solidantur.

### De flegmone, marmore, siue mallonibus. Cap. XLVIII.

**P**Lerung; in genibus, uel articulis aut phlegmon oritur, aut marmora,  
aut mallones. Quæ uitia ex malo humore generantur, & passionem  
cum deformitate tumoris ostendunt; Sed ista distantia est, quod phle-  
gmon tuber est molle, marmor duriciam ostendit ex nomine, mallo inflatus tu-  
ber est sine dolore, quibus recentibus potest facilius subueniri. Primo lanam  
succidam ex oleo & aceto induces, contra aquam frigidam & currentem  
animal constitues, Post sine ferro hac ratione curabis; Sinapis & salis ale-  
xandrini 2 4. aceti cyathos 2. axungie ueteris selibram, simul contres & in-  
duces, post diem tertium soluis. Si aperturam fecerit, spongiam cum aceto &  
lasere imponis, uulnera stuprico curabis. Preterea locum, quem curare uolu-  
eris, inducto pilotro decaluas, Radicem filicis & eruum & ficus aphros  
contundes in pila & induces in panno, per triduum ligatum patieris mane-  
re. Alij radicē filicis & eruum cum axungia ueteri & aceto acerrimo pu-  
tant oportere misceri. Item cineris quoq; de foco uncias 3. calcis uiuæ un-  
cias 6. uino subigito ad crassitudinem oximellis, & anteq̃ obdurescant, tu-  
bercula obline. Quod si assidue in recenti feceris, passionis molestia siccabi-  
tur: Si uetustiora sint, punctis subtiliter inurantur, ne ui & igne uiciantur.  
Talis quoq; cōpositio spargere phlegmon asseritur. Rhododanes uncias 3.  
bituminis, nitri ass uncias 3. axungie ueteris colatæ uncias 3. pleriq; dixe-  
runt cauteria cuprino candenti duobus punctis debere prærumpi, & phle-  
gmon effundi, licineo quoq; intorto cū axungia, & aceto, & oleo loca, de qui-  
bus muscus electus fuerit, satiare: per foramina etiam uisionis lemniscū trahi  
debere, ut quicquid humoris est, egeratur. Post hæc cataplasma et fœnugræ-  
co, &

co & uino confectum inducis, cū uista ceciderint & tumor resederit, lemniscum eximis, traumatico curabis, ad ulamum causticum inducis. Alij sagitta pertuso corio phlegmon effundunt, & lanā madidā cū aceto et lasare plagis inferūt, sic spongiā cum pusca acri & lasare supra uulnus imponūt: tertia die solliunt, lanam eximunt, & tetrapharmaco curant quinq; diebus uel septem. Si uero marmor habuerit, ex quo ualidius claudicet, & uix flestat articulos, inurēdus est leuiter. Cui post feruntam malagma, quæ cupressina appellatur, oportet imponi. Ex qua curatione sanitas redditur, & deformitas permanet. Si autem mallon in genibus uel articulis excreuerit, continuo curam adhiberi oportet, ne neglecta passione deformitatem tumor augeat, uel obduratione diuturna conuertatur in marmor. Aperies in pedibus siue genibus dextra ac sinistra uel ferro uel cauterio cuprino, sicut superius declaratu est, lemniscum traicies cum aceto, et sale, & oleo, ut supra, cataplasma imponis, donec seruator desinat et saniem faciat. Post purgatis uitijs lemniscos eximis, et traumaticū imponis, et ternis diebus interpositis solves, et medicamentum renouabis, donec sanetur.

## De aquatilibus &amp; ozœnis. Cap. XLIX.

**S**I aquatilia in articulis uel in gambis fuerint, frigido ferro oīno nō sunt tangenda, ne abundantia humoris iumento discrimen importet. Sed utēdum est scarificatione subtili, et detractione sanguinis, post quæ lauis ualidissimis, tam cum aceto quā cum optimo sale tunso, et oleo, uel axungia, per dies quinq; conliganda sunt loca. Si tardius hæc cura profecerit, utendū est feruētissimo caustico ut faciat ustiones. Alia quoq; ratione sanātur, si flectam qua trictores utuntur, et salem pro dimidia parte commisceas, lanamq; succidam ex aceto alliges, post diem tertium soluturus. Si aperturam fecerit farinam hordeaccam ex melle coctam cum lini semine & scenigræco inducis, ad ultimum malagma crudum impones. Præterea atramentum sutoriu, gallulas minutas, & alumen æquis ponderibus tunsum cum axungia miscabis, addito puluere mali granati, nitro, & aceto: quæ in commune decocta, uitium si adiungatur emendat. ficus sicca cum sinapi cōtusa mixto aceto imponuntur. Post diem tertium soluto medicamento, si tardius profecerit, eadem cura renouatur. Cum melius habere cœperit, allicem impone articulis. Alij opoponacem cum farina hordeacea coctum in modum cataplasma-

I tis im-



## ARTIS VETERINARIAE

tis imponunt. Nonnulli fabam fractam in aqua decoquunt, & mixto melle deterunt, & in panno inducentes curant. Ad ultimum malagma cupressinum imponunt. Plures calcem uiuam & cineres ex melle & uino commiscet, et ozœnis frequenter imponit. Ad ultimum caustico utitur. Quæ generaturarum et posterioribus pedibus adhibenda ueterum censet auctoritas, usus inuenit, addito sale et aceto cilicij ozœnas defricare, donec cruor aut tumor emanet. Quæ obseruatio etiâ si non persanauerit, sequentes tamē adiuuat curas.

### De pedibus reumaticis siue uentosis. Cap. L.

**I**nterdum reumatici iumentorum, interdum uentosi sunt pedes: quæ uitia nunquam tangenda sunt ferro, sed exiccanda per malagmas uel causticum, et aliquando urenda leuiter per uenas, ut cauterij meatus, qui humorem suscipiunt angustentur, et cōstringantur, ut pro tēpore afferant medicinā. Quia in totum, etiâ si intercise & adustæ sunt uenæ, non poterit talis causa sanari.

### De impetiginibus. Caput .LI.

**I**mpetignes quoque in articulis uel genibus inter neruos commissuralibus locis aliquando nascuntur, & sit uulnus simile ragadio, & non facile sanatur, nisi stalticis uel stipticis rebus, non sine alligatura, uel interdum adustione curetur. Malagmas quoque conuenientes oportet imponi.

### De uligine. i. dulcedine. Caput .LII.

**V**lignes etiâ in pedibus, cruribus, unguibusque, uel sub armis aliquando generantur, quas quidam dulcedines uocant, habent similitudinem scabiei. Quæ cum se diffuderint, pedes exulcerant ad similitudinem lepræ, & urgente prurigne animalia sibi partes illas corrodunt uel alternis pedibus confricando uulnerant. Quod uitium à crudo uel putrido humore consuevit generari, & idem curatur detractione sanguinis, unctionibus, & purgationibus uentris, si radix cucumeris (y)uatici cum nitri puluere misceatur infusa per fauces, humores pessimos purgat.

### De podagra iumentorum. Caput .LIII.

**P**odagra uero non nunquam solet occupare iumenta, cum hominum uitium transeat in pecudes: cuius passionis hæc sunt signa: nec stare potest nec ambulare, sed si cogatur, claudicat, & sæpe se projiciet, sicut indigesta ex  
bordeo

hordeo animalia faciunt, quæ propter dolorem non coquunt cibum, & ideo fit horridum, & corpus eius calebit, uenæ etiam extabunt, natura submissa erit, in pedibus sterco hærebit propter nimium eorum calorem, sicut subtritis solet euenire: cui proderit si non sinatur accubere, sed minutim deambulare & loco sicco, donec sudet, multorum manibus confricandum est, ut uehementius sudet, sanguinem ei detrahes à capite à superioribus uenis, sed non multum. sequenti die de posterioribus locis detrahes supra talos. tertio de gambis uel de sub ipsis dolorum locis. Memineris semper parum oportere detrahere. Aquam calidam dabis in potu, in qua adicies puluerem nitri, & triticam farinam, pollinem quoque thuris acetabulum plenum in uino maceratum infundis, & triduo per nares singulas cotylas: betas etiam excoques & aquam earum ad tres cyathos suffundes, & exercebis eum singulis diebus, uentre quoque eadem expurgabis ut auferatur humor pessimus, qui descendit in uenas. Hoc genus purgationis adhibebis: thimi acetabulum plenum in uino ueteri dulci macerabis, et singulas cotylas per nares eidem infundis, scenum uiride adponis. Quod si defuerit, sic cum nitro aspersum dabis. Si nihil profecerit, castretur, & uitio carebit nam podagra raro uexat eunuchos.

## De orthocolis siue stillosis. Caput .LIIII.

**O** orthocola etiam iumeta uel stillosa dicuntur, quæ contractione neruorum patiuntur in pedibus, & de capitibus ungularum calcant, & sunt rigidi articuli, plenas ungulas in terram ponere non possunt. Quod uicium nascitur ex enormitate onerum & labore confragosarum uiarum. sed hac ratione curantur: sanguinem ei de subcirro uel de coronis detrahes, ungulas bene compones, pollinem ex hordeo & resina cum axungia decoques, & ter in die perunges: tepida quoque in qua uerbena decocta fuerit, consuebis, et tota eius crura acopo perfricabis. Post dies quique cataplasmas eius ex poline hordei & lini semine & fenigraeco equis partibus ex uino decoctis. cataplasma imponis in omnibus cruribus ante acopo perunctis ab auriculis usque ad genua: quæ loca lanis succidis munies & fasciabis, & ter in die paulatim incedere facies. Si hoc non profecerit malagma hæc auriculis eius imponis: armeniaci, galbani, opoponacis, medullæ ceruinæ lib. 2. resinæ terbenitæ uncias 2. apocimatis librâ, resinæ frictæ librâ. S. oleum uetus quod sufficiat, lento igne decoques et colabis, impones in alutam per dies plurimos omnibus pedibus, donec sani

I 2 sunt. Sed necessar



## ARTIS VETERINARIAE

*necessaria festinatio est, quia sic solent remanere si tardius cura praestitur. At uero uros censent paulatim in articulis, sed raro citā pdesista medicina.*

### Depedibus & Ungulis. Caput. LV.

**A** Nimalium ungulae asperitate ac longitudine itinerum deteruntur et impediunt incessum. Ex tortura quoque, si in aspero uel lapidoso itinere iumenta coguntur ad cursum indignationes oriuntur. Postremo etiā si nulla causa praecesserit, ociosa in stabulis ex collectione humorum incipiunt claudicare. Oportet autem solum ungulae celeriter aperiri, ut per inferiores partes apostema digeratur, ne eruptionem super coronulas faciat, et difficile ac tardius cura procedat. Cuius haec sunt signa: Pedem priorem planum ponet, quod si suspēdere uideris gressum, ut diligentius intelligas causam, ungulam subradis, et locum quem uideris nigriorem, digito pulsabis, si cesserit in dolore et maturum fuerit, aperies, et saniem emittis, pendignam circuncides ad uinum, ex oleo roseo, et aceto et sale cum stercore ipsius linteola imponis, animal calciabis, tertio die soluis, si caro excreuit gramen decoques cum oleo et impones. Si uideris carnem ipsam nigrescere, inspicies ne aliquam fracturam habeat, neque clauum aut lapidem acutum, aut spinam propter quod fomentis et resina utaris, ut possit educi. Cum purum uideris uulnus, traumaticum impone. Post quod adijcies fuliginem siccam. Cum autem compleueris curam, resinam remissam et sulphur imposito. Quod si adhuc in alto apostema fuerit, hordcum uel fabam in aqua decoques, et ex inde fomentabis, ut exinde ad maturitatem possit adduci. Subtritos pedes fomentabis aqua calida, axungiaque ueteri perunges. deinde testa candenti decoquis, oleo post et sulphure pariter cōtrito lana candente leuiter ures pertriduum. Si uero contuderit, sanguinem de corona emittes, et calida fomentabis, axungia ueteri perunges, ouinum quoque, sterus cum aceto permiscebis, et imponis; quamuis alij caprinum efficacius credant.

### Si pulmunculum ad aperturā fecerit. Cap. LVI.

**S** i iumentum ad aperturā pulmunculum fecerit, scias totum solum, hoc est assen, hac ratione tollendū; ungulam subradis, deinde inter commissuram calcis et assis in circuitu incidis, subleuabis a parte priora et solum calcis retrouersus expelles, ubicunque pulmunculus fuerit, radis ad uinum, et adijcies.

Et adijcies lanamentum ex oleo, et aceto, et sale, et stercore ipsius imponas et calceas, tertia die soluis et tollis post hoc fomentabis: farinam hordeaceam resinam, et acetum decoques, per triduum impones; hoc enim medicamento etiam fracturam curabis, si frequenter apponas. post etiam traumaticum cum liniamento impone, et cum corpus fecerit, corium maligranati et bitumen iudaicum ex aceto decoques et impones triduo, et cum solueris iterum impone, donec obdurescat in cornu.

Si exungulauerit iumentum, et si suffusionem pedum patiat. Caput. LVII.

Si exungulauerit iumentum cura difficilis, sed profutura si non egebit industria, papyrum cadellarum purgatam, subtiliter carpis, intingis in oui crudi albugine circa nudatum pedem in circuitum pones, panno et fasciolo superligabis, post diem tertium soluis, fomentabis farina frumentacea, resina, aceto et melle pariter decoctis, interdum, lumentum pro farina mittis. Si vulnus non erit purum, uino tepido lauabis, liniamenta cum melle impone; cum purgauerit traumatico uteris. Cum autem duxerit cicatricem corium fabae cum pelle ceruina cumbures, ex melle temperabis, addito puluere bituminis iudaici et maligranati, cum aceto: alternis diebus medicamentum renouabis, donec cornu ungulam faciat. Ad ultimum sparciam ueterem contundes, ex aceto in olla noua decoques, ex quo ungulam obdurescentem obuolues, et ad plenam reuocas sanitatem. Si suffusiones pedes patiuntur, ficus siccas cum sale pro aqua parte contonde et ungulis impone.

De pedibus attritis siue mollibus. Cap. LVIII.

Animalibus exiguae ungulae crescunt, uel attritae reparantur, si alij capita 7. Ruti manipulos 3. aluminis tumsi et cribrati uncias 7. axungiae ueteris pondera 2. stercore asinini plenam manum commisceas ac decoques et utaris. Prudentius consilium est pedum tueri sanitatem, quam passionem curare. Coroborantur autem ungulae, si iumenta mundissime sine stercore uel humore stabulentur, et roboreis pontibus consternantur. Articuli quoque uel suffragines post iter calido foueantur uino. Naturaliter autem molles ungulae solidantur, si hederæ seminis duas partes et allumina rotundi unam partem pariter contundas, et calciatis pedibus per multos

I 3 dies



## ARTIS VETERINARIAE

die inducas. Item subtritis pedibus prodest, picis liquidae selibrā, aceti hennā nam, salis librā, hederæ folijs quantū sufficit pariter contundis, & laborantē quotidie pedes perunges. Mollissimæ ungulæ hoc uno medicamine, quo potentius nihil est, assolēt indurari. lacertā uiuū uiridē in ollam nouam mittis, adijcies olei ueteris librā i. aluminis iudaici selibrā, ceræ librā, absynthij tunsi selibrā, & decoques cum lacerto: Cum fuerit resolutū, calētia uniuersa colabis, abiectisq; ossibus & purgamentis, liquatum medicamen in ollam remittes, & cum ungues indurare uolueris, ungulam subradis, & factum unguentum in cannam uiridem mittes, adhibitis carbonibus, prope feruens, per cannam instillas ungulis; prouisurus ne coronam tangas aut ranulas, si his exceptis, in solo & in circuitu solidaturus ungulam confricabis. Memineris autem ungulas excresecdo renouari, & ideo interpositis diebus uel singulis mensibus talis cura non deest, per quam naturæ emendatur infirmitas.

### Dedorso confirmando. Caput . LIX.

**A** Nimalium dorso ut laboris plurimum sentiunt, ita diligentius sunt curanda. Exceptis enim his, qui deputati sunt circo, reliquum mulorū, equorū, asinorūq; genus sub sellis aut sagmis solo tergo prestat officium. Vnde laudabilior industria est, quæ incolumitatem tuetur, quam quæ cupit lesa curari. Nam diligentia defendit à uitio, si centones uel saga primū sufficientia, deinde mollia imponantur, & lota, atque ad tempus diligenter excussa, ne aliquid sordidum aut asperitatis inhaereat quod sub pondere inulceret pellem: tunc sagmarum uel sellarum mensura conueniens, & apta qualitas debet adhiberi. Si enim ista minora fuerint uel maiora, angustiora uel ultra modum lata uel quæ non congruunt, grauius nocent. Hinc enim collisiones, suppurationes, apostemataq; nascuntur, cum nimis locis iniqua libus premitur pondere, uel discites tracturam mercurius aut spina deteritur. Ipsorū quoq; pondere, etiam si in stratis nulla sit culpa, enormitas nocet. & ideo temperanda est mensura ne inferat uulnus.

### De dorso curando iam laeso. Caput . LX.

**Q**uod si dorsum sedentis iniuria timere iam coeperit in recentissima imballonem ceptarū i. calamos siccos unde sacces dependent, inquam peruentissimam mittis, & aliquandū maceratum, calidum super tu

super tumorem impones, fascia constringes uel cordis cum super impones, uia quoque nocte manere patieris absque suppuratiōe palpabitur tumor. Quod si clauum fecerit, farinam hordeaceam cum folijs caulium contundis pariter et tepidā impones. Cinerem quoque cum oleo miscebis, et inducis quā diu clauus cadat: cum ceciderit lyppara utere cum minutissimis pannis, uel mel cum linteolis; cum ulcus purgauerit, licio percurabis.

Si pulmunculus nascitur in dorso animalis. Cap. LXI.

**S**i pulmunculus natus fuerit in dorso, difficile est eum medicamentorum appositione siccari: sed si paruulus fuerit, cauterere, et precipue cuprino aperiendus est, ut sanies quā colligerat, egeratur: tunc curandus est sicut moris est uita curari: sed commodius est pulmunculum decusatim ferro secare et eximere, ita ut pellem ad modum præcidas, ne cum cicatricem duxerit, inueniatur epidarmus: oleum, acetum, et salē continuo addis in plagam, et ne nimius sanguis erumpat, stercus ipsius uulneri superponis et colligabis, die tertio folia caulium tinsa cum oleo, et aceto imponuntur per dies quinq; Cum iam ducere cicatricem coeperit, licio curabitur.

Si uulnus fecerit. Caput. LXII.

**S**i uero fecerit uulnus, indulgebis otium, ut diligentius curetur, et recepta sanitas confirmetur indutijs, nec imponendus est labor qui rescindat adhuc teneras cicatrices. Sanatur autem ulcus si gallas syriacas cōbustas cum melle superimponas. Pulueres quoque corticum pini et flos calcis uiuæ æquo pondere miscebis, et uulnibus inspergis. Pillulas quoque cyprossi tinsas, et cribratas, et cortices quercus trutos et in puluerē reductos mittis. Præterea ossa sepiarum et testas etiam ostriarum in puluerem rediges, et arei quoque uasis fuliginem pariter miscebis, quæ bene tinsa si frequenter asperseris, siccatum uulnus ducet celerius cicatricem.

Ut pilirenascentur. Caput. LXIII.

**Q**uod si pili tardius cresciunt, uiuā testudinē supra sarmenta cōbures, et cineres eius in nouū cacabū mittes, additis uncijs 3 aluminis crudi, medulla ceruinæ qd sufficit, et uino infuso decoques et diebus plurimis



## ARTIS VETERINARIAE LIB. II.

*alis. t. uino* **rinis** imponis reuocare pilos creditur. Puluis de fabis cōbustis, uel de lupinis crudis uel de folijs fici cōbustus t̄ seuo cōmixtus superponitur assidue. Quod si nulla pr̄cedēt causa decidūt pili, Spica nardi, uuas passas pariter tundes. Ex aceto decoques, calidumq; medicamentū glabro corpori impones.

### De denigrandus pilis albis. Caput . LXIIII.


**S**i album pilum nigrescere cupias, atramentū sutoricij scrupulos 7. *odo* laphinis succum scrupulos 4. *cepi caprini* quod sufficit pariter temperabis & uteris.

### Ut pilini gialbescant. Caput . LXV.

**S**i diuerso albos pilos facere uolueris, cucumeris syluestris radicum libram unam, nitri scrupulos duodecim, in pulueres cogis, heminam mellis adijcies, quibus permixtis uteris.

## FINIS LIBRI SECVNDI.

## IN TERTIVM ARTIS VETERINARIAE VEGETII LIBRVM, PROLOGVS.



**M**VLomedia me commentarios ordinante, ciuium, atque amicorum frequens querela, accepti operis cōtinuationem suspendit, desistentium aegritudines, moralesq; clamorissimas boum, cum magnopere peterent publicandum, si quid pro salute tam commodorū animalium scriptum reperiretur in libris. Cedens itaq; familiarium honestissimae uolūtatī, ex diuersis authoribus enucleata collegi, pedestriq; sermone in libellū contuli. Cuius erit praecipua felicitas si cum nec scholasticus fastidiat, & bubulcus intelligat. Maximo autē incitamento mihi fuit ipsorū boum utilitas & gratia, sine quibus nec terra excoli, nec humanum genus sustentari ullatenus poterunt. Cuncta igitur legumina siue frumenta bobus merito aratrisq; debentur: uinearum ipsarum usus

rum usus periret nisi eorū adminiculis subuehendis carpēta sudarēt. Quid de diuersorum onerum cōparatione referamus, dum inter mobilia & quicquid grauius est, absq; uehiculis pene reddatur immobile? Reliqua quoq; animalia, ipsæq; cohortales aues & eorum capiunt labore substantiam. Vnde enim equis hordeū, unde cibum canibus, unde porcis pabulū dominorū solertia ministraret, ni pararetur boū labore frumētā? Et ne longū faciā bobus debēt alimēta quicquid ali potest. Apud alios genus mulorū, apud alios camelorū, apud paucos elephātorū licet exiguus usus est, nulla potest natio esse sine bobus. Postremo ut ad prouidentissimorū uirorum scripta redeamus quorū firmatur auctoritas iusticiā iumentorum eade uiolenta derelictis terris ad siderum remeasse consortem. Quid potest laudabilius reperiri quā ut nomen exquisitum, boum fugaretur interitus? quod dum homicidia fierent permanebat in terris. Duplicem igitur solitudinem oportet impendi, ut sanitas incorrupta maneat, et ægritudo quæ ex casu uel negligentia siue labore contracta est, competentis medicinæ curetur ratione.

# VEGETII RENA

TI ARTIS VETERINARIAE LI-

BER SECVNDVS. TERTIVS.

DE OBSERVANDA BOVM SANI-

TATE. Caput primum.



T LONGÆVI ET SANI SINT boues, bubulcum cōuenit providere uel dominū, quatinus frigoribus calidissimo cubili muniantur, & si fieri potest, semper foco uicini sint boues. Quodam enim beneficio naturali eiusmodi animalibus semper ignis commodum est, siue q; inutilis & pestifer humor exudat, siue conceptū ex pastu uel opere frigus expellitur, siue in flammarum halitu interna curantur. Præsepium oportet extractum esse

K

diligenter



## ARTIS VETERINARIAE

diligēter, ne quid pabuli inter pedes animalū pereat. Bouile autē loco sicco statuendū est, assidueq; mudandū est, ita quod quotidie pabulū ad edendū inutile subternatur, ut boues siccius & mollius cubent. Parum quoq; fastidium est cum boues reuocantur ex opere, ut colla eorū ex uino tepido perfundantur, & diutissime perfricentur. Cum uero de uia uel pastu redeunt luculentia ahibita, priusquā deducantur ad bouile, aqua diluendi pedes, ne inherentes corpori sordes ulcera generēt, uel ungulas faciant molliores, uel certe molestiam manducantibus, uel inquietudinē afferant dormituris. Sed hyeme omni solertia frigus est prohibēdum, uelut aestiuis mēsisbus pura aura querēda. Per diē igitur sub umbra, per noctē sub diuo boues stare conuenit. Nō enim pauciores si aestuauerint, quā si alserint colligūt morbos. Preterea unum ouum crudum cum hemina salis et sextariū uini per singula capita septimo diffundi per commodum est. Iuuat etiam si allium tritum hircino misceas sepo, herbam quoq; uerbenam additam deteras, rutam herbam, etiam pollinem iniungas, & cum uino per os digeras. Cauendū præcipue est ne aut cursu nimio, aut longo itinere fatigentur, uel ullis grauioribus certe oneribus affligantur: nimiam enim lassitudinem sequitur ægrotudo, & omne animal est debile si rumpitur. A quam quidem istius generis animal non requirit nitidissimam, nec usq; adeo læserit si sordidam biberit. Sed tamen bubulci diligentius est procurare ut mundam semper & optimam bibant. Maxime autem studendū est ut competentibus redundantibusq; saturi semper habeantur et pingues. Omnis enim ægrotudo exordium sumit ex macie. Exhaustū animal celcius labor frangit, æstus uexat, frigus penetrat. Non solum enim aestiuis mensibus pascuum sufficit ubi frondes diuersi generis addantur, & minuat uarietas ipsa fastidium. Hyeme non tantum paleis, sed fœno quoq; et hordeo, & sæpius eruo saginādi sunt boues. Nullus autem uberiores ciborum repudiabit expensas, qui considerare uoluerit boum per inopiam percutiuntur quā cariora sunt precia. Aduersum boum morbos non minor adhibenda est diligentia quā equorum.

### De morbis boum, & primo de malleo. Cap. .ii.

**N**Am equinū genus morbus q̄ appellatur malleus, diuerso genere passionū emigrans per plures cōtagione cōsumit, boues quoq; idē morbus

bus interficit, sed à diuersis diuerso nomie uocatur, quæ plerūq; uulguſt ap-  
 pellat. Hic morbus bouē si quando tentauerit, istis agnosceſtur ſignis; erit pi-  
 lo horridus et triftis, ſtupentibus oculis, ceruice deieſta, ſaliuis aſidue per os  
 fluentibus, inceſſus pigrior, ſpina rigidior, ſaſtidium maximum, pauca ru-  
 minatio: cui ſi inter initia ſubuenire tentaueris, diſcrimen euadet: ſi per negli-  
 gentiam adhibeatur tardior cura, ueuſtioris morbi non poteſt ſuperari per-  
 nicies roborata. Inter exordia igitur tediāti boui aduerſus oēs morbos potio  
 iſta ſuccurrerit: tres ſemis uncias ſquillæ minutatim conciſas, præterea ra-  
 dices teneræ popinum effoſſas et diligenter lotas cōtondes in pila, et tria ex  
 hijs pondera addito ſextario ſalis in uini ſeptem ſextarios mittere, et per ſe-  
 ptem dies per os bobus ſingulos ſextarios digeres. Quod ſic toto anno aduer-  
 ſus oēs ægri tudines deſperatas boues ſtagnare uolueris, incipiente uere. i. ab  
 idibus februarij quindecim diebus continuis, hanc potionem dabis omni-  
 bus diebus, quæ uſq; adeo ſalutaris eſt, ut approbatū ſit integro anno boues  
 ſic curatos nullius morbi cōtagione tentari. Talis etiā compoſitio et morbis  
 reſiſtit, et uires animalū ſirmit: ſolij caprinus, ſolij mirti ſylueſtris, ſolij ci-  
 preſi atq; uncias tres diligentiffime deteres, infundes in congū aquæ, et una  
 nocte ſub diuo manere patieris, et inde unoquoq; boue tepefaſto per triduū  
 ſingulos ſextarios dabis: quæ potio ad ſtagnāda aīalia quater in anno facien-  
 da eſt ultimis tēporibus ueris, æſtatis, autumnī, et hyemis. Morbos ægri tudi-  
 nesq; depellit. tres uncias baccarū lauri, gentianæ, ariſtologiæ lōgæ, myrrhæ,  
 betonicæ diligentiffime detere et miſce cū mero, ex quo trinas heminas triduo  
 iugiter iumēto p os dabis. Spice quoq; allij trita, cū uino quoq; per nares in-  
 fuſæ purgāt capita iumētorū. oua cruda cū melle iumētorū ſaucibus inferun-  
 tur, atq; ita ſaſtidij ac nauſia diſcutitur. Expediſt tamen ſalē pabulis miſceri,  
 Marrubiū quoq; tritū mane cū oleo uinoq; diſfundere, thuris puluerē cū me-  
 ro ſiue per nares inieceris, ſiue p os dederis prodeſt. Nec minores medicinæ  
 bobus horū copia ſubminiſtrātur. Nam porros, rutā, apium, et herbā ſau-  
 næ ſi quis large deterat, et miſceat uino, ternasq; heminas præbeat ad potan-  
 dum ægrotantibus ſubuenit. Plurimiq; caulē uitis albæ cōciſam atq; ſerpillū  
 et ſquillæ partē in aqua macerāt, ternasq; heminas per triduū digerū, quæ  
 potio uentrem purgat, uires quoq; confirmat. Ad interna autem curanda  
 præcipue anurca creditur ſalutaris, ſi tantundē aquæ miſceas, et animal

K 2 bibere



# ARTIS VETERINARIAE.

bibere consuescat. Sed quia licet sitiat, potum fastidiat ignotum. Primo cibi asperguntur, deinde aqua exigua potio medicatur, ad ultimum pro mensura miscetur, & usq; ad saturitatem sitientibus datur. Quocūq; autem tempore, sed maxime aestate, si boues concitentur ad cursum, aut alius eorum ad pernitentem soluitur, aut febriculæ commouentur. Natura enim pigrū, et labori potius q̄ uelocitati accommodū, uehementer læditur si ad opus cogatur insuetū. Periculosum quoq; est, si ad præsepia sues aut gallinæ peruenerint. Nam bos cum gallinæ finem inter pabula sumpserit, statim nimio uentris dolore torquetur, inflatusq; moritur; cui hac ratione succurri cōuenit: Apij seminis uncias 3, cimini sextariū semis, et duas lib. mellis cōmiscet, et tepidū pos ifundes, ac tam diu ambulare compellis, & confricas manibus plurimorū, donec uentrem potio moueat. Gifni quoq; cum uino deterere, & per os dare creditur salutare remediū. Lixiuū quoq; ex arbore ulmi, uel cuiuscunq; generis ligni cinerem, diūmodo bene coctum, cū oleo miscebis, & liquidū ac tepidū diffundere per fauces, aduersus stercus plurimū prodest. Si aut porciniū stercus bos deuorauerit, statim pestilētiā cōtagionis solius mallei suisinet morbi. Qui cū semel in gregē uel armentorū uel domitorū inceserit iumentorū, statim oīa animalia quæ leuem suspicionē habuerunt, de possessione tollenda sunt, & distribueda illis locis, ubi nullū pecus pascitur, ut nec sibi inuicem, nec alijs noceant. nam pascēdo herbas inficiunt, bibendo fontes, stabulo præsepia: et quāuis sani boues, odore morbidorū afflante depereunt. Vsq; eo etiam mortua cadauera ultra fines uille proijcienda sunt, & altissime obruenda sunt sub terris, ne forte ipsorū corporum interna sanorū contingantur & pereant. Vno quidem uocabulo pestilentia appellatur, sed habet plurimas species, quas enumerare non licet (uel riget): facilius ipsa principia a diligentibus intelligi possint. Est itaq; humidus humor, quoties per os et nares humor effluit bobus, & fastidium ægritudoq; consequitur. Est siccus quoties nullus humor apparet, sed animal quoti die macescit & fit deterius, nec iuxta consuetudinem appetit cibos. Est articularis quoties interdum de prioribus, interdū de posterioribus pedibus claudicant boues, cum habeant ungulas sanas: Est & subrenalī quotiens a posterioribus debilitas appareat, & quia lumbi dolere creduntur. Est sarciminosus quoties per totum corpus bobus tubercula exeunt, aperiunt se, & quasi sanantur, & iterum in alijs locis exeunt. Est & sub-

tercutanea.

tercutaneus, quoties humor pessimus in diuersis partibus corporis bobus erumpit & decurrit. Est elephantiosis, quoties uelut scabies minutæ cicatrices exeunt extra coriū, et ad similitudinē lēticulæ. Est mania quæ refectis bobus eripit sensum, ut nec audiāt more solito, nec uideāt: ex qua passione celerissime moriūtur, quāuis hilares pinguesq; uideātur. Hi oēs morbi cōtagiōe sunt pleni, & si unū animal apprehēderint, celeriter ad oīa trāseunt, & sic interdū aut integris armētis, aut oībus donitis afferūt interitus. Vnde oī stūdio quæ semel tentata fuerūt segregāda sunt animalia, et ad ea loca mītēda, ubi nullū animal pascatur, ne cōtagiōe sua oībus periculū generet, et negligētia domini (sicut solet à stultis) diuinæ imputetur offēsa. Euincēdi tamē sunt, & exquisitis remedijs expellendi quāuis acerbissimi morbi. Paracem sup̄plassarijs comparas. Eryngion autem herba dicitur, quæ in litore nascitur prope undā maris, florē habet quasi aureū uel galbinē, folia eius sunt quasi folia cardui syluestris, inter arenas littorum largissime spargitur, has effodies, & in umbra siccatas seruabis, aduersus morbū tam equorū quā boū plurimū profunt. Ex quibus potio cōponitur ista: Radicis panacis, itemq; radicis herbæ eryngij ternas uncias, seminis quoq; foeni uncias 3. pariter deteres diligēter, addisq; farinæ triticæ sextariū, ita ut prius frumētū frāgas et molas: quæ oīa de calida seruēte cōspergis, et cū melle uel sapa nouenas ofas singulis diebus digeres. Præterea sanguinem marinæ testudinis colliges, & cum uino per os dabis. Quam quia inuenire difficile est, uulgariū testudinū prodesse estimant. Quod utrū bene opinātur, usus uiderit. Nā auctores de terrestri testudine tractauerunt. Puluerē et cassiæ fistulæ, necnon etiam thuris pro æqua parte admisces, ex eo unā semis uncia cum sextario uini ueteris in die per nares bouis infundis. Quod medicamentū per triduū facies. Morbi quoq; quos superius noīauimus amari sunt, & nō nisi amaris potionibus superantur. Nā cōtraria cōtrarijs potionibus curātur ratione medicinali. Ideoq; puluerē herbæ absynthij et crudorū lupinorū, herbæ quoq; centaureæ uel peucedani æquis pōderibus diligēter mīsces et in sextario uini ueteris trina coclearia singulis diebus, additis uncij 3. olei, per os dabis. Præsens quoq; remediū experimentauerunt: radiculā herbæ cōsiliiginis (quā alij pulmonariā uocāt, alij tantūdem radiculā) sinistra manu ante ortū solis collige (quia sic maiore uim habere creditur) tunc ad acū uel acutū cuprinum



## ARTIS VETERINARIAE.

ps auricula quæ lata est, quasi in circulo signatur, adprematq; ut rupta cute leuiter sanguis exeat. Quod cum ex utraq; parte feceris, medium orbiculū perforas ad acum, & in eodem foramine inseres: quod ubi exierit, omnis pestilentie uirus per ipsum defluit uulnus, donec ille solus locus, qui designatus est, putrescat & decidat, atq; ita animal liberetur. Vsci folia cū uino trita defunduntur in nares, atq; ita singulis bobus, siue uniuersis gregibus cum morbum incurrerint subuenitur. Suffimenta quoq; plurimū uiuant, sulphur, bitumen, allium, origanum, semen coriandri, carbonibus insperge, & cooperta boum supra uas, in quo suffimenta incēderis, diutissime continebis, ut fumus os eorum capiat, ac nares impleat, atq; ita ad cerebrum & interna saluari remedio penetret. Sed & totū suffimentare percomodū est, ut ab eodē morbo pncipes expellatur, et cætera pestilētiæ cōtagio nō coingret. Generalia igitur remedia aduersus morbos generales contagiososq; retulimus, nunc aduersus ualitudines, q̄ singlis aīalibus accidūt, nec in alia trāseūt, remedia subiūgem⁹

### De cruditate. Caput .III.

**C**Ruditās plurimum nocet, cuius hæc sunt signa: crebri ructus, cibi fastidiū, sonitus uentris, intensiōes neruorū, oculi hebetes: propter quæ nec bos ruminat, neq; linguā detergit ut solet. Prodest itaq; ut duos cōgros ubi bibi possit digerere per fauces. Post quos statim brassicas triginta caules modicas decoques, & ex aceto dabis, suspēsūq; aīal ab alio cibo penitus abstinebis. Alij cruditate laborantes, clausos in bouili detinēt, nec cibos præbent. Præterea lentisci et oleastri cacuminū pondera 4. deterūt, et cū lib. mellis atq; aquæ congio miscēt, quæ una nocte sub diuo mittūt, atq; ita faucibus digerūt. Deinde interposita hora, macerata infusaq; crui 4. lib. obijciūt, ab alio quoq; cibo uel potione prohibētur. Nā si neglecta fuerit cruditas, uentris inflatio intestinorūq; subsequitur, exprimit gemitus, cibosq; capere nō sinīt, nec in loco consistere, decūbere & uolutare cogit, caudamq; frequēter cōmouet. De expimēto medicina est caudā iuxta clunes resticula uel lino uehementer astringi, uiniq; sextariū cū hemina olei tepi. lū dare p fauces, atq; ita p mille quingēto passus bouē currentē trahere: si dolor permāserit, ungulas eius secare, et unctā manu p anū simū extrahere, & rursus agere currentē. Si tardius proficit, tres partes lauri diu cōteruntur, et cū duplici aquæ calidæ rantur. Si ista nō ualent, mirtæ foliorū syluestris duæ lib. tundūt in pila, & duæ ex

duæ ex calida aqua miscentur, ac per uas ligneū faucibus infundūtur. Atq; ita sub cauda quatuor digitis ab ano percussa uena sanguis emutatur. Qui cū satis effluxerit papyro ligata cauda restringitur. Post cōcitatus bos agitur usq; dū anhelet. Ante detractiōē tamē sanguinis adhibentur ista remedia: tribus heminis uini, quatuor uncie cōtriti olei pmiscetur, postq; potione cōgetur currere; duæ quoq; uncie salis cū decem uncijis ceparū atterūtur: mel quoq; decoctū admiscetur, ex quo facta collyria longiora nō parum ualida immittunt in anū, ut uērem resoluāt: atq; ita bos currere cogitur. Ventris quoq; & intestinorum dolor sedatur, si anseres natantes, & maxime anates animal aspexerit. Nam anas mulos, etiā equinū genus cōspectu sui celeriter sanat. Sed interdū in illa medicina cōuenit sequiturq; omniū uitū, quorum signum est si exuentū † mutosumq; uentrem ediderit, singulare remediū est cupressinæ quindecim, uerbenæ quindecim gallæ diligentissime trite quantum utræq; ponderatur tanti ponderis uetustissimus caseus, quibus pariter detritis admiscetur uini austeri sextarij 4. & in potu dantur, ita ut lentisco mixtaq; oleastri cacumina præbeantur. Si uenter coeperit fluere, & uideris egere corpus et uires capiti plerūq; inutile reddit, quia ex cibarijs ad mede † lam bouis nil peruenit, quod sic uideris per uentrē projicit quā quod mādū cauerit. Quæ cū acciderint prima die à cibo et potu abstinēdū est, ita qđ nec secunda die bibere permittatur, cacumina tamē oleastri et cannæ sylvestris, itēq; baccae lentisci et myrti dandæ sunt, nec post triduū etiā potestas bibendi nisi perparū cōcedenda est. Sunt qui ex folijs lauritenis librā 1. abrotanum hortense pari portione deterūt cū aquæ calide 2. sextarijs, atq; ita faucibus infundūt, pabulaq; supius præbēt. Aliqui uero 2. lib. ex uinaceis ad focū torrēt et cōterūt, et cū sextario uini austeris ad b. bēdū dāt, et cūmerata scapius cacūina obijciūt. Qđ si neq; proluuies uētris erit neq; intestinorū dolor recusat tamē cibos et prægrauato capite erit: lachrymæ quoq; oculis et pituita naribus currit, usq; ad ossa frons media uratur, auresq; ferro discindātur, sed uisura igne factæ ut sanescant ueteri urina bouis ipsius cōfricandæ sunt. Aures uero scissæ picula oleoq; curātur. Periculosum fastidiū bobus ranulæ faciūt, quæ aperiendæ sunt et allio cū sale pariter trito ipsa uulnera cōfricanda, ut omnis humor exeat prouocatus. Melius creditur si ad acutā cannā execes ranulam, post uino os lauatur. Interposito unius horæ spatio uirides herbæ

uelfrona



## ARTIS VETERINARIAE

vel froides dantur. Tam diu aut sustentantur mollibus cibis, donec facta uulnera cicatrices ducant. Si neq; ranula fuerit, & non appetent cibum, allium critum cum oleo naribus infundes.

### De Febre.

### Caput .IIII.

**B**os si febrile cœperit (quod ex uenarum inquietudine, & calore totius corporis uel oris intelliges) una die à cibo est penitus abstinendus, ita ut postero ieiuno eidem sub cauda exiguum sanguinem detrahas, atq; interposita hora trigesima paruos aculeos decoques, et ex oleo ac liquamine per os digeres, eamq; escā per dies quinq; ieiuno dabis. Præterea cacumina lentium, uel oliuarum, uel tenerrimum quenc; frondem, ac pampinos, si eodem tempore sunt, præbebis in cibo. Labra quoq; eius deterges ad spongiam, & aquam frigidam ter in die offendes ad bibendū, ita ut infra lectum bos febriens teneatur, nec antequam sanatus est dimittatur in pastu. Febrientis autem ista sunt signa; lachrymæ profluunt, grauatur caput, oculi semiclausi sunt, labra saluiis madida, longior & cum quodam impedimento tractus spiritus, frequenter et gemitus. Tussis bouum non minus diligenter sananda est quàm equorum: si recens fuerit, sextarius farinæ hordeacæ cum uno ouo crudo & hemina passi per os datur ieiuno: gramen quoq; concisum tunsumq; admixta farina fribæ frixæ & pollinis lentis, sextario aquæ calidæ miscetur, agitataq; diligenter per os diffunditur. Veterem tussim sanāt duæ libræ hyssopi macerate ex aquæ sextarijs tribus, quod infusum teritur, & cum duabus partibus farinæ miscetur, & per os datur, super quod aqua hyssopi, in aqua decoctum infusum decoctumq; etiam propinatur ad cornu. Porri etiā succus expressus cū oleo & ipsi febrile cum hordeacea farina remedium præstant. Radices quoq; eius diligenter lotæ, & cum farre triticeo contusæ, ieiunoq; datæ, discutunt uetustissimam tussim. Idem præstat eruum si in pabulis cū pīfana hordei molitum, & cum aqua tepida uel mulsā in fauces saluanti ore dimissum. Suppuratio, quàm apostema dicūt, melius ferro aperitur, post cū expressum pus aut sanies fuerit, sinus ipse, qui eā continebat, urina bubulina calida lauatur, ac linamentis ac stuppis siue lintrolis pice liquida et oleo infusis curatur. Quod si colligari ea pars, ubi est ulcus, non potest, lana candente seipsum caprinum aut bubulinum stillatur. Aliquātī, cū uitiosam partem inunxerint, tunc uirina ueteri humana lauant, atq; ita æquis ponderibus pice liquida cum ueteri axungia



axungia incoquunt & liniunt. Sanguis cum ex aliqua necessitate ad pedes uenerit bouum, claudicationē affert. Quod cum accidit, inspicito ungulā, inuenies eam ultra solitū calere, & uitiatā partem premi uehementer bos non patitur. Sed si sanguis adhuc super ungulas in cruribus est, ad triduū triti salis perfricatione discutitur. Quod si tantū in ungues descēderit, cultello leniter inter duas ungues aperies, & mundabis deintus, et postea stuppam sale atq; aceto infusam applicabis ad solū, sparta opere calceatur, maxime quæ datur operantibus, & in aquam non mittat pedem, sed ubi siccum est ambulat. Cui sanguis nisi emissus fuerit saniem creabit. Quo suppuratio etiam curabitur. Nam primo ferro circuncisus expurgatur ad uiuum. Deinde panis aceto & oleo & sale madefactis impletur, mox axungia ueteri & sepo hircino pari pondere ferro candenti stillantibus curatur, & perducitur ad sanitatem. Si sanguis in interiori parte ungulæ est, nec aperturam facit, & tantū claudicat animal, extrema ipsius ungulæ ad uiuum refecantur, & ita remittitur, ac stuppa uel linteolis cum sale et oleo & aceto infusis pes inuolutus sparta munitur. Mediam uero ungulā ab inferiori parte non expedit aperiri, nisi eo loco in quo suppuratio facta est. Si claudicat ex dolore neruorū, oleo & sale genua popliteq; & crura confricanda sunt calido aceto, & lini semen aut milium detritū infusumq; aqua mulsa imponendum est, & spongia quoq; feruenti aqua infusa & expressa, conspersaque postmodum melle, genibus circumdatur ac fasciis alligatur. Quod si humor est cum tumore, fermentū uel farina hordeacea ex passo aut aqua mulsa incocta imponitur, & cum maturauerit suppuratio, scinditur ferro, emissaq; sanie (ut supra docuimus) percuratur. Potest etiā radix lilij uel squilla cum sale, uel herba sanguinalis (quam palaganon Græci appellant) uel marrubium ferro aperta sanare. Omnis autem corporis dolor, si sine uulnere est, recens fomentis mellinis discutitur. Vetus autem uritur, Et supra uulnus uel butyrū uel caprina instillatur axungia. Scabies anatis trita oleo defricata; Eodemq; remedio rabiosi canis sanatur morbus uel lupini uulnus illatum. Vetus quoq; salsamentum utranq; perhibetur plagam curare. Ad scabiem quoq; presentior medicina ista est: si cumulā bubulam sulphurq; conteritur, admixtaq; myrrha cum oleo atq; aceto decoquitur, & cum tepescere coeperit, alumen scissum tritum inspergitur: quod medicamentum candentis olei illinitum prodest.

L Vlceribus



# ARTIS VETERINARIAE

Vlceribus gallarū eritarum puluis inspergitur. Succus quoq; marrubij im-  
positus cum fuligine sanat. Inſeſta peſtis eſt bubulun pecori (quā & magnū  
ruſtici uocant) cum pellis ita dorſo heret, ut apprehenſa manibus deduci nō  
poſſit à coſtis: quæ res non aliter accidit quā ſi boſ ex languore aliquo ad  
maciem deductus eſt, aut ſudans in corpore faciente refriguit, aut ſi lapſus  
ſub onere uehementer eſt inſuſus in pluuiā: quæ quandoq; pernicioſa ſunt:  
cuſtodire debemus, ut cum ab opere redierint boues adhuc eſtuantes anhelan-  
tesq; uino aſpergantur, & offula panis uino inſuſa faucibus eorum inſtra-  
tur. Quod ſi prædictum uitium inheſerit, expedit decoquere laurū, et cum  
calida & oleo & uino ſpinam dorſumq; animalis confricare contra pilum,  
ac per omnes partes apprehendere pellē, & uelut à coſtis ſeparare. Quod  
aut in loco calidiſſimo faciendum eſt, aut ſub diuo ſole ſeruente. Aliquantū ſe-  
ces uini & axungie cōmiſcent, eoq; medicamento tepido poſt ſomentū præ-  
dictum utuntur. Et cum grauis pernicies, ut cum pulmones exulcerantur,  
unde tuſſis & macies, ad ultimū uero phtifiſ inuadit, quæ mortem afferant,  
radix conſilignis, ſuccus porri, omniū hemina per meſuram olei maſcetur,  
& bibendi ſunt cum uini ſextario per dies plurimos. Nonnunquā & tumor  
palati ciborū ſaſtidium facit, crebrumq; ſuſpirium. Prodeſt palatum ferro  
aperire ut profluat ſanguis, cui eruum ſine corio maceratum ad manducan-  
dum dabis, uiridemq; frondem uel quodlibet aliud molle pabulum dum ſane-  
tur. Si in operibus contuderit collum, præſantiſſimū remedium eſt, ſanguis  
ab aure emiſſus. At ſi id totū in tempore quæ uocatur † amati amaticum ſale-  
tantum & imposito. Si ceruix mota & deiecta eſt, conſiderabimus in quā  
declinet, et ex diuerſa parte ſanguinē detrahimus, ex ea uena quæ in aure ui-  
detur ampliſſima, quæ ſarcocata prius uerberanda eſt, & cum intumuerit  
ferro aperiatur, effuſoq; ſanguine poſtero die ex eo loco emittatur cruor, et bi-  
duo uacatio operis datur. Tertio uero die leuis iniungitur labor, & paula-  
tim ad operis conſuetudinem reuocatur. Quod ſi ceruix in neutrā partem  
deiecta eſt, mediāq; intumuit, ex utraq; auricula ſanguis emittitur. Qui ſi  
inter triduum q; boſ uitium cœperit emiſſus non eſt, intumeſcit collū, neruiq;  
tenduntur, & ita nata duricies iugum non patitur. Tali uitio comperimus  
aptum eſſe medicamentū, ex pice liquida et bubula medulla, hircino ſepo, et  
axungia uetri, oleo quoq; uetri æquis ponderibus impositum cōcoquitur,  
quo



quod utendū est cū bos ab opere disiungitur. et in piscina in quolibet tumore  
 ceruix lauatur, cōfricaturq; diligēter prædicto medicamento, deteraq; diluī  
 tur. Si ex toto propter tumore cernicis iugum recusat, paucis diebus requies  
 ab opere danda est, et ceruix cū aqua frigida lauāda, et spuma argēti liniēda  
 est. Celsus quidē iumentī ceruici herbā quæ uocatur ama (ut supra dixi)  
 cōtundi et imponi iubet. Quæ ceruicē infestāt minor est cura. Nā facile sanā  
 tur per ardētē lucernā oleo instillato. Melius tamē est custodire ne nascatur  
 uenæ. Etiā colla caluescunt, quæ nō aliter glabra fiunt nisi cū sudore aut plu  
 uia ceruix madefacta est in opere. Quod si acciderit, puluere lateritio trito  
 priusquā deiungatur, bouis colla cōspergi oportet. Et cū exiccati fuerint, ex  
 inde oleo iterū infundi. Si talū uel ungulā uomer læserit, picem durā et axun  
 gam cū sulphure et lana succida inuoluito, et candētē ferro supra uinū im  
 ponito, et ungitō: quod remediū optimū facit, si clauū calcauerit, aut acuta  
 testa uel lapide ungula pertūdatur: quæ tamē si altius uulnerata est, latius ferro  
 circūciditur, ita inuritur ut supra præcepi. Deinde ex parte calceata p  
 triduū aceto suffuso curatur. Qd si uomer intrauerit, lactuca marina, quam  
 Græci cyniolā uocāt, admixto sale imponitur. Subtriti etiā pedes eluuntur ca  
 lefacta bubulina urina. Deinde fauilla sarmentorū feruētē calcare cōpellitur,  
 et pice ligda cū oleo uel axungia cornua eius unguntur. Minus tamē claud  
 cant si ab opere disiuñctis frigida pedes lauentur, et suffragines coronæq; ac  
 scissura ipsius ungulæ, ueteri axungia defricētur. Frequēter etiā uel ab aspe  
 ritate itineris, uel in proscindēdo duritiā soli, aut obuijs radicibus obuoluta  
 tus cōuellit armos: Quod cū acciderit, ex prioribus cruribus sanguis emitti  
 tur, si dextrā ex sinistro. Et si uehementius utraq; uitiauerit, etiā in ante  
 rioribus cruribus uenæ soluuntur. Perfractis uero cornibus, linteola, sale, atq;  
 aceto et oleo imbuta ponuntur, superligatisq; per triduū eadem infundun  
 tur. Quarta die tantum axungia cum pice arida et cortice pini pari pon  
 dere imponitur, et ad ultimum cum iam cicatricem producant, subito in  
 fricatur. Solent autem neglecta ulcera uermes creare, quæ si mane ex aqua  
 frigida perfundantur, rigore eius cōtracti, decidūt: Vel si hæc ratio nihil pro  
 fecerit, marrubium aut porrum conteritur, admixto sale imponitur, uel calcis  
 uiuæ puluis inspergatur, aut cucurbitæ uiridis succus cū aceto mittitur. Ideoq;  
 uniuersis ulceribus picem liquidam, oleum uetus et axungiam oportet adhi

L a beri, et



# ARTIS VETERINARIAE

beri, & extra vulnera etiam eodem medicamento circumliniri, ne infestentur à muscis, uel uermes creent cū uulneribus inciderint. Serpentis quoque ictus mortiferus est bovis, sed & minorum animalium noxium uirus. Nā uiperæ & celicia cum in pascuis bos improvide supercumbit, stimulo morsus imprimunt. Araneus quoque, quem Græci migaltem appellant, parui quidem corporis, non paruam solet inferre perniciem. Verum uiperæ uenenū depellit, supra tumorem, qui inflatur ex ictu, scarificatio ferro facta, ita ut herba quæ personatiam uocant, imponatur trita cum sale. Creditur radix si contusa conatur, uel siler montanum reperiatur, & trifolium simoniamū, quod fragosia locis efficacissimū nascitur, odoris grauis, bitumini similis, propter quod à Græcis asphalton appellatur, nostri autem propter figuram acutum trifolium uocant, nam longis & hirsutis folijs uiret, caulemque robustiorem facit quā pratense: huius herbe succus cum uino faucibus infundatur, atque ipsa folia cū sale trita imponantur in plagam. Quod si uiridem minime reperiunt, semina eius collecta & trita dantur ad potandum cum uino. Radices quoque eius cū succo caulis trite, addita hordeacea farina & sale, cū aqua mulsa scarificationi superponuntur. Est etiam præsens remedium si fraxini cacumina tenera contras cum sextarijs uini quatuor uel olei, expressumque succum faucibus infundas. Itemque cacumina eiusdem arboris cum sale trita lassis naribus superponas. Celiciæ enim morsus tumorem, suppuratumque generat. Idemque facit muris aranei. Sed celiciæ morsus sanatur, si acu ærea locum læsum compungas, et creta cimo ea ex aceto oblinis: Muris uero perniciēs, si animal ipsum oleo mersum neces, & plagam dentium ex eodem confrices. Quod si non fuerit, contritum ciminum cū picula & axungia, ut similitudinē malagmæ habeat, impositū plagæ, perniciem submouet. Quod si antequā tumor discutiatur suppurationis fuerit generata, optimū est ignea lamina uel cauterio collectionē aperire, qui quid uisiosum est inurere, atque ita cū liquida pice & oleo inlinere. Quidā mium mulsem araneū creta figulari circundant, & colla bouum suspendunt, moxque ipsius bestie submouent. Oculorum uitia plurima in illis sanantur. Nam siue intumuerunt aqua mulsa triticea farina cōspargitur & imponitur, siue album in oculo est salis fossilis Hispani uel armeniaci, uel cū melle pexmixti uitium extenuant. Idem præstat trita sepiæ testa, & per fistulam oculi iter in die insufflata. Prodest etiam radix, quā Græci silpion uocant, nostri

41178

autem laserpitium, huiusmodi quantum uolueris ponderis cū decima parte salis armeniacy & cū fistula oculo insufflas. Quæ radix tunsa et cū oleo lentisci mixta uitiū expurgat. Si genæ humorē profundūt, lachrymisq; uisus cōfunditur (quam epiphorā uocant) polenta ex hordeo mulsa aquæ cōspersa super genas superciliaq; imposita reprimit humorē. Pastinaca quoq; agrestis, quā armoneaceā uocant, cū melle trita oculorū sedat dolorē. Memineris uero quoties mel aliō sue succos remedio adhibes, ut prius pice liquida cum oleo circūlinias oculos, ne à muscis apibūsue uel uestpis infestetur, quas dulcedo mellis inuitat. Plurimūq; hirudo, id est, sanguisuga, cū foris iuxta fauces heret, sanguinē trahit, eam à iumento digitis oportet auferri: sed si interiorius sit, ut manu detrahi nō possit, cannā uel fistulā perforatā inserito faucibus, ac per eam calidū oleū infundes. Nam eo cōtactu bestiolæ inportunitas recedit. Odor quoq; cimini super carbones impositi ubi sanguisugam afflauerit, euellet à uulnere. Quod si stomachū uel intestinū tenuerit, calido aceto p cornu infuso necatur. Machina quoq; describēda est fabrica, qua cōclusa cuiusuis generis iumēta bouesq; curātur, ut et tutus ad pecudē medendū accessus sit, nec luctando quadrupes aut mēbra cōuxet, ac sic remedia despuet. Roboreas asses cōstringis, soliū, quod in longitudine nouē pedes debet habere, in altitudinē pars posterior duos sinipedē: Pars uero quæ ad priora animalū pertinet quatuor pedes: textūtur ita ut uelū in caudā ductū non possit exire. Sed à parte posteriori paululū latiorē, à priore strictiorē machinā cōpingi oportet. Cui trāsuerfum trigillū ad modū iugī confirmandū est, ad quod equorū capita uel boum cornua religātur. Nam reliquū corpus ad temones socios uel funibus alligetur, ut iuuamentū præstetur ad medentis arbitrium. Quæ machina ad omnium maiorū animalū medelā solet esse cōmunis.

Ab initio huius tertij libri usq; huc, nō habentur in uetustiore codice, et totū censetur una rubrica (ut ait) quatuor capitum: & propterea subsequens reputabitur caput secundum.

#### Si uermes animal fecerit. Caput .II.

**S**I uulnus in dorso, aut quacūq; parte corporis cœperit habere uermes, & timetur ne putredo uulneris transeat in cancrum, nepitā & cedrinā

L 1

sive cimi



## ARTIS VETERINARIAE

*Mercurius* siue ciminū ut cicutā cōteres ex aceto, & imponis. Calcē quoq; uiuā ex aceto acerrimo temperatā necare uermes experimenta docuerunt. Si tuermiculus dorso putredinem fecerit, utilissimum est cauterizare subtiliter, postea asicū cū melle & uino cōterere & imponere. Pannos quoq; minutos cū oleo & aceto uulnera purgare manifestum est. Quo factō si necessitas fuerit, ustio rursus adhibetur. Ad ultimum cornu caprinum combustum & contritū uapet, ulceribus superinspergitur, ut recuperetur & sanitas ei detur.

### De cura lumborum. Caput .III.

**L**umborum quoque cura uicina est. Nam animalia aut cum nimio pondere, aut cum transcendere fossam conātur, si posteriores resederint pedes, aut nimio frigoris dolore renū cōtrahūtur. Ideoq; aqua calida cū flore fœni diutissime consouendi sunt lumbi. Inunctionibus etiā calidissimis perficiādi, et ad ultimū afro nitro diluti, inducto caustico corroborandi. Quod si dolor uehementior fuerit, de inguibus soluendæ sunt uenæ, & oleum cum axungia sanguini qui profluit immixta, renibus inlinuntur. Et si necessitas fuerit, cataplasmis utendum est. Potio quoque renibus subuenit, si pillulas cypresi incidis duodecim supra carbones, nūtri quoq; uncias tres asis, et utraq; in puluerem redigas, cum uncis tribus mellis, & uini ueteris sextarijs tribus, & olei boni tribus uncis, quod per quatrimum aqua parte faucibus digeras. Vitio lumborum medetur hemina seminis brassicæ cum sextario polentæ attusa ex aqua frigida subacta atque imposita dolentibus locis. Si sembrum quoque cum polentæ sextario & aqua subactum medetur. Efficacius tamen est si cypresi folia ad modum heminae diligentissime contundas et polentæ sextarium admisceas, acriq; aceto subactis dolenti imponas. Præterea resina dura uncias sex decoquas ut lique scat, cui seruēti superaspergis hordeaceam farinā quā diu inspissetur ad similitudinem puluenti, & diu subactis, & calidum ita ut manus pati possit, super illius renibus. Quod si frequenter renouaueris, & dolori subuenit & tumori. Si uero tanta indignatio fuerit, ut eiusmodi non sentiat curas, aut cauterio cuprino locis opportunis urendo deprimes puncta ne deformetur animal, taut si uilius est, aut necessitati aptum, quos decori gratia lare s, sicut moris est, uteris.

**R** Quibus signis renū dolor indicetur. Ca. II. II.  
Etiam autem dolor his agnoscitur signis: Posteriores ungulas trahit, lumb

bit, lumbi uacillabunt, cauda deiecta erit, & foetulēter mingit, ilia dura atq; contracta. Interdum tales sunt renes, ut sanguinem mingant, et si nimium effuderit incurabilis est passio. Si parū cruoris abundauerit, scito posse curari. Cui post detractum sanguinem uel de matrice, uel de femoribus, hanc potionem dabis, uidelicet porri sectiui succum ex aqua.

## De internis musculis. Caput .v.

**S**Aepe musculi, qui in renibus sunt, uexantur ex casu, & exteriores facilius curantur, si iusta medela afferunt tarditatem. Optimū est quoties ceciderit iumentū loco nō moueri, & aqua frigida perfundi, & postmodum unguentis uti. Quae passio ista cōsuevit ferre indicia: renes obdurescūt, cōtrahuntur testes, coxāq; trahit, & colligere se nō poterit. Quae ualitudo nascitur ex itineris longi fatigatione, aut ab infractu cliuorum uiarū. Incitatio quoq; cursus, & saltus extensio hanc adferunt causam. Sanguinem igitur ex uisceribus oportet emitti, pro ut qualitas corporis patietur. Utendū est potionibus etiā ad ualitudinem necessarijs, molli dormitione animal collocandum.

## Si talus exeat animali. Caput .vi.

**E**X perfrictione nōnunquā aīalibus exit foras talus, qui hac ratione curatur: Scalpello scarificabis, praecipue loca quae uidentur eminētia, similiāque uesiculis, scarificatio digitis exprimitur et decarnatur, puluere salis perfricatur, donec cum sanguine actus humor exiccetur. Post calida & sale fouebis, & deprimendo intus remittis, & continuo reuertetur ad locum unde exierat. Altera intus digitis mustis inlita lypparia uel meliloto, donec sanetur. Quod uitum si ferro tangere dubitas, hoc medicamento curabis quotidie: Castorei uncias tres, salis triti pondera duo, salis armeniaci lib. unā, sinapis pontici uncias 6. omnia tusa et cribrata pariter decoques, impones talo, & alligabis quotidie, aut lixiuio calido fouebis, et medela cōtinua usq; ad sanitatem. Potionibus autē thermanticis calefiet agrotū. Alij in hac passione cū axungia ad manus talos fulciri & reponi oportere dixerūt, postea spongia apponi caudam supra alligando. Si tamen diebus aliquot fuerit cura neglecta, prius foueri ad sex ex lixiuio, uel sale & urina calenti, & sic reliqua curationibus impleri.

De dolore



## ARTIS VETERINARIAE.

### Dedolore renum. Caput .VII.

**D**olor renum animalibus sæpe contingit, his proditur signis: nec incedere poterit, nec cubare, ilia eius inflantur et obdurescunt. quorum ista curatio est. Sanguis de utrisq; femoribus emittitur, postea lotiū uetus & putridū in uase supponitur, & lapides molares seruētes mittūtur, animal sagis diligentissime usq; ad ungulas operiatur, ut uapore lotij uena testium sudent, post aqua calida consouentur, nitrum & alumen scissum pariter conteres diligenter, & admixto oleo testes perunges fricando. Si molares huiusmodi rei proditur t̄ ma lentis heminā unā decoquis, admixto uino mortario teres, cypressi folia 3 4. mollissime pariter trita commiscis, tantundē etiā suillæ adipis adiunges, uinumq; uetus desuper sparges, panno inlinitū testibus apponas, donec sanitas procuretur. Si tardius dabitur sanitas, testes subterstilatis cauterijs urito, uel leuiter scarificato.

### Detumore testium. Caput .VIII.

**H**ordeum cōburito, pulueresq; ex eo trito suillæ adipi misceto, ex quo medicamento mane et uespere testes illinito. Physicum aut̄ creditur, testes animalium ablutos canino felle sanari. Alij authores aqua calida testes cum dolent fouendos esse duxerunt, suffumigandos etiā uiridibus folijs, cypressiq; arboris specialiter mederi testibus creditur. Sed si defuerit testes ardentes nihilominus in aqua calida mitti, & inde suffumigari, post creatas cimolias cū stercore bubulino ex aceto acerrimo calentes induci, & quotidie reuocari, quousq; sanitas subsequatur.

### Si natura reuocari non possit. Caput .IX.

**S**i natura iumento excedit, & reuocari non possit, in aqua frigidissima constituendum est, & ibi fouendum, & sublitam manum in anum eius iniicies, & contra uescicam fricabis, post diligenter cooperies ne perfriescat. Potiones dabis, sterces suillum quotidie ex uino, aut in aqua dulci, donec liberetur.

### Si iumentum sanguinem minxerit. Ca. X.

**S**i iumentum sanguinem minxerit, uel adsellatum fuerit, hac ratione curabitur: De superiori uena sanguis auferatur, aphodilli quoq; herba redix teritur

dix teritur, & cum uini albi dulcis duabus cotylis per os infunditur, quæ glutinosa uideatur. Prodest etiam farinam triticeam cum adipe suilla et puluere corticis mali granati decoquere, & non crassas potiones, sed liquidas per os fundere, et non solum à cursibus, sed etiam ab ambulatione abstinentum est, ut glutinetur uena quæ interrupta est. Contingit enim cursu uel saltu, ut in trisecæ uenæ rumpatur, quapropter rebus stipticis, & his quæ cōsolidationem faciunt curentur. Super renes hoc anacollima oportet imponi; bulbos tascedas uiuas contusas, allia quinque, anagallici libram, quæ omnia pariter bene trita commiscis, et renibus eius imponis. Qd̄ prodest etiam illis, quibus euulsi uel emoti sunt renes. His autem quibus per nares effluit sanguis, pusca frigidissima caput eius fouebis, modicum salis adijcies, post anacollima in capite & in temporibus oblinis, & in medicamento constrictis uenis fluxum sanguinis reprimis.

## De dysenteria. Caput .XI

**S**i dysenteria iumentum apprehenderit, reuersatur eius extalis, quæ ut curetur circumsecanda est cautissime, ne intestinū, quod præpositū est extali, frangatur. Procidit intestinū à cōtactu, uitæ periculū facit si tangatur: quod semel nō redit, & sic remanebit, & paululū exit extalis supra.

## Si otiosum animal sanguinem mingat. Cap. XII.

**A**nimalibus otiosis & pigris contingit expletura sanguinem mingere, cum hoc quod abundat, erumpendi per urinā inuenit uiam: attenuati & exhausti animalis interdū est in terra sanguinea. Quod accidit, aut ex nimio ascensu, aut labore ponderis, aut nimietate cursus sodalis. Qui ex delitijs aut abundantia contraxerit passionēs, de matrice auferunt sanguinem: attenuatis uenas laxare cōtrarium. Vtrisque tamen salutaris est potio, si lac caprinū cum à matricibus obolis, & uitiolari herbe succo paulillos facias, ex quibus unum per os frequēter infundas. Certissima quoque ad ipsorum salutem potio prædicatur, si draganti unciam semis, mespili æstheracis ætres, nucleos pini. hos purgatos ducentos decē infundis in uino optimo, & diutissime, post ad magnitudinem nucis auellanæ cum apibus attritos et uini sextario resolutos dabis ad cornu, & faucibus digeres per dies continuos septem, quod etiā omnibus prodest cum fabæ magnitudine cum ouo dedisse.

M

Si animal



## Si animal sanguinem uomat. Caput .XIII.

**S**I uero sanguinem uomat, oportet genestæ succum cum uino atq; porri succo lixiuio oleoq; permixto faucibus infundere. Aliquando animalia sanguinē uomūt, q̄bus hac potiōe succurritur: absynthiū pōticū et spicā nardi aquis pōderibus in cacabo nouo cū aqua decoques, & dabis in potu.

## Si percussa uena claudī non possit. Cap. .XIIII.

**S**I sanguis interdum nimis per uenam cum percussa fuerit ut claudī nō possit erūpat, remediū est, stercus ipsius animalis supponere fluentibus uenis: Aut si perseverauerit, urere cauterio subtiliter ne nerui ledātur. floccum etiam competenti oleo tinctum uenæ admoueo: etiam assem lineum in uena qua sanguis profluit, ponis, & ligas, præsens est remedium.

## De indignatione uesicæ. Caput .XV.

**V**esicæ indignatio generatur ex plurimis causis. Quapropter urinae difficultatē, immo præsens discriminē inportat. De qua ualitudine diligēter tractari cōuenit, ut passioni competens medela succurrat: quæ his agnoscitur signis, mingere nō poterit, omnia crura flectētur, dimittitur uenter ad terram. Et si difficulter mingit dysuria appellatur. Sed quando guttas per ueretrū mittit cū labore, strāguria dicitur. Quū in totū non potest mingere dysuria appellatur, & uicinus est morti. Propter quod extēsiōnes & tubercula nascūtur in dorso, & præfocatio circa fauces ex dolore uentris. Cui hac ratione succurris: de pectore uenas pungis, & sanguinē quantum uidebitur detrahis, & sic accipitur lauamentū. Præterea manū tepidam cū oleo in anū mittis, et si qua stercora iueneris intus, quia impedimentū præstant, attrahis. Post cū libra olei, salis triti plenū acetabulū misces, & calefactum inijcies in anū, iumēto in locis pronis posito, ut facilius ad interiora descendat, dulcedo enim sequitur ac solutio uētris, & dolor mitigatur. Quæ remedia si tarde subuenerint, manus & brachia perungito, & cū magno sensu atq; cautela manus inijcito, et in partē dextrā et in partē sinistrā, et sic manū plenā leuiter præmito, ut incipias in hac procedere, & sic liberabitur. Valde spinæ est cōtrariū. Ex his causis passio ita descēdit, si iumentū in ope aut cursu magna pte duci cogatur, et urinae facili spaciū denegatur, et a uesicæ meatu usq; ad

usq; ad ueretrū nascitur tumor, & cū dolore egestionis foramē angustatur. Ediuerso, si iumentū exerceri solitū, diebus plurimis steterit, indigestione nascuntur spurcitie, & humores efferūtur usq; ad uesicā, cōpunctiones etiā et morsus urina'i fistule praeſtant, ex quo stranguria plerūq; cōtingit. Ex perfrictione & indignatione dysuria solet uenire, cum nimio rigore meatus intumuerit. Et ideo calefactionibus diuersis à frigore soluenda est iniuria celeriter. Interdum & indigestione hordei, & cum aquam frigidā auidissime biberint, dolores ueneris animalia patiūtur, & propter uicinīatē commota uesica stranguriam sustinent. Aliquando & sterco pullinū, & alia noxia in cibo sumpta, cum inflationem fecerint, impediunt minctionem. Bestiola etiam quae appellatur uulpestres, arania similes, cum deuoratae fuerint animal praefocant. Aqua quoq; coeno uel limo turbida si bibatur, meatus impedit minctionis. Vermes quoq; uel lumbrici in intestinis cum ex ulcere uenerūt, uescas ledunt, & dupliciter animalibus discrimen important. Quod his deprehenditur signis: animal quod tardius mingit latera sibi scalpit uel terrā mordet, scias eum uermibus uel lūbricis extorqueri. Cui hac ratione succurris: brassicae folia subtilissime cōtundis & cōmiscis boni uini cotylas quatuor, et per sinistrā narem infundis: laser quoq; syriacū & nitri puluerem cum uino decoquis et per os digeris, Inambulationibus et leni cursu exercebis in loco molli uel herbido, uel ad aquam leuiter abeuntē ad urinam inuitabis. Si ubi aliquod aliud animal minxerit, teneatur, facilius prouocatur. Quae praemittuntur ut ueniatur ad curas: aqua enim calida diutissime lumbi fouebuntur & renes, tunc haenam agrestem ex uino dulcissimo duabus cotylis decoquis, & per sinistram narem infundis colatos humores; ficus praeterea optimas decoques in aquae cotylis quatuor, mixtoq; nitri puluere similiter diffundes. Aliū quoq; cum uino decoctū, & per sinistrā narem infusum producit urinas. Memineris statim cum in passionē ceciderit, hordeū eis subtrahendū penitus & potus, herbas uirides uel farragines ad sustentandum dandas. Sarमारū autem aequitatus ueteres plurimū ualuerunt, usus inuenit, ut animalia à collo usq; ad pedes inuoluantur de sagis, suppositisq; carbonibus uiuis, addito castoreo, suffumigentur, ut totum uentrem testiculosq; eorum castorei fumus euaporet, & confestim detractis carbonibus cooperti deambulant, & mingunt. Allumen salsum, & sale fricato admixtū quoque oleo,

M a & melle



## ARTIS VETERINARIAE

& melle collyrium longum & tenue facito, & in ueretri ipsius foramine in-  
 serito, continuo prouocabitur. In ano panacis quantum digiti minoris extre-  
 mitas est, dabis. Alij cepas acerrimas & leuiter contusas tres aut quinq; po-  
 nunt in anũ, & sic de ambulare faciunt. Ad urinas inuentus est qui affirmat  
 & ungulam equi ipsius radi & teri cum uini sextario, & per nares infundi  
 ad celerem mictionem. Si non tali ratione prodesset, betas & malas deco-  
 ques, & aquam earum calentem cum melle ad unũ sextariũ naribus infun-  
 des. Si tempus uirides denegat cibos, foenum mellicrato aspersum praebebis;  
 uel succum ptisanæ hordeaceæ cum mellicrato similiter dabis. Aliquantum ros-  
 marinos decoquunt, & ex ea calida fouent. Alij cimices tritos in nares ani-  
 malis mūtunt, & aliam super naturam qua mingunt cōfricant. certissimum  
 dicitur. Porros decoques, & succum eorum exprimes ad sextarium 1. et cū  
 uini ueteris et hemina olei acētābulũ permiscēs, & per narem dextrā dabis,  
 deambulādo ducis. Vulgare et uerũ est remediũ, lutiũ de uia ex lotio cuiuscũq;  
 equi factum, uinoq; permixtum & colatum naribus infundas. Apij radices  
 aut mellicrato decoctas praebebis, pulueremq; thuris ouumq; crudũ cum ui-  
 no dulci permixta & calefacta supra renes & ilia inungens consuebis. Ex  
 melle quoq; decocto & sale collyria longa & tenuia foramini immittun-  
 tur quo emanat urina. Musca uiua & loco ipsi immittitur, uel mica thu-  
 ris apponitur, & de bitumine collo inseritur, ut prouocetur urina.

### De fluxu uentris. Caput .xvi.

**Q**uibus modis strictus uenter solui debet sæpe prædictum est, Nunc  
 exponendum est quemadmodũ, si solutus, postea restringitur. Et  
 enim hoc animalibus periculosum nimis est, nisi uelox medicina sub-  
 uenerit, cuius necessitas de experimēto principali tenendũ est. † Clistere un-  
 ciam ex uino austero dabis, caryotas tundis & gallas syriacas, & exinde da-  
 tur potio salutaris. Talis quoq; subuenit cōpositio: ceræ uncias 2. lardi librā  
 unā, piperis uncia semis, picule semiuncia diligētissime tundes, cassiæ un-  
 ciā semis trita pariter conspergis, offas facies, solito more intinges in cera cū  
 remissa est. Sic quoq; digeres stercoris ouis libram, & in aceti et mulse sex-  
 tario per cornu dabis, herba rubea restringes, si dederis in uino spongiam.  
 Offam intinges in pice liquida, post cōbures, farināq; eius cum uino austero  
 defundes.

defundes, farine triticee heminas quatuor pariter cōmifces & digeres. Nitrum quoq; , si potest fieri, uirgineum diligentissime tritum & in puluerem redactum, cum aceti femiuncia diligentissime tritum dabis heminam. Puluis ex pumice datus cum uino in potu, mox medetur.

## De uerrucis. Caput .xvii.

**A**lijs quoq; partibus corporis nascuntur aliquando uerrucæ, & uitiū difformitatis important, hac ratione curandæ: lino subtili confringentur ipse uerrucæ, in causticum crudum imponitur & sponte decidunt. ferro etiā præciduntur, & de cauterio leuiter adusta sanantur.

## De uitijs coxarum. Caput .xviii.

**M**ifera fit coxa, cui de uenis femoris sanguis emittitur, & in uase diligenter excipitur, admifcetur etiam puluis sulphuris, nitri, baccarū lauri, simul tritis, & contra pilos diutissime perfricatur, & per triduum sic permanere permittitur. Aqua etiā, in qua uerbena coctæ sunt tepida (datur indie) fomētabis: pedes quos sanos habet glante ferreo, uel si defuerit, partea calceabis, cui lemnifcos subijcis, et addita fasciola diligentissime colligabis, & suppositiciam facies parti illi quæ misera est, ut planas ungulas possit ponere, in crisma etiam perunges in sole non minus quā hora, contra incisuras quatuor foraminibus cauteri pertunde, & pannos uel lemnifcos ex aceto sub cute per foramina traice per triduum, post traumatico illinitos pānos diebus nouem per eadem foramina traicies, uel calida uerbena tia utaris, et sic lemnifcos subijcias. Vndecim quoq; lemnifcos inducis et incretas locū ut cutis ad pulpas adhareat. Cū cicatrices se clauferint, causticū imponunt. Hac ratione emota uel laesa coxa sanabitur. Vel si coxa se laferit, uel à Mulomedicis dicitur filius lafisse, certior & facilior curatio inuenta docetur, & probata. Nā dudū claudū aīal in sole ponūt, uino & oleo calefacto calefaciūt ipsum, hoc est, iuncturas coxæ diutissime confricant, donec sudēt. Tunc animal capistro trahunt, & sensim currūt, alius lorū uel funes tenet, lassus sequitur, & subito dum animal currit, recta ad se coxas ipse cum impetu trahit, si sonuerit, scias loco suo redisse, paululumq; cessabis, post sensim deambulando tentabis. Si ad locum suum redierit, retractos pedes ponit, & minus claudicat. Vltius animal non conuexabis, sed per triduum fomen-

M 3 tabis.



## ARTIS VETERINARIAE.

tabis calida uerbenatia, post causticum induces. Quod si prima die iunctura componi non potest, secunda die simili ratione coxas sepius trahis, donec reuertatur ad locum. Quicquid autem uexatum uel remotum fuerit uel ictu rotæ, aut quocumq; alio casu, in prioribus uel posterioribus partibus, uel articulis, uel genibus, hoc anacollima constringit & consolidat. Bulbos rufos triginta, cochleas uiuas triginta, anagallici libram 1. plantaginis uiridis manū plenam diligentissime contundis & misces, additis tribus ouis, cū stuppa imponis, & colligas. laxata constringet, & tumefacta sedabit.

### De laccis gambarum. Caput .XIX.

**S**i iumento laccæ enatæ fuerint in gambis, his agnoscitur signis: Dextra ac sinistra ad similitudinē uesticæ inflabitur cutis. Curādū est aut hac rōne quæ flegma in genibus diximus oportere curari. Est & alia medicina. Lentes quæ supra aquā natāt colligas atq; cū tundis, additaq; ueteri axungia colligabis. Vitū exicare prohibetur. Si gamba uel armus aliquo loco ex ictu aliquo tumere cœperit, cretā cimoliā & lubricā ex aceto acerrimo miscebis & oblinis.

### De gamboso. -Caput .XX.

**S**i gambosum factum fuerit aīal, & recens passio est, de tibia sanguinem emittito, lanā succidā circūligato. Cauene fomentis aut cauterio tangas, utrūq; enim in tali curatione contrariū est. Malagma cruda uteris, tertio die semper soluis & curas. Cū uideris aīal profecisse, causticū inducis. Si quod iumentū coxā fregerit, aut supra gambā, scias nō posse curari quia partes istæ ligaturas tenere non possunt.

### De his quæ læduntur à rotis. Caput .XXI.

**S**i iumentum aut rotæ, aut axis ictu fuerit elisum, in recenti lanam succidam ex aceto & oleo colligabis per triduū, post fucus duplices & nitrum pariter tritū imposito, die tertio soluito ac renouato. Si nihil profecerit, malagma tetrapharmaci imposito per triduū. Si & ipsa tardauerit, imposito malignā quæ dicitur meliacinus, usq; dum sanetur.

### De Syrmatico. i quod coxā subito trahit. Ca. XXII.

**S**yrmaticū iumentū his agnoscitur signis: Prodiēs de equili, uel de loco ubi steterit, coxā trahit, & trāsuersum ungulā inflexis coronis terræ superim

superimponēs ostendit, & syrmaticū (et ragidorū paleis quæ trahuntur) dicitur. Sed quāuis alienata horū, uel emota coxa uideatur, si super (compaueris <sup>als. si super ip-</sup> pedes cessis) compellatur, continuo emēdabitur gressus, & sine claudicatione <sup>sum cess.</sup> rectus incedet. Ex hac autē ratione contingit, si cōmissurā uertibuli ex corruptione corporis, uel perfrictione natus humor intrauerit, tunc se defundit ad nervos, & eos reddit immobiles, & uelut alienatos. quæ hac ratione curantur: Sanguis ei de subgamba detrahitur copiosus, in quo admiscebis sal, sulphur, marinas cochleas, mannā thuris, feculam, nitrū, baccas lauri, æquis poderibus, cōtusa oīa atq; cribrata, uino quoq; ueteri et oleo miscebis cū sanguine ipsius; q̄ unctione præparata, post inflationē illinis. coxas calida in qua uerbena decoctæ sunt, interposito triuo, diutissime cōfouebis, post unctionē renouabis. Si ex hac re plenā nō recepit sanitatē, uulnus uris cauterio in ipso uertibulo. Similiter scyaticis fieri consuevit. Quæcumq; autē de oxænis, cæterisq; uitijis articularū, uel de ungulis priorū pedū nunc dicta sunt, scias etiā in posterioribus debere seruari.

De morbo alienato, ex quo infecta animalia moriūt. C. 23

**A**lienatum morbum auctores uocauerunt, quoties hæc signa procedunt: Patentes oculos animal habet, nec sentit hoīs aduentū, quibus et labra, & ipsa orificia intumescunt quasi ab aliqua bestiola cōtacta. Quē morbū alij auctores orabum nūcupauerūt. Est autē nequissima passio. Primo q̄ pestifero tranſiū contagionē spargit in plurimos. Deinde q̄ impios decipit specie sanitatis. Nā reſecta et bene curata animalia ex hac passioe subito inflata moriūtur. Alienatus autē uocatur q̄ aialibus eripit sensus, Maleus, q̄ pestilentiæ internociū contagium facit. Plerūq; autē uiscera interiora uermibus cōsumit. Quorum morſu pertuso aqualiculo aialia suffocata subito moriūtur. Sed si uelocior medicina succurrat hac ratione saluatur: de ceruice sanguinē detrahis, potionē cōponis huiusmodi: Gallici lib. unā, hyſopi librā 1. abrotani librā semis, aristologiæ rotundæ lib. semis, mānæ succari uncias 3. trixaginis uncias 3. Quæ omnia cōiundito et cernito, ex aqua mulſa copiose decoques, et aial diebus pluris potionabis ægrotū, sed q̄ plerūq; huius ægritudinis pestilētia trāſit in p̄ximos, totū gregē si inciderit, ut aut singulas heminas singulis digeras potionare te cōuenit. frequētissimis etiā suffumigationibus, stagnare p̄ter & curare, sicut in malleo superius constat expositum.

Quibus



## ARTIS VETERINARIAE

Quibus usque adeo mutanda sunt pascua, ut si fieri potest, in alias transmittenda sint regiones. Nam qua transeunt in talaris et in ipso anhelitu inficiuntur uniuersa. Velocius autem curabuntur, si separata fuerint atque translata.

### De roborosis. Caput .XXIII.

**R**oborosa passio dicitur, quæ animal rigidum facit ad similitudinem ligni, cuius hæc sunt signa: Totum corpus astrictum, extensæ sunt nares, et aures frigide, immobilis ceruix, os constrictum, caput extensum, colligati armi uel crura, pedes etiam constricti ut nulla commissura flectatur, cuius caput si erigere uolueris, non poteris, oculi præcluduntur, spina præ rigida, et ideo difficile erigit caudam, ut eam flectere et mouere non possit, dura ilia, astricti sunt renes, cubare penitus non potest. Cõtingit autem hæc passio ex nimia perfrictione uel spasmu nervorum, uel tremore, unde contenti dicti sunt. Plerumque in hanc ualitudinem incidunt, qui cum ab igne castrati fuerint negliguntur, et inambulantes frigore leduntur. Quorum nervi recenti dolore et frigore compelluntur, et spasmus patiuntur, et obdurefcunt in robur. Ediuerso etiam altius quam expedit in pedibus usta iumentis, uel quocumque alio loco contactis nervis patiuntur spasmus, et robur incurrunt. Ex nimia quoque pruina, uel si in nimio frigore sudabunt, uel è calidis stabulis producuntur in frigus, fieri adsolent roborosi. Sed si à posteriore parte fuerint comprehensi, ut morbus desinat in lumbos, opisthotoni fiunt, calesfactionibus tamen, unguentisque curantur. Si quod uero robur à priori parte comprehenderit, ita ut os aperire non possit, desperanda sunt. quia constrictis dentibus, fame perire coguntur. Quæ autem ex toto corpore æqualiter periclitantur, ita ut ex aliqua parte os ualeant aperire, tam diu unctionibus calidissimis perfricanda sunt, donec sudent, coopertaque sagis copiosissime, loco calido statuuntur, ignisque iuxta ea fieri consuevit sine fumo ut amplius sudet. Surculos quoque lauros ualidiores in os eorum inter malas mittito, ut rodendo eos exagitent maxillas et calefiant. Fabas quoque solidas cum baccis lauri mixtas ieiuno dabis. Aquam quoque calidam offeres ad potandum. Ventrẽ ipsis cum mulsæ calidæ, admixto castoreo, clystere purgabis: oleum quoque optimum cum succo pisanæ mixtum per narem sinistram defundis. hordeũ emoluitum cum furfuribus admixtum dabis ad substantiam, donec sanetur. Ali-

quant

VEGETII LIBER III.

quantū dixerunt oportere eos aere candenti, in arēna fluuiali uel martima colligatos obrui, ita ut caput eorum extet & nares, & tam diu deteneri donec sudet. Sed ex suprascripta cura saepe plures constat esse sanatos. Quod si ex hac re non profecerint, ures eius ceruicem dextera sinistraq; decussatim, saccellationem ex furfuribus supra totum tergum calidum imponis per triduum, & hac unctione quotidie uteris in sole si caluerit, uel in calidissimo loco; Cerae libram, affronitri libram, resinae terbetinae selibra, galbani libra, castorei selibram, opopanax libram, piperis unciam, medullae ceruinæ uncias duas, olei ueteris uncias duas, & semis, uini ueteris optimi quantum opus fuerit admisceas & uteris. Praesens tamen experimento remedium est, si picem liquidam cum oleo & uino ueteri decoquis, calētiq; medicamine iumentum perungis. Ex qua unctione & auriculas cum oleo tepesfacto oportet infundi, ut sanitas natura proveniat. Sed ut uenae eorū calefiant intrinsecus, & conceptum frigus exudet, necessaria potio est, quae roborosos, tetanicos, & convulsionos salubriter curat, clabi † seminis uncias 2. cimini alexandrinae uncias duas agallici, castorei, abrotani uncias singulas, trixaginis uncias duas, mannae croci unciam unam, succari unciam, hyssopi unciam unam, piperis albi semunciam, quae omnia diligenter trita atq; cribrata redigantur in puluerem, ex quo bina cochlearia laesis & periculose se habentibus cum fusca perisane tepide propinātur: forcioribus uero cum uini ueteris calida hemina defunditur in os, nunquā tamē sine oleo propter leniendā potio nis austeritatem, & cannalem faucum mitigandum. Alij auctores eiusmodi passionem hac dicunt ratione curandam: De temporibus sanguinem detrahes, excipiesq; diligenter, intecto nitri puluere, sale, atq; castoreo, animalia perfricari, & loco calido statui oportere, atq; hanc offerri potionem: lac caprinum, rutam, baccas lauri, piper album, oleum, et fabas solutas: hordeūq; etiam datur ut agitat edēdo maxillas, die tertio de cauda sanguinem tollunt, & renes calidis unctionibus fouent. Interdum etiam in balnea intromittunt animalia, ut diligentius conualescant. Dant etiam quotidie potiones fustes quoq; uel de salice, uel de robore in os mittunt, ne maxillarū usus indormiat. Si melius habere coeperit, post duodecim dies coopertū exercebis ut sudet. Si ista non ualuerint, uteris superius declaratis. Pleriq; asseuerant, ficulneas frondes roborosis oportere praebere, quae naturaliter calent. Potionem

N quoq;



## ARTIS VETERINARIAE

quoq; per os dan. lā: opopanacis uncias 2. storacis uncias 3. gētianae uncias 3. mānā succari uncias 3. myrrhæ scrupulū 1. piperis lōgī scrupulos 2. cum uino uteri tepido, atq; ad cornu digerere. Hac etiā unctione ad curandū robur uel expellēdum frigus uiuntur: Cera librā, resinæ terbeninae uncias 8. opopanacis uncias duas, medullæ ceruinæ uncias duas, storacis uncias quatuor, baccarum lauri selibram, olei pini prout opus fuerit: quæ omnia in unum adiecta in aqua decoquunt, & perfricantes inungunt.

### De hydropicis. Caput .xxv.

**H**ydrops nō leuius animalia quā homines frequēter inest. In talibus namq; utijs cū digestio ciborū plena non prouenit, humor noxius perniciē corporis, tumorēq; cōsuevit inferre. Quā ualitudine hæc signa demonstrāt: Turgēt uenter & crura, testiculi, scapula, latera et tergus inflātur usq; eo, ut nec ī capite eius apereāt uenæ. Cui cū sublinguā tetigeris subtusiet. Hunc ambulationibus breuib; opertū grauioribus sagis donec sudet exercebis in sole, et aduersum pilos per totū corpus pos. modū cōfricabis. Cibū daturus radices cū folijs suis, quia & purgationē faciunt & uitio medentur: foenūq; cōpersum aqua nitroq; præbebis, die ac nocte maceratos lupinos in aqua, rursumq; siccatos, præbebis in cibo. Radicē quoq; cucumeris syluatici uel folia, quæ uentrē moueant, eidē dabis ut purges. Quæ curatio si tardauerit sanicatem, euocandus est humor. Quatuor itaq; digitis ab umbilico ad ueretrū uersus sagitta pungis, & periconiū ipsum pungas, sed caue ne in æstima tangas, et an malia perimas, subijcis fistulā centimale et patieris humorē currere quantū æstimaueris necessariū, quē in uase excipies. Cum fistulam abtuleris duo uel tria grana salis in plagā inseris, ne claudatur. Insuper & pastillos imponis. Alia uel tertia die apoforesim quasi facturus, denuo fistulā appones, humorē eijctes, donec partes totas exiccet. tunc uulnus curādū solēniter, potioesq; catharticas pos. dabis frequēter. Inter diu usq; dū sudet exercebis. Quāto fortius esse cœpit, tāto diligētius est curādū, et semper abstinendū à potu, ut tepidū ei modicū ad sufflētationē bibat tantū.

### De sarcostis. Caput .xxvi.

**S**arcostis quoq; talis est pastio: lumentū cū biberit inflatur & sufflat. hac cum ratione curabis: cineris uel lixiui sextariū unū, seminis plātaginis uncias 5. cōteres & cum uino dabis & oleo celeriter, usq; quo resulcat in.

Ratio. Alij auctores asserunt ab umbilico duobus digitis cōtra pectus plagā fieri debere, & fistulā poni, & educi humorē uel aquā noxiā usq; ad sextarios tres, uel amplius si maior est tumor. Sed cautius est per paries saepe tollere, ne repētina exiccatio periculū faciat. Potionibus utēdum esse dicunt, quæ urinas moueāt, frequēter etiā cōfricandū esse ut sudet, pro focno gramen accipiet & pro hordeo cicerēs infundi. Prodesse etiā dicunt si inter pigmentarios frequentissime deambulet animal: quia diuersi odores latenter pulmonibus profunt. Potionem etiā huiusmodi dant: Petroselinum & mala grana cōtundunt, et cum uino ueteri per os digerunt. Apium quoq; quantū appetere uolueris offēres ad edendū. Asparagi syluestris radices uncias 2. cū uini ueteris sextario decoquis, ut ad tertiā redeāt, et ad heminā p os digeres. † al's apponere

## De tympaniticis. Caput XXVII.

**T**ympaniticus quoq; hydropico similis est, sed alijs agnoscitur signis: uenter quidē eius crescit ut hydropici, & ceruix fit rigidior, sed nec testiculi, nec crura intumescūt. Cōuenit itaq; tympanitico calidū cinerem cū liquamine optimo in panuo, uel lintolo umbilico uel uentri subponere, & fascijs colligare, sed à pluribus aīal tenendū est ne luctādo moueat ligaturas. Radicē panacis sit. gallicū pariter cōteres, et cū oleo uinoq; tepescito p cornu faucibus digeres. Preterea tymū syluestre & etargū in uino decoques, et singulas heminas per tridū dabis. Tympaniticū hęc signa demonstrāt: ciborū bibēdiq; fastidiū, exiguus somnus aut nullus, si p nares mucos coeperint emitte desperandū est, si mūdās nares habuerint hac ratiōe cura bis: crumorē ptisanæ et defruti binos cyathos p tridū dabis tepidos. Preterea hyssopi uncias 4. alei uiridis manū plenā, palmas numero uiginti, sceni greci cyathos sex, aquam cisterninam & unum odoratum uetus pariter mifces, diligentissime decoques, & in potionem per triduum dabis.

## Delienosis. Caput .XXVIII.

**L**ienosis ut manifestū est periculum, ita manifesta sunt signa. Nam oculi inuertuntur & suffusi sunt sanguine, tardius ambulant, collum habent extēsum et fit deterius et rigidius. Quæ passio principū indicat roborosi, quorū latera intumescūt, siue ceruicis media spina ad similitudinē alui sit cōcaua, astringūtur aliquādo maxillæ, quod uini cōsueui inferri

N 2 ex nō



## ARTIS VETERINARIAE

ex nimia perfractione, cū animalis dorsum aut frigore, aut pluuia, aut grā  
dine cœditur, aut nubibus. Cuius ista curatio est: De cauda parum sangui-  
nis demis. Nam si amplius tuleris infrigescet, & rigori additur rigor, admi-  
sces in eum merum, & oleum, & calefacies, & statim hac dorsum & cerui-  
cem perunges, saccellum quoq; ex fursure calidum impones, ut totam spinā  
tenere possit & lūbos, altera die extergebis diligenter & unctione eadē per-  
fricabis, supra quam similiter cum fursure calentem saccellum imponis, hoc  
usus unguento: medulle ceruinæ libram unam, manne thuris uncias qua-  
tuor, depli uncias tres, castorei uncias tres, opopanax uncias tres, resinæ  
frixæ uncias 3. apocimæ uncias 3. resinæ terbenitinæ uncias 2. ceræ librā  
semis, olei laurini uncias 8. (sapi caprini libram) olei glaucini sextariū 1. ex  
(olei cyprini) his sicca quæ fuerint tundis & cribras, cætera super carbones soluis, quibus  
cretā admisces, & leuiter decoquis in uase nouo, uncturus cū necessitas po-  
stulauerit, reponis ac seruas. Hac quoq; potione intrinsecus curabis: absyn-  
thij unciam 1. aristologiæ uncias 3. heronicæ uncias 2. petrosilini unciam 1. et se-  
mis, trixaginis unciam 1. thuris masculi uncias 3. castorei uncias 2. manne suc-  
cari uncias 2. contundis piter et cernis, et ex aqua mulsa et oleo diffunde p-  
fauces, absq; dubitatione curabis. Alij auctores asserunt sanguinē de brachio-  
lis auferendū, et aīal abstinentū ab hordeo, oleū, nitrū, marrubium, sanguinē  
de brachiolis æquis ponderibus tritū cum absynthio pontico & uino auste-  
ro per os dandū, & cum biberit deābulet, & spongijs calidis foueatur, &  
pressa manu diutius perfricetur. Si uentris permanserit tumor, pectus cau-  
terijs inurendum est. Post quinque dies ternos digitos subijcis hac atq; illac  
inurendum est iterum, obseruabis autem ne uenas forte comburas.

### De implecticis. Caput .xxxix.

**I**mplecticus autem quia similem sustinet passionem, perfricandus est una-  
ctione superius memorata, & si necessitas postulauerit inurendus.

### De phragmatico. Caput .xxx.

**S**i phragmaticum erit iumentū, his agnoscitur signis: febricitabit, oculo-  
los introrsum reducet, aures tensas habebit & rigidas, terram pedi-  
bus tundet, quod hac ratione curabis: Sanguinem detrahas de matrice,  
adiunctoq; oleo & uino tepescies, totumq; iumentum contra pilos diligen-  
tissime confricabis, loco tepido statues, & curasti.

## De eo qui aquam timet. Caput .XXXI.

**A**liquando iumenta aquas timent, quæ dicuntur, hydrophoba. Signa huius hæc sunt: uenas omnes habebit extensas. sudabit suffusus oculis, tremorem frendorem que patietur, illidet se parietibus; ex qua passione conuertere consuevit in rabiem. Cui hac ratione succurris: Sanguinem ei de femoribus detrahes, à cibarijs abstinebis, in loco sic clauso ut lumen uidere non possit constitues, magno silentio aquam in situla uel alueo ita apponis ut non audiat sonitum, manipulum rutæ deterito, et baccas lauri xv. olei rosati librā, aceti unciam i. commisceto, caput et nares diligentissime perunges, et sanabitur.

## De Spasmo. Caput .XXXII.

**S**pasmus certum est animalia sustinere. quæ necessitas his declaratur indicij: Subito concident, et articuli eorum extensi sunt, et toto corpore palpitant, aliquando etiam de ore spumam emittunt. Quibus escam dabis pusca nitroque, conuersam, cucumeris quoque, syluatici puluerem, et nitrum tritum per septem dies in potione dabis ut purget. Sanguinis quoque maris et te fluidius dimidiam cotylam, aceti tantundem, laseris aliquantulum pariter mifces, et suffundis in nares. Vtile dicitur terga eorum oleo et aceto et nitro frequentissime conficari.

## De Epilepsia. Caput .XXXIII.

**Q**uadam ratione lunari animalia sicut homines frequenter corruunt, et intermoriuntur. Quorum ista sunt signa: iacentia contremiscunt, saliuæ per os defluunt, desperata pro morituris (frequenter) consurgunt, et pabula appetunt. Cartilaginem naribus eorum digito tentabis, quanto frigidiores inueneris, tanto plus casurum scias. Si minus frigida fuerit, rarius cadet. Cuius ista curatio est: De ceruice eius copiosum sanguinem tolles, post quintum diem de temporibus, loco calido tenebrosoque constitues, totum corpus theriomaticis conficabis unguentis, cerebrum quoque eius et auriculas pice liquida cum oleo laurino admixto largius perunges, et mittes intrinsecus, caput etiam aluo et cerebellari communes, potione aut cathartica dabis eiusmodi: Radicis uncias 2. panacis radicis unciam i. diagridij unciam i. cum cucumeris syluestris unciam. quæ omnia bene trita commifces, cum mellis sextario i. decoques,

N 3

ex quo



## ARTIS VETERINARIAE

ex quo cochleare plenum in aqua calida sextariū, et olei drachmas 3, mittis  
 et per os defundis. Caput quoq; eius sepius curabis. Radicē dianariā, id est  
 herbae artemisiæ, in puluerē rediges, et p fistulā naribus insufflabis. Radicem  
 quoq; laseris tuisum si naribus defuderis, eadē ratione proderit. Si aut passio  
 perdurauerit, caput eius ures, ut apio so fieri consuevit.

De eo quiaquam reuomit. Caput .xxxiiii.

**A**nimalia sepe aquam reuoment quam biberant. Quæ passio è nimia  
 perfrictione descendit, cū stomachus paralysim ex frigore sustinuit.  
 Sed hac ratione curantur. Sanguis de ceruice detrahatur, poriones  
 thermae propinantur, unctionibus calidissimis armi pectusq; confrican-  
 tur, purgatur p nares caput, et si necessitas postulauerit, etiam sinapizantur.

De Sideratitio. Caput .xxxv.

**S**ideratitia iumenta dicuntur, cum uenas uacuas percusserit frigus, aut  
 aestus, aut impleuerit cruditas, aut ieiuna bulimū fecerit. Redditur enim  
 stupidum animal, et titubans ambulat. Quod mollibus cibarijs, leni-  
 busq; potionibus curari oportebit, ita, laseris unciā 1, et heminā mulse, suc-  
 cumq; ptisanæ miscebis. Et si ex frigore causa est, cum uino et oleo tepido da-  
 bis. Si ex aestu, cum rosato præbebis. Si ex cruditate, abstinebis à cibo. Si de  
 bulimo, ciceres offères largiores.

De percussio à sole. Caput .xxxvi.

**S**ol quoq; canicularis ardentior, animalia peccit in cerebro, quibus de  
 temporibus sanguis emittitur, et simili ratione curantur. His aut ostē-  
 ditur signus, quia deiectum caput portare coguntur.

De Cruditate. Caput .xxxvii.

**C**ruditas iumentis generat ægritudinem, quæ hac ratione dinoscitur:  
 modo in unā partē, modo in aliā ambulātes inclinant. Quorū ista est  
 medicina: Sanguis eis de ceruice detrahatur, à potu et cibarijs abstine-  
 atis (cōpellēte) tur. Si aestas est, refrigeratorias accipiāt poriones, nō parū natura cōpellitur.

De Bulimo. Caput .xxxviii.

**B**ulimum animalia sustinent frequenter ex fame, frequenter ex lassitu-  
 dine

dine. Cuius ista sunt signa: Anterius fugiunt, incertius effusus, tremebit. Quae hac ratione curata sunt, in primo omnium defricetur ex uino oleoq; tepesfacto, cum t mūdīs mollem partem uino infundis, & cū eodē confricabis. Si ilon fecerit, per cornu digeres & reparabitur. Quod si permanserit bulimus, si mille heminas cū sextario uini infundes, & per cornu digeres. Quod iter t a gerit incidere bulimus, ubi necessaria de iunt, terram faucibus infundes, aut offas facies, & per os digeres.

## De Anhelitu. Caput .XXXIX.

**Q**uod si ex anhelitu inflationes cōtigerint, cuius causae rationes reddi non possunt, puscā calidam cum spongia cerebro eius apponis & pectori, in aures eius oleū lauriniū mittes, frigidissimo loco eū cōstitues, nares quoq; titillabis ut frequētius sternutat. quo factō, statim exhilaratur.

## De aestu. Caput .XL.

**S**i aestuauerit animal & defectionem patietur, brassicae folia cum apio cōtundes, & cū uini sextario permiscebis, & per narē sinistram infundis. Si uero fortius aestuauerit, petrosilini, daucij, (silis) gallici, abrotani, spicae nardi, sinoantis, aquis ponderibus tundūtur, & cū aqua mulsā data, aestū releuant. Quod si his ita membra defecerint ut cōcidant, quibusdā placet abstinere eos à potu, et sitiētes in aqua frigida uia hora stare, et cōtinuo repari. Alij dixerūt hordeaceā farinā cū uino p cornu faucibus infundi. Pleriq; expti sunt triticeā farinā cū aqua frigida datā continuo profuisse. Vel cerie tria onia cruda cū pulegio & pusca, oleoq; permixto, faucibus infundunt.

## De Paralytico. Caput .XLI.

**P**aralytici ad similitudinem hominum iumenta patiūtur, quae his ostenditur signis: Ambulabit (pronus) in latere ad similitudinem cancri, ceruicē incuruabit ut solent habere quibus fractae sunt, rectos pedes nō ponēt (sic egri parietibus se illidūt) cibū et potū nō recusant. Hordeū aut ipsius uulū semper apparet. Hac ratioe curabitur: Sanguis ei de temporibus pte cōtraria nō qua contractus est tollitur, unctio nibus theriacis pfricatur, ceruicesq; eius constringuntur usq; eo, ut cretillis ex lignis impositis constricta cervice prauitas dirigatur. Loco autem calido stabulatur sicut roborosus.

Cuiusq;



## ARTIS VETERINARIAE

cui ipsæ potiones dantur. Si parum in totum ista medelariū adiumenta profecerint, ceruices eorū uruntur, non qua contractus est, sed ex parte contraria de cauterio accipit palmas ab armo usq; ad ceruicē, auriculæ et in tēpore uritur ad mensuram semissis. In alia autem parte temporis quasi stellam paruanæ cauterio facies, & in parte renum usq; ad mediam spinam uirgulas dabis solemniter, & curasti.

### De intrinsecus rupto. Caput. XLII.

**I**umenta nimio saltu, uel cursu aut ruina, cum aliquid ruperint, uulsant, quorum ista sunt signa: Stranguriam patientur, excreabunt etiam purulentum, & quoties uolutata fuerint non reuoluuntur, nec se excutunt. Si recens ruptura fuerit, sanguinem magis excreabit quam pus. Quæ curantur glutinosi & leuibus cibis. Talem etiam accipiunt frequentissime potionē: Thuris masculi unciam .i. opij unciam .i. heliotropij unciam, quod intybum agrestem uocamus, rutæ unciam .i. quæ oīa diligenter trita cū uino austero quatuor mensuras adicies, & per dies singulos dabis ad cornu, donec quæ intus rupta sunt glutinentur.

### De Infania. Caput. XLIII.

**S**ed animal nonnunquam inuadit infania, ut præsepium frangat, seseq; morfu laceret, impetus etiam in homines faciat, auribus micat, oculis attentis & splendidis, & ex ore egerit spumam, quem caute ne medentem ledat, diligenterq; cōstringito. Sanguinē ei de ceruice & de cruribus trahito, rursumq; in tenebris contineto, donec appetat cibum. Cum cœperit ad patientiam reuocari, succum cicutæ uno acetabulo, & aquæ unā heminā admisces, & per os defundis. Post rutam conterito, & supra cerebrum ponito, caputq; lanata pelle cōstringito et curato, et cū profecerit calide stabuletur. Talis quoq; potio equis subuenit rabiosis: baccas lauri nouem, & alei purgati grana uiginti & unū, diligenter conteres, & cum uino ueteri candido pnam sinistram inicies.

### De Pletura ex hordeo. Cap. XLIII.

**S**i animalia dum sudant hordeum comederint, uel ipsum hordeū nouū fuerit, quia uehementius calet, uel copiosius quàm oportet ociosa pascuntur, absq; dubio indigestio & pletura comitabitur. Quæ passio his agnoscitur

Scitur signis: Sudabit, ligati erunt armi, ambulabit incertum: Sanguinem ei de ceruice detrahes, aceto oleoq; permixtis totum corpus diligentissime cōfricabis, leuibus ambulationibus exercendum est, & ab hordeo penitus abstinendum. Cui eiusmodi subuenit potio: brassicæ folia cōtundis, succamq; exprimis, & myrrhæ puluerem, & parum liquaminis, & uinum uetus optimum misces, quod per triduum per os defundes, ita digestio & sanitas consequetur. Aliquantum præcantatione tentant afferre remedia, quæ uanitas ab aniculis solis diligenda est: cum animalia sicut homines non inanibus uerbis, sed certa medendi arte curentur.

## Depassione pulmonis. Caput .XLV.

**P**vlmone ut integri præstant substantiam uitæ, ita uitiati periculum afferunt mortis, quorum dolor manifestis declaratur indicijs: stertet, tussiet grauiter, et excreabit purulentum. Si ægritudo longior fuerit, de prioribus claudicat pedibus, grauem foetorem naribus expellit, difficile se collocat, sed febriens præsepio incumbit, corruptum assellabit. Aliquando in corpore ipsius similia furunculis tubercula nascuntur. Quorum ægritudo difficilis est, sed hac potione curanda: thuris masculi uncias tres, hyssopi uncias 2, folij unciam 1, manne croci unciam 1, murræ uncias 2, diligenter tundis et cribras, ex quo puluere unum cochlear cum tribus ouis & aqua temperabis et diffundis per os. Si cibum non appetat, pro aqua lac caprinum miscebis, & addito mellis cochleario propinabis. Succum quoq; ptisanæ cum oleo rosatio, & puluerem superius comprehensum cum ouis per os dabis ad cornu. Offas quoq; ex duobus sextarijs farinæ triticæ, & uno sextario erui pollinis facies, quibus admiscebis ex superscripto puluere quinq; cochlearia. Sed septenas offulas diebus singulis digeras, quas quotidie ad substantiam dabis, donec cibos tentet appetere. Cui omnem escam propter fastidium uideri oportet offerri, et contrario, lenticulam cum tritico uel hordeo torrefacto, cum palea dabis, ut quicquid ex diuersitate ciborum uoluerit eligat. Lac tamen recens cotidie ei conuenit dare. Deambulet plurimum, ubi coeperit conualescere ad exercitium reuocandum est. Lac si defuerit, aquam in qua eruum prius lotum die ac nocte permanserit dabis in potu. In causa pulmonum de ceruice uel de palato his sanguis aufertur, quibus (nec) fastidium euenit, sed fortiora sunt corpora. Cineres quoq; ulmi loti & infusi aqua cum uino ueteri optimo

o odorato



## ARTIS VETERINARIAE

odorato heminis singulas misces et dabis. Quod si uehementius uexatū a  
gritudine, trāsiuit in morbū: Radicis lēisci drachmā, thuris uncias 2. murræ  
drachmā, succari semiunciam, cōtere diligēter, et cū uino suffunde. Sūt et ista  
remidia: Vua alba in os equi frequēter exprimatur, semen radice datur in ui  
no, amygdale frixæ cū aqua offeruntur. Sed est alia efficacior potio: Carda  
momi uncias 2. cassiæ unciam, storacis unciam 1. quæ omnia si ualidior et sine fe  
bre erit cum uino, si febris cum succo pisanæ per os dabis.

### De orthopnoico. i. plagio rigido. Cap. .XLVI.

**O**rtholisticum iumentū his agnoscitur signis: etiamsi trahatur am  
bulare detrectat, anhelat grauius, frequēter suspirat, rūchos ducit,  
ilia suspendit, dū manducat tussit. Ex quo uitio difficile liberabitur,  
licet in longū protrahat uitā. Pulmo enim eorū contrahēdo se cōburit, unde  
et macies cū morte insequi consuevit. In recenti tamen hanc curā festināter  
adhibebis: Sanguinē de pectore detrahes, et mero oleoq; pmixtū atq; cale  
factū punges. Lixiuū quoq; cineris diligētiissime cretū, cum oleo optimo tem  
perabis, et per nares diebus quinq; cōtinuis eidē digeres. Potionē quoq; da  
bis postmodū: Sinapis alexandrinæ frixi, et sulphuris uiui, et murræ carda  
alis (attico) momi species, æquis ponderibus contundis et cernis, et cū melle (optimo) de  
coquis. Ex quo medicamēto ad magnitudinem nucis cū uino nigro calido di  
lues, et quotidie per os potionabis. Alij uero myrrhæ uncias 2. sulphuris un  
ciam 1. nitri semiunciam, picis liquæ pusillū deterūt, additoq; melle et uino uetere  
odorato, candido, p nares sæpius infundūt. Curabis autē ne algeat, tempabis  
exercitatiōibus ut sudet: et nō solū in potiōe, sed etiā in fœno nitrū cū melli  
crato aspersum semp accipiat.

### De Epistotono. Caput .XLVII.

**E**pistotoni quoq; similis passio declaratur. Orthotonicus qui totus est ri  
gidus, Epistotonus cui in posterioribus partibus morbus insederit. Cu  
alis (frigidas) ius ista sunt signa: Aures (rigidas) habebit, collū extēsum, oculos mino  
res, tensa pellis in facie, labia grauiā, ut oscitare et apire uix possit, cibū po  
tūq; fastidiet, cauda rigida, gressus incertus, mēbra distēsa, difficile progredi  
tur, et frequēter in posteriōrē ptē cōcidit, unde Epistotonus noīatur. Qd genus  
passionis hyeme curare difficile est, et state aut si diligentior fueris obtinebis.

Que

Quæ passio p[er] æstatē his nascitur causis, si iumentū ardētissio fuerit sole percussū, uel si in itinere priore claudicās pede, coactū fuerit ambulare uel currere, & uehementius sudauerit, et ex sudore uel armū laeserit, uel supra ipsum iacuerit ut armus indormiat. Hyeme autē cū de itinere uel de exercitatione uenerit, et cū sudore steterit sub diuo in frigore, aut in loco (recenti) uel humecto aut marmorato, aut tessellato, uel si frigore maxillæ obdormierint, tūc ista ægritudo cōtrahitur. Cui hac ratione tentabis succurrere: Adipis porcinae ueteris lib. 2. r. sinæ terbeninae selib. piperis triti drachmā, ceræ librā, olei ueteris sextarios 2. piter decoques, et calidissime totū aīal perūges. Multi cruum decoquūt, calentēq; aquā capiti ipsius languētis imponāt. Alij in stercore ipsorum calido obruūt agrotātes, ut lāguore exudet. Plēriq; colligatis iumētis cōmodū credūt renes sole feruenti bene cooperiri. Hæc quoq; potio traditur salutaris: Piperis triti grana xx. cedri pōdus denarij, nitri uncia 1. mixtura laeseris tyrrhenici globulū ad magnitudinē fabæ, trita atq; permixta, addita liguaminis floris hemina, & uini ueteris summi sextariū bis in die per os digerēs. Exptū dicitur, sanguinē bubulinū calidū et fumantē, sed moderate p[er] cornu faucibus infundis. Quod si forte defuerit, thuris cribrati & salis triti ternas uncias cū uino optimo prodesse dixerūt. Calidis medicamentis aīal expe dit dum sanetur perungi. Adipis quoq; porcinae recentis coctæ quantū existimaueris cum oleo optimo & uino summo & melle commisces, & ad carbonēs semper decoques, ac per nares infundes. Malagma quoq; de calidis speciebus in carbonibus cum oleo cyprino uel communi, sed ueteri, abluatur, & perungitur. Post curam operitur sagis, & in sole calido exercetur a seffore, & repedens dum sudet. Post sabanis ualidioribus abstergetur, & denuo unctum operitur, pice quoq; liquida admixto oleo perungendum, nō tamen nimia pix sit, ne corium laedat. Nōnulliā ualidioribus de ceruice sanguinē detrahūt. Plēriq; in balneū ducunt, calidissimis potionibus curāt, id est, lafare & cymino, aniso, oleo, baccis lauri, ex quibus quotidie aliquid cū uino ministrant. Vnctionibus quoq; istis utuntur: Ceræ lib. resinae uncias 4. opopana cis unc. 2. medullæ ceruinæ uncias 3. olei storacini uncias 3. olei laurini unc. 4. quæ oīa decoquūt, et in sole aut in loco calido perungūt. Alia quoq; unguēti compositio talis est: Baccarū lauri sextariū 1. cymini sextarios 2. sulphuris uiui unc. 3. resinae unc. 1. galbani unc. 3. olei sextar. 2. q̄ oīa decoques et ueteris.



## ARTIS VETERINARIAE

## Delethargico. Caput .XLVIII.

**L**ethargici quoque iumentis ista sunt signa: iacebit semper et dormiet, neque cibum appetit neque potum, cum excitatum fuerit continuo aggrauatur, et se proijcit, et macescit, et quancumque ei dederis potionem tanquam dormiens uix suscipit: quem hac ratione curabis: substernito in stabulo ubi stat, ut bibat ibi, cui caput fomentabis ex calida pulegio decocta, postmodum perunges oleo cum adarte trito, ita ut caput eius et aures infundas, ea usurus potione: camomillam illyricam, (idem nos trace) et herbam artemisiam in aqua decoquis, ex qua quotidie ei binas cotylas propinabis. Cui et pedes priores frequenter fomentabis calida. Solet enim hac passio adstrictius ad rectum pedem contingere. Est quidem periculosa passio atque curatio: cuius ista sunt signa: Oculi eius lachrymabunt quasi lippiant, in praeseptio dormitans incumbit, à posterioribus ambulans nutat, et totum grauatur. Cui sanguinem detrahes de pede priori dextro, et de femore sinistro, ex quo eum perunges. Herbam artemisiam contundes, et cribratam dabis cum lixiui sextario, et olei cyathis duobus, per triduum. quarta die intermites. Quod si cibaria non appetit, (bolus ex melle) et aqua tepida comedat, et aquam bibat. Si minus profecerit, lini semen cum aqua in olla decoques, et heminas singulas per dies singulos dabis ad cornu, addito melle quantum sufficiat. Quae potio etiam febricitantibus prodest. Lethargicum animal frequenti exercitatione prohibendum constat à somno. Assidua quoque iniungenda est deambulatio si anteriores pedes eius miseris in fomentum. Nam si fures sale et aceto permisces, et calentes ungulis imponis. farinam quoque triticam cum tritis salibus et pusca sextario uno, faucibus infundes, herbam artemisiam tunsam cum oleo et modico lixiui dabis ad cornu, abstinebis ab hordeo, faba solida sextarium porrigis ut uigilet, donec duriores edomet cibos. De ceruice sanguinem ei detrahes. Depletum hac ratione curabis: A frontis uncias tres, gallae syriaticae uncias duas, spicae nardi uncias 2. radices capparis uncias duas, tinsa et cribrata permisces, et terna cochlearia in sextario aquae tepidae dabis in potu. Nunquam frigidam nec nimium calidam, sed tepidam ad bibendum semper accipiat. Assidue flagello excitandum aut uoce, ut uitium timore deponat.

als(eruū melli  
tum)

De morbo

## Demorbo Regio. Caput .XLIX.

**S**I quod iumentum morbum regium habuerit, his agnoscitur signis: *S*uiriq; oculi uirides sunt, & ceruicem inclinatam habebit, dextra par-  
te & pede dextro (etiā sinistro) uidebitur claudicare. Cuius curatio est  
ista: loco tenebroso, ubi lumen uidere non possit, clauditur, et operitur sagis  
ita, ne oculi eius aperiātur in die, oleo et uino tepido ungetur atq; fricabitur,  
lapides molares nō minus pondera quinq; in ignē imponuntur, animalis ca-  
put copulatur ad pedes, cum bene cāduerint, sub eius naribus apponuntur,  
perfusi oleo suffumigatur os, nares, & oculi, ut morbi uirus exudet. Quod  
per septem dies cōtinue est faciendum. Tali etiam ratione succurrimus: san-  
guine caprimo et lacte ouillo, anagallico, costo, oleoq; pariter admixto po-  
tio conficitur, quæ per dies duodecim datur.

## De bili, idest, coleribus. Caput .L.

**S**ed interdum biles, quæ coleræ appellantur uulgo, solent iumenta uexa-  
re. Quæ passio his declaratur indicij: cōmouetur ac uolūtatur ut stro-  
phosus. Sanguinē de ceruice emittis: Daturus eiusmodi continuo potio-  
nem: herbe trixaginis nigræ uncia semis, mannæ succari uncia unam, nitri  
uncias duas, aliei uncias 2. uini optimi sextarium unum, conteres, ex aqua  
mulsa heminam unam per sinistram narem infundes.

## De bili arida. Caput .LI.

**Q**uod si aridam bilem habuerit, myrtum agrestem cum uino contri-  
tam per narem dextram deffundis, pro hordeo far triticeū dabis.  
Potionem ipsam temperabis ex aqua.

## Decoli passione. Caput .LII.

**C**oli passio grauißimos cruciatus iumētis cōsueuit inferre, ita ut car-  
diaci aut strophosi esse credātur, sed his agnoscitur signis: Cū stat re-  
pente cōcidit ut arreptū putes, si satis suspensum fuerit dolor subse-  
quitur, & iacet nōnunquā: cum frigida aqua acceperit tremit, sudat, anhe-  
lat. Cui hac ratione succurritur. Anisi pontici uncia 1. petrosilini uncia 1. fe-  
niculi seminis unciam, piperis nigri uncias 2. marrubij uncia 1. abrotani un-  
ciam 1. anethi uncias 3. libistici 2. 4. centaureæ minoris et maioris uncias 2.  
(cametris semiunciam) eupatoris 2. 4. gingeris uncia semis, pulegij semiun-  
ciam



## ARTIS VETERINARIAE

ciā, rutæ unciā, apij unciā semis, pariter cōtūdes et cernes. tūc mellis optimi pōdera duo cocta et despumata cū oībus mīscēs, ex quo medicamento ad magnitudinē nucis auellanae cū aqua tepida sextario dilues, et per os infundes, *als(piperis)* certissima medicina est. Qd si dolor pseuerauerit, feniculi seminis cochlearia v. bene trita cū uino syncero sed cibario sextariū dabis. Præterea (panis) aliquantulū et pellicula de uentre pulli siccata in furno et trita cū uino dabis.

### Deuomica. Caput .LIII.

**V**omica plerūq; animalibus nascitur intrinsecus. Cuius passionis signa sunt ista: cū accubuerit difficile surgit, os ei grauitur olebit, in cubet in eo loco à quo uexabitur, tussiet, et purulētū excreabit interdū. thuris uncias 2. aristologie uncias 2. in uno cū uino tepēfacto per nares digereres. Item sulphuris uiui uncias 2. aristologie unciā semis similiter dabis, cibo autē maxime sustētandū est ut habeat corporis nutrimentū, et cū rupit uomicam cauterijs circa pectus aduris, ut facilius prouocatus humor emanet.

### Decoriagine. Caput LIIII.

**P**assio quā græci ecedermiā uocant, latini coriaginē appellant. Cuius ista sunt signa; macescit, et sine febre nō erit, coriū illius adhærebit costis, spina fit durior, in dorso eius nōnunq; furunculi exire cōsueuerūt, magis etiā quā adsueuerat appetit cibos. Cuius ista curatio est; thymū & sales cum uino rubro cōteris, & tubera, si qua in eo sunt, cōfricas. Parabis etiā aliā unctionē: picē, cerā, resinā cabialē, & thuris pollinē ex oleo ueteri temperabis ac decoques, totū animal cōfricando diuissime perages. Sed parum est unctione corio mederi, nisi potionibus & intrinseca curentur; piperis albi triginta grana, myrrhæ semiunciā, uini odorati ueteris cotylā, olei uiridis cyathū unū admiscebis & per os digerēs. Itē fasciculos rutæ uiridis atq; purgatæ opopanacis & cotylā uini & olei uiridis cyathum admīscēs et dabis in potu. Quod uitium ex perfrictionis iniuria, aut ex coactione alicuius necessitatis descendit. Aliquantis suis nō uetula sed nouellæ sanguinē uino permixto ad cornu faucibus digerunt, ignorantes si plus sanguinis fuerit cōtinuo animal interire. Cautius est hac magis potione curare; cepas germanas et semen rutæ pariter admīscēs, & deteris, ex quo uncias tres, cum uini cotyla per dies singulos dabis, usurus curationibus quæ conueniunt roborosis.

De stomacho

## Destomachico. Caput LV.

**S**yntaxin animalia patiuntur et homines: quæ ualitudo his declaratur  
 Indicijs: cotidie tenuatur, et macie ossa eminet, multum manducata esu-  
 riunt semper, quicquid inuenerit tentat fame cogere corrodere, durum stercus  
 emittunt, trahunt longam ac miserabile uitam, ut nec surgere ualeant. Sed iactantia  
 fatigata, mulumque manducata fame moriuntur. Omnis enim esca quam sump-  
 serint ad stercus, et omnis potus conuertitur in urinam, nullus ex his succus,  
 nullum alimentum peruenit ad medullas. Propterea quod stomachus eorum ni-  
 mio rigore perstrictus, nec coquere poterit, nec epati aliquid propinare, in  
 quo tota uirtus ad nutriendum corpus per dispensationem ciborum sanguis  
 preparatur. Tabescit semper, iecurque eius minuitur ad similitudinem arboris,  
 quæ radicibus ex maiori parte præcis, cum à paruulis aliquandiu sustenta  
 ta portauerit frondes, celeriter exarescit. Quorum manifesto periculo hac  
 ratione tentatur occurrere. Inter principia facies unctionem, ceræ libras duas,  
 resinæ terbeninæ libram, medullæ ceruinæ libram, axungie ueteris sine sa-  
 le libram, propulegij selibram, irisillyricæ libram, samfuci libram, olei lauri  
 ni quantum satis fuerit, decoques carbonibus lentis, et ad ceroti molliciem  
 perlocabis, cui adhuc tepenti mices puluerem irisillyricæ et cretæ cimoleæ,  
 donec infrigescat agtabis. Ex quo medicamento totum iumentum perunges,  
 et multorum manibus confricabis, donec calefiat et sudet. Quod interposi-  
 to triduo conuenit fieri, ita ut coopertum animal sit, et condie paulatim exer-  
 ceatur, ut digerat. Cui hæc preparabitur potio: abrotani uncias 4. santoni-  
 ci uncias 4. trixaginis uncias 4. campeiteos uncias 4. gentianæ uncias duas,  
 murrhæ uncias 2. opopanacis uncias 2. eiusdem radicis, succari semiunciam, ru-  
 tæ aliquantulum, omnia bene tundis et cribras, ex quibus duo cochlearia in uno  
 ueteri decocta cum succo ptisanæ in qua (atro) decoctum est, admiscebis, adiun-  
 ges etiā erui pollinis cochlearia duo, quæ cum per nouem dies continuos dederis,  
 intermittis aliquandiu ut uires colligat, et resumat, et per singulos (periodos) alia hebdomadas  
 alternis curabis. Nec cessabis donec sanitas redeat. Diebus autem uacuis of-  
 fas ex farina triticea in lacte conspersa ad substantiam digeris, furfures quoque  
 triticeos et paleas dabis, hordeum non dederis nisi fortassis infusum, dene-  
 gabis etiam herbam uiridem donec reparare coeperit corpus.

De icterico



## ARTIS VETERINARIAE

### De Ictérico. Caput .LVI.

**I**cterici ista sunt signa: Oculi uirides, de quibus profluet lippitudo, ad similitudinem fabæ indurescit corium, fit horridum pilis, insequitur fatigatio, ambulans genibus claudicabit. His sanabitur medelis: Panacis syriatici et apij seminis singulas libras contundito atq; cribrato, & cum mellis attici libra misceto, tunc aquæ, in qua lupini crudi fuerint decocti, sextario, ex medicamento superius descripto, quatuor cochlearia miscebis, & in potione dabis per dies v. Si tardius adiuuat, uini sextarios 3. in pultario nouo, canini stercoreis albi uncias tres admisceto, & ponito sub diuo, ex qua potione quinque diebus per os digeres. Præterea aquam in qua ciceres decocti fuerint, & ster-  
cus caninum simili ratione præbebis.

### De Stropho. Caput .LVII.

**S**trophus diuersæ causæ, & diuersæ sunt curæ. cuius ista sunt signa: Volutatur, patitur torsiones, ilia sibi respicit, stercus durum assellat, terram pedibus tundit dolore cogente, intermissis horis refrigerationē sentit & requiem. Hac potione curandū est: acori, anisi, opopanacis singulas libras pariter contundis & cernis, ex quo puluere duo cochlearia in uini ueteris sextario & olei pondo semis admisces, & tepidum per os dabis triduo. Si strophosus fuerit & non facit uentrem, caudā inter coxas suas mittet, & ad uentrem suum conuersus attendet. cui puluerem de semine rutæ syluaticæ cū uino per os dabis. Præterea cepas decem ueteres, ficus sicca 8. nitri scrupulos 5. stercoris colubini scrupulos 4. ex quibus addita urina collyria facies, & bina uel terna in anum immittes. Si uero fortius uenter induruit, conuenit adhibere clysterium, sed prius uentrem aqua calida perfruebis. Tunc succum (cantabricum) in quo fuerint bletæ malæq; decoctæ, cum nitro & hermina olei, & columbini stercoris quatuor scrupulis, prorum constitues, & per anū inijcies iumento, ita ut post clysterem inambulet aliquantulū. Alij fimum leporis cum nouem cochlearibus mellis, & quindecim granis piperis addito caulium succo per os salubriter defundunt.

### De dolore iecoris. Caput .LVIII.

**I**ecoris dolor solet infestare iumenta, cuius ista deprehenduntur indicia: Cibi fastidium, potus appetentia, uentris inflatio, macies. Cui primo cremorem pti-

# VEGETII LIBER III.

ris ptisanæ sextariū .i. cū olei rosatiij tribus cyathis per os digeres. Si passio permanet, alia potione curabitur. Apij seminis uncias 3. hyssopi uncias tres, abrotani uncia .i. olei uiridis quantum sufficit, uel succi paulominus. Si uiridē abnegat tempus, ex uino optimo ad tertias decoques, per aliquot dies potionē dabis. Similis quoq; huius passionis est ratio. Sine febre enim animal nō erit, nec facile cibū conficiet, fæculi dexter tumebit et indurescet, cui ista subuenit medicina: fœnigræci cyathos quatuor mittis in aquæ fontanæ sextarios quatuor (.i. grana triginta) et decoques ad terciā partē. hemina per os data potione curabis. Nōnulli turis drachmas 2. tritas, cum uino quantum sufficit miscent, et inde totum corpus multorum perfricatur manibus, saccis cooperiunt ut sudet.

## De inflatione uentris. Caput .LIX.

**I**nflatio uentris interdū iumenta (sine dolore) conturbat. Cuius passionis ista sunt signa: testes eorū sudabunt, alternis pedibus terrā tundunt, subito inde alterna parte se cōuertūt, caput ad ilia sua ponūt tanquā qui locū doloris ostendāt, gemitus interdū et tremor totius corporis insequitur. Hunc paulatim deambulare facies, manum unctam in anum mittes, et stercus extrahes. deinde sale et melle mistis in anum infundes, ut assellandi augeat uoluntatem. Si hyems fuerit, oleo et pice liquida lumbos et auriculas illius saturabis, hanc daturus potionem: Laurum uiridem uel baccas ipsius, piper et cuminum, petrosilini et feniculi semen, semen agrii et nitri, quæ pariter admixta, tusa et cribrata cum uino, et oleo tepido, et calidæ aquæ paruula portione potionabis, et deambulare compellis moderate, donec dolor cesset.

## De intestini uexatione. Caput .LX.

**I**ntestini quoq; uexatio, quod colon uocatur, et inflationes et dolores cōsuevit inferre. Quæ his agnoscitur signis. Cum ambulare cœperit, prioribus pedibus transuariat et dolores subglutit, et crebras deambulationes et calores stabuli, si diligenter etiam operiatur diligere consuevit. Cui per nares suffundes laser et cyriacum in uino tepido solutum.

## De tussi. Caput .LXI.

**F**requenter omni genere deforme uitium, eo q; maxime aīali ū parti accidit, tussis est



## ARTIS VETERINARIAE

dit, tussis est, quæ interdum sponte desinit, interdum medicamentorum ratione curatur, interdum insanabilis penitus inuenitur. Difficultas autem curationis emergit, quia causæ ex quibus tussis euenerit, à medicis nec discernuntur, nec intelliguntur interdum. Quam passionem uniuersis authoribus euolutis, quanto crebrius accidit, tanto studiosius credimus exponendam.

### De tussi quæ uenit si quid faucibus hæserit. Ca. LXII.

**E**xasperatio, aut iniuria faucium grauissimam commouet tussim, quoties aut puluis, aut arista, aut os, aut surculus, aut lapillus, aut aliquid inhæserit gutturi. Quæ res adeo periculosa est, ut nisi celeriter subueniatur, aërialibus per impatientiam doloris insaniam generet. In sole igitur diligenter inspicito, si quid hæserit euellito. Ex tepida etiã, addito nitri puluere, infusa spongia tergo. Deinde oleo rosatio tepido cum lana obturato locum qui indignationem sustinet. Post diem tertium lanam eijcies, eadem ex aqua calida fouebis et tale medicamentum imponis: succari et 4. aluminis colat et 1. ex tepido uino infundis, et sic exasperata sanabis.

### De tussi ex perfrictione. Caput .LXIII.

**E**x perfrictione quoque nascitur tussis. Cuius ista sunt signa: cum tussierit, caput deorsum mittit usque ad terram, et cum biberit, aqua ei per nares currit. Quam hac ratione curabis: Machinam ori infres, manum planam iniicies, cooperies in parte superiore quasi uesiculam, quam unguibus rumpis. Deinde tres pillulas bene confusa axungia molliissimas facies, quos in subtilissimo lomento, hoc est, farina fabacea, conuolues, et per os digeres. al's (una auina uel brutill.) Deinde per triduum (uenaculo) et sale perfricabis, et pastillos cum speciebus calidis et uino in potionibus dabis.

### De tussi à colibus. Caput .LXIIII.

**T**ussis à colibus si fuerit, his signis agnoscitur: coles iniuriæ pleni sunt ac tunc bunt, dum bibunt continuo ruminant. Ouum in aceto acerrimo mutis, resoluta; testa, ita ut integra membrana permaneat, pice liquida perunges, et faucibus digeres. Post alumen, axungiam, salem in uino cocteres, offas facies, et ex melle deijcies, ita ut aqua calida, et si facultas super sit, cum eis decocta assidue fomentare non desinas. Hanc quoque potionem adijcies

# VEGETII LIBER III.

adijces: myrrhæ uncias 2. piperis albi semiunciam, nuclei pini purgati sextarium semis, uue passæ sextarium semis, mellis uncias tres, pastinacæ unciam unā, cariota utridis scilibrā, decoques pariter ex aqua, & addito uino tepido quinq; uel sex diebus potionare non desinas.

## De tussi ab interioribus. Caput .LXV.

**A**B interioribus grauior & penè insanabilis tussis est, quæ hac ratione dinoscitur: nares iumentis præcludit, ut spiritum readere non possit, tunc illa ei inspicies, quæ si spissis pulsibus duxerit, scito esse tussim ex causa iecinis, pulmonis, uel præcordiorum, uel (recentem) si lentis pulsibus illa duxerit & uentrem, indicat tussim de interioribus, hoc est, de his locis, in quibus intestina iumentorum ligantur, quorū tensione & iniuria cōpellūtur tussire. Nā si cursu nimio uel latiore saltu cōuexata illa fuerint hæc nascitur causa. Ex nimio quoq; aestu, uel intolerabili frigore interiora uitiantur, & faciunt tussicos. Vnde uulsi appellātur. Siue igitur ex supra scriptis, siue ex alijs causis interioribus nata fuerint uulnera, etiā si post sanita e duxerint cicatrices, strictius tamen cōtrahendo se et asperitate faciūt, & assidue titillatiōe ppetuā excitāt tussim. Quæ causæ lenissimis medicamētis adiuuari uel suspēdi aliquatenus possunt, p̄anari omnino nō possūt. Hinc est quod in herba uiridi uel pascuis uulforū uitia celātur. Sed omni ipe hæc cōpositio est salutaris: foenigræci heminā, seminis lini heminā, traganti unciam 1. i. thuris masculi uncia 1. myrrhæ un. 1. succari, erui pollinis añ unctā 1. tunsa et cribrata in calida infusa permaneant, altera die ex aqua tepida singulas cotylas dabis ad cornu, cyathos olei rosati permixto, per plurimos dies. Ex qua cōpositione recens causa sanabitur, uetus sentiet leuamētum. Ad quæ uitia nunquam dederis austeriorem potionem, ne exasperet & decidat: sed leuem & simplicem, & refrigeratariam. Cauendum etiam est ne in tali passione unquam sanguinem detrahas. Plerunque tracanton ex oleo debere dari per biduum, Tertio dei decoctos raphanos atque contusos propinare cum uino, refrigeratorium pastillum addentes in æstate. Ad tussim diuersæ sunt potiones, quas proprie omnes inserere necessarium duximus, ut pro qualitate passionū, medentis arbitrio remedia cōmodentur: Farinæ fabæ frixæ sextarios 2. infundis in passi sextarijs 3. et in mortario diutissime cōtercs, piperis triti grana triginta, sepi hircini libras 3. pariter amisces & omnia

P 2 tusa &



## ARTIS VETERINARIAE

tusa & cribrata per os ad cornu per triduum dabis. Nonnulli uero duobus sextarijs, coditi fabae frixae hemina ante triduum fundunt, post deterunt diligenter, & aequatis partibus per triduum digerunt. Alijs placet farinae fabaceae sextarium unum, tribus sextarijs, uini ueteris infundere, additaq; olci optimi libra pariter deterere, ac dare per cornu. Si tuſis ex ruptura uel uulſione prouenerit, anagallicum primo tundes, post herbam paritariam pro duabus partibus teneram admisceſ, adiunctaq; axungia ueteri conterere diligenter, & passus (expertus) stillos facies, quos impari numero & imparibus diebus cum resolutobutyro ac melle diffundes. Ad leuem tuſim uiatoria sunt (expeditaq; remedia, porros decoquere, & cum herba paretaria bene tonsa miscere, factisq; pastillis in ouo resolutobutyro oleo roseo, necnon & passo & melle conuoluere per triduum deijcere, succum ipsius iuris in quo decocti sunt porri, in super dare per cornu. Item laser. i. opium syrenicum ad magnitudinem fabae, cum uino ueteri deteres et per cornu dabis. Tuſiet grauedini capitis medebitur oleum roseum uel certe simplex & uiride cum aqua calida per nares dextrum per triduum diffusum.

### De uulſis. Caput .LXVI.

**V**ulſis glutinare creditur, si draganti uncias 2. pridie infundas in calidam, foeni quoq; greci hemina, lini seminis hemina, separatim infundas, die postero in cacabo decoquas & pariter teras, post medullae ceruinae uncias 2. sepi hircini libra, radice tracontiae unciam 1. gentianae unciam 1. centaureae unciam 1. sepi taurini unciam 1. cotundes, & illis quae prius parata sunt addas: quae omnia in mortarium mittes, & diutissime coteres. Ad ultimum passi sextarios tres & aquam in qua foenigrecum uel semen lini fuerat infusum adijcies & decoques, ac per triduum ad cornu dabis. Grauius tuſientes & uulsi hac potione recreantur: De masculo pinguis porcinus acro decoquitur, donec omnis caro soluat, abiectisq; ossibus uniuersis cum iure quo deferbuerant & tribus sextarijs (passi) succidi: Deinde rursus in cacabum mittis glutis taurini semiunciam, aceti acerrimi hemina dimidia coniungitur et feruet ut quilon fiat, draganti uncias 3. lini seminis et foenigraeci unciae singulae decoquuntur extrinsecus et teruntur: adiunges etiam medullae ceruinae et sepi hircini uncias 3. quae ad ultimum cum omnia pariter calefacta fuerint & colata, facies potionem, ex qua per cornu dabis animalibus diebus septem, aut nouem curaturus, aut tepesactam digeras ut inspissentur, adiecto passo & aquae illius copia in qua



qua cocta sunt semina. Præterea aliquāti caput agninum tam diu decoquūt, donec omnis cōpago soluatur, abiectisq; ossibus terunt, adiectoq; ad ius ipsius melle, diebus septē ad cornu digerunt. Quod si tussis ex faucibus ueniat, myrrhæ uncias 3. cardamomi uncia 1. nuclei sextariū, uux passæ sextariū, deteres diligenter, additoq; melle agitando lentis carbonibus decoques, cum intepuerit, pastillos ad nucis magnitudinem facies, quos ternos cum butyro diebus quinq; uel septem digeres. Item si ex faucibus causa est, occisum pullum palpitantem aperies, & tollis eius uentriculum, quē cum suo stercore calentem & integrum in melle conuolues, & per cānalē digeres. certissimū ac uerum remedium est. Si exasperatio gutteris mouerit tussim, myrrhæ uncias 2. piperis uncias 2. seminis lini frixi & contusi sextarium, cardamomi semiunciam, uux passæ sextariū, nuclei sextariū, mellis pondo duo, diligenter trita cōmiscas ac decoquis, pastillos ad nucis magnitudinē facies, ternos in die digeres.

De tussi quæ generat̃ ex humoris acerbitate. Ca. LXVII.

**T**ussi quæ ex acerbitate humorum prouenit, tali ratione succurritur: In primis purgandum est corpus tussientis. Cucumerem itaq; syluaticum uel radices eius cum nitro Alexandrino conteres, & diunctoq; uino uetere per os dabis ad cornu. Quæ potio cum laxauerit uentrem, post diē tertium squillæ ualidioris 3 quatuor contundes, & optimi laseris quantum fabæ patitur magnitudo commisces, uiniq; odorati sextarium, & olei ueteris librā addis, & cum diligenter omnia cribraueris, triduo per os defundes ad cornu. Item alia. Istis quoq; suffumentis nō minus quā potioibus adiuuabis: Sandarici uncias 3. asphalti uncias 3. alij & ceparum uncias 3. quæ cum pariter triueris, in tres partes æqualiter diuides, & per triduum cooperto ori uel capiti subiectis carbonibus suffumiges, ut odor impleat nares. cuius tamē oculos prius ligabis ne medicamenti acerbitate ledantur. Herba quoq; marrubij fasciculum quā magnum uolueris deteres, et cum ouo & uino succido admisces, addita adipe ceruina, uel si defuerit, uerbenaceam cum cera resoluis, & cum tepida ad cornu digeres. Grauiſsimæ subuenit tussi si pillulas cypressi decoquas, & purges diligenter, addita axungia, & argallico, & folijs tenerioribus herba paritaria, cōtundas in pila, et pastillos ad nucis magnitudinē facias, quos quotidie impares cum melle & oleo et uino passo, ovis intinctos deijcias. Si placet pro pillulis etiam folia cypressi cōtusa miscere cum omni-



# ARTIS VETERINARIAE

bus superscriptis poteris, picis liqda facere potionē, et dare p cornu. Ad oēs  
tusses talē dedere pleriq; potionē; draganti, myrrhæ, spicæ nardi att uncia 1.  
deiriuere sollerter, et cū duobus sextarijs passi per triduum diffudere.

Ad tussim siccam, uel suspiriū. Ca. LXVIII.

**A**d arteriam exasperatam, et ad spasmodum: hyssopi librā, scenigræci se-  
librā, seminis lini, tracanti, anagallici, rutæ uiridis singulas selibras,  
salis heminam dimidiam conteres, et usq; ad tertiam decoques cum  
passo, tussienti per triduum, uulso per nouem dies dabis. Alij petroselinū mace-  
donici unciam 1. semis, dauci unciam 1, myrrhæ, spicæ nardi, costi, tracanti,  
singulas uncias, prius in mulla tepida diffusas, acori, pipis, succari atq; uncia 1.  
guttæ armeniæ uncias 2. cassiæ uncia 1. pariter deterunt, pastillos ex mul-  
sa faciunt, post cū passo deiciunt tediāti. Ad tussim ueterē, et ad suspiriū, uel  
anhelitū, et ad synanchen, Si mox dederis storacis rubæ uncias 3. murrhæ  
trogloditis uncias 2. opopanax unc. 2. irisillyricæ uncias 2. galbani unc. 2.  
resinæ terbentinæ uncias 3. herbæ simponiæ uncia 1. pariter commisces et  
deteris, pastillos facies cū melle. Præterea axungie librā semis, caricas quā-  
dam (traueam) decim (pineam) combustā, et in puluerem redactā, liquaminis optimi hemi-  
nam, mellis librā cum cauliculis excoctis, offas faciūt et cum passo digerūt.  
Aliquanti hederæ folia, itē populi albi folia, æquo pondere deterūt, et cū uino  
albo per nares defundunt. Alij rutæ folia cū melle deterūt, et cū uino optimo  
p nares defundūt. Alia. Cucumeris syluatici folia sceno miscēt, radicēq; ipsius  
contundūt, et cū lini semine et hordeo cōmixta offerunt. Experimēto pro-  
batū est tussim suspiriūq; sanare. Alia. Sulphur uiuū et rosmarinū cū melle  
et uino ueteri per sinistram narē digeris. Aliquanti panacis radicē detritā  
cū uini optimi hemina, et tribus cyathis olei, per cauernas naris sinistra in-  
fundunt. Præterea rosmarini 3. myrrhæ scrupulos 2. cū uini ueteris sexta-  
rio, olei hemina, per nares triduo defundūt, ita ut in die detur hemina. Anetū  
acetabulum, irisillyricæ acetabulū, rutæ scrupulū 1. olei heminā dimidiā per  
os digerūt. Suspiriū quoq; ac tussim releuat, si radicis mori scrup. 1. herbæ  
heliotropij uncias 3. diligenter cōteras, et cū hemina uini candidi per os de-  
fundas. Recens quoq; tussis expimēto curationis sedatur. Lentis sextariū se-  
mis emolis, harināq; molliissimā facies, ex qua singulas heminas cum singulis  
heminis aquæ per os per triduum digeres. Vetus aut tussis aboleri creditur, si  
cyathis

cyathos tres ex succo porri cum hemina olei pluribus diebus per fauces de-  
fundis. Tussientes ac uulsi hac potione curantur: panacis radice uncias 2. sul-  
phuris uiui uncia 1. thuris masculi uncias 2. myrrhæ trigloditis uncia 1. com-  
mixta in puluerem rediges, ex quo duo cochlearia cum duobus ouis, addita ui-  
ni ueteris hemina, diebus quinque uel septem per os dabis. Expertum dicitur, ulmi  
cinerem leuissimum, in fauilla aqua tepenti miscere, et olei boni aquam mensuram  
addere, iunctisque tribus ouis, diebus quot uolueris dare per fauces.

Ad uomicam & tussim. Caput .LXIX.

**V**alidissima contra tussim & uomicas compositio est: succi marrubij  
expressi heminam, caricis siccas xxv. mellis attici uel cymini sexta-  
rium semis, in olla noua ad medium decoques, post myrrhæ trigloditis  
uncias 2. dauci unciam 1. castie fistule unciam semis, cinnami semiunc. thuris mas-  
culi unciam, aristologie uncias 2. opopanax unciam, iris illyricæ unciam semis, ra-  
dicis panacis unciam, uniuersa cõterito atque cribrato, et supra medicamentum in  
quo mel et ficus coxeris mitto, et studiose agitando feruere facio paulatim car-  
bonibus lentis, post in pixide plumbæ uel lignæ cõdito, ex qua bina cochlea-  
ria cum hemina uini per os quotidie digeres. Vulsis uel tussientibus prodest singu-  
los sextarios lentis, fœnigræci, et lini seminis frigere separatim et puluerem  
facere, et de singulis speciebus singula cochlearia cum succo anagallici, et succo  
plantaginis quantum uolueris addito uino per os dare.

Diuersæ potiones uulforum & tussientium. Cap. LXX.

**V**t diuersæ causæ sunt, ita et difficiles curæ. Quapropter studiose quæ  
expimentis nostris uel aliorum probata cognouimus inuicemus. Ad unum  
itaque aial talis potio præparatur: fabæ frictæ sextarium sine sale cum aqua  
decoqs quæ admodum hominibus cõsueuit apponi. præterea fœnigræci sextarium  
sepatim mittis in cacabum, et cum feruere cœpit primam aquam fundes, post addis  
aquæ sextar. v. caricis xx. ligritiæ unc. 2. tantum ferueat donec 4. sextarij re-  
maneant, tunc fabam istam coctam, et fœnigræcum, cum caricis uel ligritia in mortario  
diligenter deteris, addis in super butyri, sepi hircini ass. unc. 2. ad calorem diligenter  
resolutas. quæ cum omnia miscueris, addito iure in quo fœnigræci decoxeris et pefacta  
per cornu plus quam singulis heminis diebus singulis faucibus digeres. quæ si spissior uel  
deris potione, tantum passi addis ut possit per cornu exire. Barbarorum usus ad-  
uersus tussim inue-



## ARTIS VETERINARIAE

inuenit salutare remedium. Radicē herbæ, cui nomē est enula, quā cāpanam pleriq; appellant, colliges, in umbra siccabis, postea deteres, in puluerem rediges, ex quo terna maiora cochlearia in singulos sextarios uini ueteris pridie infundis, & cum bene agitaueris claudes, ne odor herbæ salutaris exhalet, per os triduo, uel quot uolueris diebus digeres. Item alia. Lentis alexandrinæ, fœnigræci, lini seminis heminas singulas decoquis, addisq; ei tragantū unciam semis, pridie in tepida infundis, & anagallici uncias 3. diligentissime resolutas, quæ cum omnia in mortario triueris, in cacabo nouo cū tribus aquæ sextarijs decoqs, exinde tertiā partē cum sextario passi tepidū per os dabis triduo. continuo sanare creditur uulsos. Si iumentum ex uulneribus faucium tussis urgebit, irisillyricæ unciam 1. piperis nigri semiunciam, succari 3. r. myrrhæ troglitis semiunciam, churis pollinis semiunciam, traganti prius infusi & triti unciam 1. oua quinque cum passi sextario cōmises, & triduo per fauces digeris ad cornu. Post mel, butyrum, axungiam, salem & piculam cōmises, offas facies, & in passo intinctas digeras. Si ab internis tussierit, succi pīsa-næ heminā, defuti cyathū mīsces, & per tridū dabis. Si grauius tussierit animal, fabæ frixæ & coctæ sextariū, seui hircini uncias 3. alij capita tria pariter decoquis, & in mortario deteris, & cum passo dabis. Curat aut uulsos & ruptos, fœnigræci sextariū 1. cum xx. caricis, fasciculo apij, & fasciculo rutæ in aqua ad mediū decoquis, ita ut postmodum traganti resoluti uncias tres, & anagallici contusi uncias 3. alij tres addātur, & oīa cōterantur, oīulisq; ad nucis magnitudinē factis, terna, quæ, septena p tridū digerūtur

### De Scabie. Caput .LXXI.

**S**cabies iumentis deformē passionē, et interdum periculum generat. Cōtagiosa namq; est, et transit in plures. Cui nascenti medicamentis nō oportet occurrere, ne præclusa cute in uisceribus residens cōuertatur in morbum. Sed ut eruperit foras, primo purgatio uentris adhibetur, si puluerē ex radice cucumeris syluatici cum uino faucibus aīalis infundis, uel certe si radicem cōcisam copiose cum hordeo subministras. Quod cum ex ratione processerit, interposito triduo, aliquātulum sanguinis, si caput et collum scabies inest, de ceruice detrahes. Si uero scapuli uel armi aut pectus in causa est, de brachiolis sanguis emittitur. Cum spinā, uel lumbos, aut coxas pabulis & suans contagio peruaferit, de femorū uenis sanguis emittitur, Asphaltum, sulphur

Sulphur uiuū, picem liquidam in butyrum æquis pōderibus pariter deteris, & in sole diutissime cōfricans totū iumentū corpus perungis, aceti acris sextariū, piculæ uncias 4. cedrinæ unc. 4. pariter decoquis, scabiosum aīal ex lotio humano et calida permixta diligentissime perfricaturus, tunc penicillo in fuste ligato medicamentū inducis in sole, asphaltū et sulfur æqualiter conteris addita adipe porcina, & olei ueteris tantundē, quæ cū decoxeris, perunges in sole. A dipis librā, sulphuris uiui uncias 2. bituminis uncia 1. olei selibrā, picis liquidæ cyathos 2. omnia conteris & decoquis, & perungis sicut supra scriptum est. Lotij ueteris humani fecis 3. stercoreis ouilli selibrā, olei heminam, sulphuris uiui uncias 3. picis liquidæ cyathos 3. oīa contere & decoque & in sole calido animal semel in die perunge. Bituminis pondo duo, sulphuris uiui selibrā, ceræ librā, mānæ thuris selibrā cōmises in oleo in quo prius fasciculus aricusæ decoctus est, & perungis in sole. Alia. si minus habeat intergras uires, Ranas in aqua decoquis, unctamq; earū colligis, & cum polline lenticulæ, adipe et oleo permises, tepfacto perungis. Itē alia. cucumeris syluatici radices lauas & tundis in cacabo nouo cum oleo quātum sufficit decoquis et uteris. Sulphur quoq; cū uino decoctū similiter iuuat. Si uetustate scabies occalluit, prius obradenda ferro uel testis ad uiuū est, insuper humano lotio cū aqua marina uel salsa mixto confricandum est, post sulphuris, bituminis, picis liquidæ, axungæ ueteris, sepi caprini, ceræ, aluminis spissi singulas libras contūdis, mises, & decoquis, & sic aīal perungis in sole. Folia de rodedafnes cum oleo uetere decoques, addita pice liquida, & aceto, et cera, certum est de experimento remedium. Memineris tamen in omni unctione, contra pilum iumentum in sole diutissime confricandum.

Si animal fœno malo lædatur. Caput .LXXII.

**V**iciatum aliquoties uel modicum fœnū ad similitudinem ueneni aīalibus nocet, quorum ista sunt signa: Oculos habebunt uagus & semper micantes, ipse gradus eorū erit incertus. His de matrice auferendus est sanguis, de brachiolis flebotomandi sunt, & potionandi ita, Caricis in uino odorato decoctis, rursum detritis, abstinendi ab hordeo & fœno. dandæ etiam duritiæ potiones.

Si hordeo malo lædatur. Caput .LXXIII.

**S**imili obseruatione curatur, quæ nimio hordeo aut malo laduntur. Sed

Q

hæc etiam



## ARTIS VETERINARIAE

hæc etiam in aqua frigida aduersus torrentem diutissime detinentur. Vtriq;  
remedium est, pelliculam de uentre pulli siccatâ fumo deterere, additisq; octo  
scrupulis piperis, & quatuor cochlearibus mellis, & uncia pollinis ex thu  
re, cum sextario uini ueteris tepesfacto per os dare.

### Ad Fascinum. Caput .LXXIIII.

**F**ascinatum animal triste est, grauatur incesu, macescit, & nisi subuene  
ris incidet in morbum. Bituminis igitur & sulphuris parû cû granis  
lauri ex aqua defundis p nares. Præterea coriandrû uel semē ipsius cû  
sulphure & teda carbombus circûferes, ex aqua feruenti animal consperges  
suffumigabis. Vniuersis quadrupedibus remediû præstat ista suffumigatio, cu  
rat atq; morbis reficit.

### Remedium contra omnes morbos. Ca. LXXV.

**A**dversus uniuersas infirmitates & morbos equorû uel boû, ubi pri  
mû cœperint egrotare potio ista succurrit: Radix scyllæ, radices po  
puli, quæ græce appellatur rhamnos (nâ est fuscior & nubellula) &  
sales cômunes quâtû sufficit mittes in aquâ, eâq; aialibus usq; ad sanitatē da  
bis in potu. Quod si desperatas ualetudines præoccupare uolueris, ne unq; ac  
cidât aialibus tuis, incipiēte uere hæc illis præparabis potionem, & per xiiij  
dies continuos dabis in potu.

### Si aial lædatur cû accipit potionē. Cap. LXXVI.

**O**sten'endû autē est potiōes ipsas oportere curatione defundi. Siq; dem  
As(salient) frequēter euenit, ut dū aialia potionātur tussiant (sudēt) grauiter, et  
tō morē musculorû oīm patiantur, folliētes, & submissō capite se  
sustinere uix possunt. Qd̄ accidit si quando per imperitiā artis dantis, potio  
in arterias & spirituales partes pulmonis resilierit. unde fit & piculū præ  
sens. Quare obseruandū est ne tussienti iumēto et pendenti adijcias potionē,  
sed statim eâ soluas, paululūq; deambulet, & magis ei alia potione subuenias;  
aqua tepide oleū rosatū cōmises & agitas, & per os sæpius dabis. Pusca  
quoq; puleiata nares eius fouebis, & emendabitur culpa. Obseruandū quoq;  
est, ut subtracō hordeo, & negato potu digerit animal potiones.

### Si aial mordeatur à uenenatis bestiis, Ca. LXXVII.

Plerunq;

**P**lerunq; à nociuis aīalibus. i. à colubris, scorpīs, sphalangijs, & mu-  
ribus cācis aīalia feriuntur, & in periculū ueniunt. Cuius ista sunt sig-  
na: fastidium ciborū, pedes trahuntur, & cū producantur succūbunt  
ad singulos gressus, per nares defluet sanies, grauedo nascitur capitis, ita ut  
deiciatur ad terrā, ad surgendum uel incedendū deficiūt corporis uires. Ge-  
neraliter curatio ista succurrit: Locus qui percussus est ante oīa fumigandus  
est succensis testis ouorū gallinæ, quæ prius infundes in aceto, addito etiā cor-  
nu ceruino uel galbano. Post fōmentū loca ipsa scarificabis, & sanguinē ex  
his emittis, Vel certe candenti ferro comburis loca uenenata quæ pistis attia-  
git. Obseruare autē debes, ne aut supra articulos aut neruosis in locis in qua-  
cunq; passione unquam cauterium imponas. Aduſtis enim neruis uel articu-  
lis, perpetua debilitas consequetur. Sed dilige iter considera, ut aut superius  
aut inferius pusillum quā nerui aut articuli sunt, cū neceſſitas fuerit, appo-  
nas cauteria. Animal autē quod uenenata bestiola tengerit expedit ut sudet et  
calidis coopertorijs inuolutū deambulet & farinā hordeaceā in cibo sumat,  
additis frōntibus fraxineis & uitibus albis. (credo) In plaga autē mel atticū  
uel cyminū in uino ueteri mixtum calefactū oportet imponi. Nōnulli stercus  
suillum recens & mel atticū cum uino miscent, et calefactum quasi cataplas-  
ma inducunt, addentes urinam humanam.

Si bustrepem aīal comederit in sceno. Ca. LXXVIII.

**E**quus si bustrepē comederit in sceno uel in pabulo, hæc signa statim se-  
quuntur: Venter ei inflatur, à cibis resilit, & stercora minutatim ei fre-  
quenter reddit: qui statim sternendus est, et cogendus ad cursum. Post ei  
uena tangenda est de palato leuiter, ut sanguinē suū defluentē transglutiat,  
assidue deambulet, triticum cum passo infusum & porros adferes ad ciba-  
dum. Vinum autem tepetactum cum uua passa diligenter contritum ad cor-  
nu dabis eidem in potu.

Si uipera animal percusserit. Cap. LXXIX.

**V**ipera si momorderit iumentum, ex morsu eius pus conuenit exire.  
Nam si prægnaſ erit, totum rūpiū corpus. Ad morsum tamen ui-  
peræ, uel sphalangij, aut muris aranei, cōe remediū est, terrā fornaca-  
rum cū uino miscere et dare per fauces: Vel certe de ipsa terra frequēssime

Q 2 uulua



## ARTIS VETERINARIAE

uulnā cōfricare Ad quas causas etiā terra talparū crediur posse prodesse. Quod si in itinere aut in locis ubi desit copia fumētorū necessitas ipsa contin-  
 git, piperis grana xxx cum sextario uini ueteris tep factō faucibus digerēs,  
 & herbam thymū tritam cum uino si dederis prodesse creditur. Mersus ui-  
 peræ uel cuiuscunq; serpētis ostenditur, si humor putidus de plaga incipit cur-  
 rere. Præsens remedium est, si hedum uel gallum uel agnum in recenti occide-  
 ris, & calentes pulmones eius cum sanguine, uel corde, uel iecore uulnēri ap-  
 posueris, diligenterq; constrinxeris ut omne uirus educat. daturus continuo  
 potionem: acori pontici semiunciam tritā cum uini ueteris sextario, salis tritā  
 heminā pariter misces, & tep factum faucibus digeris. Si perseverat tumor,  
 uitē albam syluestrem copiose comburito, et ex cineribus eius lixiuū facito,  
 & in potionem triduo ad unum sextariū dato. Cinerem quoq; ipsum cū ace-  
 to in modū cataplasmatidis uulnēri imposito. Si nihil profecerit, cauterijs uri-  
 to, uel solenniter curato. Farinam quoq; hordeaceam cū uino & sale, oleoq;  
 decoctam in cicatricem oportet imponi.

Si araneum comederit. Caput .LXXX.

**I**umentum si in pabulo araneum comederit, hæc erunt signa: Totum cor-  
 pus tumebit, sed circa auriculas, & oculos, & nares inflatio cū indigna-  
 tione maior apparet, cui hac ratione subuenis: De palato sanguinem tollas,  
 eumq; exceptū cū sextario aceti & hemina salis miscebis, et circa plagā uel  
 loca iumentia punges, diligenterq; operies ut sudet. hac rōne sanabitur.

Si sphalangius percusserit. Caput .LXXXI.

**S**i sphalangius iumentum percusserit, his apparebit indicij: Stat ei ue-  
 retrum præ dolore, & uidebis uelle mingere, cui ista ratione subuenies:  
 piperis unciam i. piretri unciam, uuae syluaticæ unciam, terito, & cum  
 uino ueteri per fauces dato.

De mure araneo. Caput .LXXXII.

**M**us araneus pestis uenenata, & tam equis quàm bobus noxia, atq;  
 ideo cum captus fuerit mersus necabitur in oleo, ibiq; in putredinē  
 uertitur, ex quo medicamento cum animal mordetur, plaga linitur,  
 & curatur animal. Vel si inuentus non fuerit, cuminum tritū cum pice li-  
 quida.

quida axungiaq; miscetur, ad spissitudinē malagmatis coquitur, impositūq;  
à periculo liberat & sanat. Quod si in suppurationē fuerit plaga conuersa,  
lamina ferrea candenti aperiēda est, & quicquid uiuosum est inurendū, atq;  
ita pice liquida uel oleo curādum. Ne autē mus araneus aīal mordeat, ipsum  
animal uiuū de creta circumdabitur, quæ cum indurauerit, suspēditur in col-  
lum, & non contingetur à morſu ceriſſimum est. Aduersus morſum com-  
probatur, allium tritum cum nitro, & si nitrū defuerit, cum sale et cymino  
permiscere, atq; ex eo puluere loca, quæ morſu contacta sunt, cōſficare. Qd  
si eruperint uulnera uenenata, hordeum combuſtū in puluerem rediges, &  
diluto aceto uulneri inſpergis, & hac ratione ſola curabis. daturus potionē,  
pollinem tritici, hordeū, cedriam, & uini ſextariū per fauces digeres. Quod  
si prægnaſ mus araneus fuerit qui percufferit, his agnoſcitur ſignis: Puſtu-  
le per totum corpus exeunt, ſed ſimili, ut ſupra ſcriptū est, ratione curabitur.

Ad iſtum ſcorpionis. Caput. LXXXIII.

**S**Corpius si iumentum percufferit, his agnoſcitur ſignis: Genua cotra-  
hantur, claudicat, non manducat, de naribus fluent p̄uitæ uirides, ut  
accumbit uix reſurget. Simili ratione curatur ſicut ſerpētis ac uiperæ  
morſus: ſtercus tamen aſinū uelocius in plagam oportet imponi.

De morſu canis rabidi. Cap. LXXXIII.

**C**Anis rabioſi morſus & iumentis, & hominibus exitium inferre con-  
ſueuit, uſq; eo ut ipſi qui contacti fuerint hydrophobos faciāt, & con-  
uertat in rabiem: qui hac ratione curatur: Locus qui morſus eſt, ſer-  
reis, uel quod utilius eſt, cuprinis cauterijs urito, in loco tenebroſo eum cōſti-  
tuito. Sic etiam eum adligabis in tenebris ne quicquam uideat. Quod ſi canē  
ipſum occidere poteris, iecur eius decoctum dabis ad manducandum, uel de-  
tritum ſaucibus digeres. Fœni quoq; flores combures, & cum axūgia ueteri  
deteres, & ad morſum appones, ſalutare remedium eſt. Sed ſpecialiter pro-  
deſt, ſi radicē cynorhodon, id eſt, herbæ quæ appellatur roſa canina effode-  
ris, & lotam prius atq; cōtuſam diligenter, ſue homini ſue animali, quod ra-  
bioſus canis momorderit, in plaga appoſueris, contritamq; cum uino ueteri  
propinaueris quotidie ad bibēdum. Hac enim ſola ratione nec hydrophobus  
fiēt, & imminens crimen euadet. Canis rabidi morſibus ſubuenit, ſi tres ani-

Q 3 tri, iudaici



### ARTIS VETERIN. VEGETII. LIBER III.

tri, iudaici bituminis scrupulum unū tritum cum hemina uini ueteris tepentis triduo per os digerat. Samsuci quoq; grana uel succū de folijs aut de cortice exprimes, & cum uino ueteri dabis in potu. Sed tunc efficax est hæc portio, si de eosamsuco dederis, quæ nō in terra, sed in alia arbore fuerit innata.

Si sterco gallinæ animal comederit. Ca. LXXXV.

**S**i finum gallinarum animal in hordeo comederit, uel foeno sumperit, quasi à uenenatis bestijs percussum cruciatur continuo, inter norum dolor & inflatio subsequitur, ad similitudinem quoq; strophii et uolutio ac tuſis asperissima. Aduersus quā necessitatem, apij seminis deteris uncias 2. & cum uini ueteris sextario, & hemina mellis temperas, & per os defundis, & tam diu deambulare cōpelles, donec portio uentrem moueat. Quod si nimius dolor etiam obroboratione fuerit subsecuta, baccarū lauri librā, nitri sili bram, aceti sextarios duos, olei sextariū, diligenter trita permisces, & ad fōcum calefacies, & in loco calido per triduum unges, & contra pilum diligenter fricabis, certissimū daturus ex sudore remedium. Aduersus huiusmodi casum physicum remedium experimenta docuerunt; Pullum si occideris uel gallinam, uentremq; eius crudum & adhuc calentem cum stercore suo equo uel mulo inuolutum melle digerere per fauces, optimum creditur. Tres pillulas gipsi cum uino ueteri deterere, & tepidum per os dare, eadem optime sanare firmatur. Lixiuum quoq; de arbore ulmi, uel cuiuscūq; generis ligni cinerem, dummo do bene cretum, cum oleo mīcere, ac liquidum & tepidū defundere per fauces, physicum & salutare laudatur.

FINIS LIBRI TERTII.

# VEGETII RENA

TI ASTIS VETERINARIAE LI.  
BER QVARTVS.

DE NVMERO ET POSITIONE  
ossium. Caput primum.



**I**N VMENTVM IGITVR HABET  
in capite ossa duo, à fronte usq; ad nares alia duo, ma-  
xillaria inferiora duo, dentes quadraginta. i. molares  
xxiiij. caninos ij. rapaces xij. In ceruice autem sunt  
spondili vij. spatula renū sunt octo. à renibus usq; ad  
anum septem, muscarium habet commissuras duode-  
cim. In armis prioribus sunt regulae duae. Ab armis  
usque ad brachiola duo. A brachiolis usq; ad genua duo. In genibus parasta-  
ticae duae, à tibia usque ad articulos duo, bases quae appellantur numero duae,  
usq; ad pumices ungulae ossa minuta sedecim, in pectore unum, Costae tamen  
in interioribus triginta sex. Item à posterioribus à (cumulari) usq; ad mola-  
ria duo, à molaribus usque ad uertebras duo, costales duo. Ab acrocolesio  
usque ad gambam duo, à gamba usq; ad cirros tibiales duo, minuta usque ad  
ungulas sedecim. Et sunt ossa omnia centum septuaginta. als (columellari)

De numero & qualitate membrorum. Ca. II.

**N**unc mensuras numerūq; membrorum oportet exponi. In palato gra-  
dus sunt xij, longitudo linguae habet pedem semis, labrū superius ha-  
bet uncias sex, inferius uncias quinq; maxilla singulae uncias denas,  
à cirro frontis ad nares habet pedē, auriculae singulae continent uncias senas.  
In oculis aut singulis unciae quaternae. à cirro ubi desinit ceruix usq; ad mer-  
curium continetur calculi octo, Spina continet subterspatulas triginta duas, à  
commissura renū (quod cumulare dicitur) usq; ad imū muscariū commissurae  
sunt xij. Sagulae longiciae uncias xij. ab armis usq; ad brachiola uncias vi. à  
brachiolis



## ARTIS VETERINARIAE

brachiolis usq; ad genua longitudo cōtinet pedem. Ab articulis usq; ad ungulas uncias 4. In longitudinem uel prolixitatem pedes sex. Hæc eumetria equi conuenit staturæ honestæ ac mediæ. Caterum non dubitatur in buricis minorâ istâ, & in primæ formæ equis esse maiora.

### De numero & qualitate neruorum. Cap. iiii.

**N**eruorum quoq; numerus, qualitas, ac mensura pandenda est. A' medijs naribus per caput, ceruicem, ac mediam spinam, usq; ad imum muscarium descendit filum duplex, quod continet pedes duodecim. Duo nerui in ceruice palmarij continent pedes quatuor. Ab armis usq; ad geniculū nerui duo. à geniculo usq; ad basim uerui quatuor. In prioribus sunt nerui decem, in posterioribus decē. A' renibus usque ad testes nerui quatuor. fiunt in se omnes nerui trigintaquatuor.

### De qualitate uenarum. Caput .iiii.

**C**onsequenter uenarum quoq; indicandus est numerus. In palato uenæ sunt duæ, suboculares duæ, in pectore duæ, de brachiolis duæ, de subcirris quatuor, de talis duæ, de coronis quatuor, de seminibus quatuor, de femoribus uero duæ, de subgambis duæ, de muscario una, uenæ maxtricis in ceruicibus duæ. fiunt pariter uenæ xxix.

### De indicij & ætate equorum. Cap. v.

**A**etatem iumentorum ex dentibus alijsq; signis oportet agnosci, ne uel lamentis imperitiæ subeamus incōmodum, uel curantes ægrotantis ignoremus ætatem. Quia sicut hominibus, ita & equis, aliud conuenit, cum iumenta sunt feruida, aliud cum senectute iam frigida. Manifestum est autem notas corporis cum ætate mutari. Pullis enim bimis & sex mensium medij dentes superiores cadunt, quos lactantes uocant. Cum aut quartū annum agere cœperint, deciditibus his qui canini appellātur, alios supponēt. Deinde intra sextum annū molares cadunt. Sexto anno quos primo mutauit ex equat. Septimo omnes explentur æqualiter, & ex eo cauatos habere incipiunt dētes, nec postea quot annorum sint scire ad fidē nullus potest, nisi signis alijs, quæ usus edocuit. Decimo namq; anno tempora cauari incipiūt, & supercilia nonnunquā canescere. Duodecimo anno nigredo in medietate dentium

dentium apparet. Pleriq; adserunt, domitis et freno assuetis animalibus rugas, quæ in labris sunt superioribus computandas, ita ut ab angulo ubi coeperit morsus incipientes, usq; ad extremū labrum perueniamus. quia annorū numerū, rugarum ostendit. Postremo, rugarum multitudine, tristitia frontis, deiectione ceruicis, pigricia totius corporis, stupore oculorū, palpebrarumq; caluicie senectus ipsa se prodit.

De signis quibus cognoscitur patria. Cap. VI.

**I**N permutandis equis uel detrahendis, maximam fraudem patriæ solet afferre mendaciū. Volentes enim charius uendere, generosissimos fingūt. Quæ res cōpulsit nos, qui per tam diuersas et longinquas peregrinationes equorū genera uniuersa cognoscimus, et in nostris stabulis sepe nutrimus, uniuscuiusq; nationis explicare signa uel merita. Nam ut uiliora ministeria taceamus, equestribus usibus uel maxime necessarios cōstat prælijs circis, uel ad bellum hunniscorum longe primo docetur utilitas patientiæ, laboris, frigoris, famis. Toringos deinde et Burgundiones iniuriæ tolerantēs. Tercio loco Frigiscos, non minus uelocitate quā cōtinuatione cursus inuictos. Postea Epirotas, Samaricos, ac Dalmatas, licet contumaces ad frenata uiles, armis ac bellis asseuerant cruribus. Capadocū gloriosa nobilitas Hispanorū par uel proxima in circo creditur palma. Nec inferiores propē Sicilia exhibet circo, quamuis Aphrica hispani sanguinis uelocissimos præstare cōsuevit ad usum sellæ. Persis prouincijs omnibus præstat equos patrimonio censibus æstimatos, tam ad uehendum molles et pios incesibus, nobilitate pretiosos, sequuntur Armeni atq; Saphareni, in qua nec Epirotas Siculosq; despexeris, si mores ac pulchritudo nō deferat. Hunniscis grande et audacū caput, extantes oculi, angustæ nares, latæ maxillæ, robusta ceruix et rigida, iubæ ultra genua pendentes, maiores costæ, incurua spina, cauda syluosa, ualidissimæ tibiæ, paruæ bases, plenæ ac diffusæ ungulæ, ilia cauata, totumq; corpus angulosum, nulla in clunibus aruina, nulli in musculis thori in longitudine magis quā in altitudine statura, propensior uenter exhaustus, ossa grandia, macies grata, et quibus pulchritudinem præstet ipsa deformitas, animus moderatus et prudens, et uulnerū patiens. Persis et statura, et positione à cæteris equorū generibus nō plurimum differt, sed solius ambulatione quadam

R

tura quadam



## ARTIS VETERINARIAE

tura quādam gratia discernuntur à ceteris, gradus est minutus et creber, et qui sedentem delectet et erigat, nec arte doceatur, sed naturæ ueluti iure præstetur. Inter colatorios enim, et eos quos totonarios uulgus appellat, ambulatura eorum media est, et cum neutri sint similes, habere aliquid creduntur ab utrisque commune sicut probatum est. In breui amplius gratia, in prolixo itinere seuior patientia, animus superbus, et nisi labore subiugatus, assidue aduersum equitem contumax mens, tumens, prudens, et quod mirum est, in tanto feruore cautissime decoris est obseruantior, incuruata in arcum cernit, ut recumbere uideatur in pectore.

### De temporibus uitæ. Cap. VII.

**A**etas longæua Persis, Hunnicis, Epirotis, ac Siculis: breuior Hispanis ac Numidis. Frequens opinio est Barbaricis nulla adhibenda medicamina, quod usque adeo naturæ beneficio ægroti cōualescant, ut eis nocitura sit cura. Sed falsa erat ista persuasio. Nam quanto fortiora membra sunt, tanto diutius uiuant, si ex aëre uenientibus medela non desit. Spadonibus tamen inter authores constitit sanguinem de matrice nunquam, nisi forte ex nimia et extrema necessitate, tollendum: propterea quod caloris maximam partem cum testibus auferunt. De palato tamen si non impediatur negligentia, omnibus prope mensibus iam spadonibus, qui in testiculatis, minuendus est sanguis. Admissarii uero si cohibeantur à uenere, ubi de matricari fuerint, cecari sepe dicuntur. Quamuis eo anno quo admissam faciunt, non sit eis uena laxanda, ne generationi intentum corpus cura gemine necessitatis exhauriat. Studiosis equorum, quæ cura stabuli, qui alimentorum cultus, quæ obseruationis sollicitudo præstata sit, primus ac secundus indicat liber. Nunc de ceteris omnibus his, quæ huius artis doctrina possidet, ad compositiones necessariarum potionum medicamentorumque descendimus, in quibus et explorata congestimus, et ea quæ non tam ad utilitatem curandi, quam ob caritatem emendi Mulomedicorum cupiitis inflauerat submoimus. Constat namque non tam multis neque pretiosis speciebus, sed paucis, et ad causam de qua agitur accommodis posse sanari. Primum igitur ut pingua sint iumenta tam in currilibus quam in sellaribus decet, deinde ut sana permaneant, post ut ægroti curentur, confectioes (ut dictum est) medicaminum proferemus electas

electas ex authoribus multas, de experimentis manifestissimis approbatas.

Potio ad reficienda animalia. Ca. VIII.

**T**Raditur Chiron ad reficienda iumenta uel curanda, hanc addidisse po-  
tionem, qua internos extergeat morbos, qua tuissim reprimat, uulso-  
ac tuissicos curet: Ptisanæ sextarium, lini seminis heminam, croci unciam  
unam, intestinum porcinum recens, quod longanionem uocant, prius diligen-  
ter lotum, uel acronem; quæ si in præsentia forte non suppetunt, hedinum ca-  
put cum pedibus & intestinis ac uentre, & diligenter quasi ad hominum u-  
sus curatum, in cacabum mittis, addes superioribus hyssopi fascēs duos, co-  
chleas germanas purgatas quindecim, bulbos quindecim, ficus duplices uigin-  
ti, rutæ fasciculum unum, baccarum lauri sextarium unum tritum, dactylos  
uiginti, alij purgati capita tria, sepi caprini uncias sex, pulegij sicci fascicu-  
lum. Quæ omnia trita decoquis in aqua cisternina uel cœlesti, donec liquefa-  
cta carne defluant ossa: sed aquam sæpius adicies ne medicamentum ustura  
constringat. Sed cum spissum uideris, colabis, abiectisq; excrementis & ossi-  
bus, tracenti uncias tres pridie calida infusas ut inturgescat & solui possit,  
adicies, passi sextarios tres, oua cruda sex, olei rosati oua plena sex, butyri  
resoluti uncias tres, anagalli uncias tres, amili uncias tres, pulueris quadri-  
garij uncias tres, lomenti fabæ. i. farinæ sextarium: hæc omnia ita tempera-  
bis, ut per cornu defluant, & sextarios singulos ieiunis animalibus per tri-  
duum dabis. Et si uolueris septem diebus interpositis repetis & das à capite  
portionē. Iumenta à morbis uindicat & custodit: Gentianæ, aristologiæ ro-  
tundæ, myrrhæ trogloditis, rasuræ eboris, & baccarum lauri æquis ponde-  
ribus puluis immixtus, ex quo grade cochleare plenum sumis, Adde hysso-  
pi triti scrupulos quatuor, melis uel passi uncias tres, uini sextarium, gigni re-  
soluti pastillum unum, post cursum siue post laborem conditi bene (piperat) <sup>als (preparati)</sup>  
heminam adicies, æstate roris uel absynthij tantundem, & per os dabis ad  
cornu. Si æstu animal fatigatur, pascam cū pulegio trito misces, narēsque  
& faciem confouebis, oua quoque trita cum hemina uini ueteris optimi fau-  
cibus infundis, ut per oui refrigerium uini uirtus accrescat. Maciē languo-  
remq; depellit, si semiuncia sulphuris cū myrrhæ scrupulis 4. in pulucre reso-  
lutis ouū crudū et uini ueteris sextarius addatur, frequētēq; p. fauces detur.

R 2 Diapentem



## ARTIS VETERINARIAE

Diapenton est (ut supra retulimus) necessarium pluribus causis ac morbis, & semper diligenti cofectione seruandum: Gentianæ, aristologiæ rotundæ, myrrhæ, rasuræ eboris, & baccarum lauri, de recentibus speciebus in unum redactis minutissimus puluis, ex hoc febrientibus plenum cochleare cum tribus uncijis mellis, & aquæ tepidæ sextario, in qua radices iunci, & apij sufficiens decoctum fuerit, per os dabis, ita ut triduo similiter cura procedat. Idem puluis si ultra cochlearium cum sextario uini ueteris, & olei uiridis hemina detur, animal à quibuslibet uenenis, uel serpentum, aut bestiarum moribus liberat. Cui si piperis atq; pulegij, necnon etiã cymini pulueris aliud cochleare addideris, & cum uini ueteris sextario dederis, omne frigus expellit.

### Ad tussim & uulsos. Caput .IX.

**T**ussim quoq; insanabilem curat cum hemina passi, & tribus uncijis olei & ouo crudo, si per triduum defundis faucibus, addito fabæ poline, & foenigræco binis cochlearibus. Præterea ualde tussientibus prodest fabæ frixæ sextarius sine sale coctus, sepi caprini uncia 3. allij purgati capita 3. decocta cum succo ptisanæ, data per triduum. Quo medicamento ualidius creditur: ficus sicca pondera 2. foenigræci sextarium, tracanti uncia, pridie in calida infusa, anagallici uncia, rutæ uiridis fasciculū, apij fasciculos tres, pariter in aqua diutissime decoques, & faucibus per triduum defundes. Curare etiã uulsos creditur, si septem uncias cineris mundissimi colligas, addasq; olei uncias tres, bulbos tritos vij. anagallici uncia, butyri uncia, sepi caprini uncia, mellis uncias 3. plantaginis uiridis tritæ uncias 3. passi heminā, ptisanæ uel lini seminis heminā: quæ ita temperata ut per cornu defluant, per triduum, uel ut necessitas cogit per plures dies, ieiunis singulos sextarios dabis. Desperatam tussim sæpe curauit potio uilis ac facilis: pulueris ex faba uncias sex, pulueris ex foenigræco uncias sex, enule tunsæ sicca pulueris uncias 6. pulueris anagallici tussis uncias 3. butyri uncias 6. quæ omnia cum tribus boni uini sextarijs additoq; passi sextario uno semis, pariter agitas, & uni equo ieiuno ante lucem bina cornua per os dabis, donec omnem ebibat potionem. Curā quoq; non parum profuisse experimenta docuerunt, hac ratione compositā: fabæ frixæ sextarium sine sale decoques, addesq; sepi hircini resoluti uncias 3. butyri uncias v. in mortario deteres uniuersa, Præterea foenigræci sextarium bene purgatum seruere



feruere facies, primamq; aquā inter initia feruores effundes, addesq; aquæ se-  
xtarios v. pinguiſſimas caricas xx. & liquiritiæ uncias 4. pariter decoquas  
donec aqua ad tres sextarios redigatur, in mortario deteris ſœnigracū, liqui-  
ritiam & caricas, miſcesq; cū ſaba, ſupfundis etiam calidā in qua caricæ cū cæ-  
teris coctæ ſunt, cōparatiſq; oībus ſi liquor ſpiſſior fuerit, tantū paſſi addis ut  
per cornu facile poſſit exire. diebus plurimis ex eo per os ſingulos sextarios  
tuſſientibus dabis.

Ad coſſos, uermes, uel tineas. Ca. x.

**C**ossos, uermes, uel tineas, ceteraq; animalia ueniris extinguit, si he-  
minā cineris ex oliuæ ligno arido collecti, cū hemina olei uiridis p tri-  
duū dabis ad cornu. Alia quoq; confectio, sed quæ sæpe mortiferā li-  
berat passionē: pulueris santonici, itemq; absynthij pontici, necnō lupini cru-  
di, & herbe centaureæ, & erui pollinis, et seminis raphani binas uncias mit-  
tis, addisq; cornu ceruini uncia, sinopidis pontici pastillos tres, opopanax  
seminūciā, uini tenetani uel alterius austeri sextarios 2. olei uiridis sextariū,  
quæ tepefacta ita aīal defundis, ut per os cornu accipiat, in cliuo constitutū,  
quatenus succus facilius ad interiora pueniat. Postero die idem aīal pronom  
constituatur in cliuo, & per clysterē illius tepidæ potionis sextarius ingera-  
tur, quatenus alternis diebus ex utraq; parte iniecta potio, coagulare qd ap-  
pellatur, possit infundere, in quo illæ noxiæ bestiolæ. ozuntur, & pertuso uē-  
triculo ex cruciata doloribus aīalia pereunt. Est et tertia confectio nō minus  
ualida; Radicis capparis siculi, uel baccas cū folijs ad unā librā deteris pa-  
riterq; cōmīscēs, addisq; aceti sextarios 2. Quod medicamentū interdū per  
os (sicut superius dictum est) interdum per intestinū inijcis animali, ut inter-  
nos hostes potionis austeritate consumas.

Aduersum omnia genera morborum. Ca. XI.

**A** Duersum oīa genera morborū salutaris confectio præparāda est, ut  
inter ipsa initia ex cōditis possit occurri. (Causa) enim medicinæ quæ  
renda est. Myrrhæ librā, thuris masculi librā, mali punici corij tun  
si lib. pipis uncias 3. croci uncias 3. acatiæ rusæ selibrā (cathimiæ) butris is se  
librā, rcsinæ ustæ selibrā, absynthij pontici selibrā, pulueris serpilli selibrā,  
betonice selibrā, centaureæ selibram, sagapini selib. saxifrage selib. peuced  
R 3 ni selib.



## ARTIS VETERINARIAE

ni selib. quæ omnia bene tusa & cribrata in mellis optimi 3. sextarijs misceas, et ad carbonem leuiter paululū coquis, post in uase stagnæo uel uitreo condita seruas, ex qua confectiōe morbidis si febriunt ad diē singula cochlearia maiora cumulatā cum hemina aquæ tepidæ & olei floris tribus uncijs dabis. Quod si absq; febre sunt morbidī, uel conualescere etiam cœperint, cum uino & oleo plurimis diebus dabis, donec animal liberetur. quā ualidissimā & approbatā noueris potionem.

### Confectio suffimentorum salutaris. Cap. XII.

**S**uffimentorum compositio fascinum pellit, lustrat animal, fugat demones, submouet morbos. Olor namq; fumi ac spiritus per os ac nares ingrediens, penetrat ad ulcerum omnes recessus, ac curat sæpius loca quæ potiones non potuerunt curare. Etiam in hominibus suffimentorum uapor præcipue sequitur. Deniq; desperatos & periculosissimos morbos, aut sicut Mulomedici adserunt, non ex pabulo aut aquarum uitio, sed aëris corruptione descendentes. Et ideo facilius languorem quem pestilens morbus ingestit, suffimenti salubris huius curat adflatus. Ac talis compositio suffimentorum: Sulphuris uiui librā, bituminis iudaici librā, opopanacis uncia, galbani selibrā, castorei selibrā, (ciceris) crudi selibrā, albitis selibrā, salis armoniaci unc. 3. rasuræ cornu ceruini unc. 3. sinopidis unc. 3. gagatis scæiæ unc. 3. lapidis gagatis unc. 3. lapidis ematitis unc. 1. lapidis sideritis unc. 1. lapidis argeritis unc. 1. caballiones marinos 7. stellas marinas 4. pallas marinas 7. caudas marinas 7. ungues marinos 7. uuae marinæ unc. 3. modulle tedæ pineæ pōdera 3. cedriæ pond. 3. picis liquidæ pond. 3. ossa sepiæ 7. hæc siccata piter denterūt atq; miscētur, ex qbus unū cochleare, cū opus fuerit, uiuis carbōibus aspergis, et coopto capite, ut fumū p os naresq; suscipiat aīal suffis. Qd suffimentū præter curam iumentorum, sanat incurrentes hoīm passiōes, grādinemq; depellit, demones abigit & laruas.

### Compositio pulueris quadrigarij. Ca. XIII.

**Q**uadrigariū puluerē uocāt, q ex diuerso pigmentorū genere mixtus et p se adiuuat aīalia, et alijs potionibus pro modo uel curatiōe miscetur. Huius Chiron talē cōpositiōnē saluberrimā credit: Tracanti pōdera 3. aloës unc. 5. myrrhæ unc. 5. et 3. 1. costi unc. 1. et 3. 1. armoniaci un. 1. & scrup

3. cassie unc. 1. 3. gentiane lib. 1. aristologie lib. cetauree lib. betonice  
 lib. saxifrage librā, samsuci lib. opij lib. abrotani lib. eupatorii unc. 6. carda  
 momi unc. 6. folij unc. 3. spica nardi unc. 3. spica celtice unc. 6. asari lib. dauci  
 unc. 3. castorij unc. 6. opopanax unc. 6. galbani unc. 6. strutij unc. 6. panacis  
 radice unc. 6. ligritie unc. 6. absynthij fascies 3. succi herbe peristeri sicce et  
 cribrate unc. 7. hæc oia pariter cōteres, et diligentissime in uase uitreo uel sta  
 gneo seruabis. Pelagonius uero quadrigarij pulueris eiusmodi cōposuit cō  
 fectiōē: Cinnamomi, spica syriacæ, spica indicæ, croci siculi, myrrhæ troglo  
 ditis, scieni, pipis nigri, piperis longi, mannæ croci, betonice, catiæ nigre, tri  
 xagrus, folij, nardi lentici i. cepe indicæ, nardi, storacis, acori pontici, thuris  
 masculi, irisillyricæ, thymi cretici, pipis albi, calami aromatici, asari pōtici,  
 petroselinum, mannæ croci, mali terreni, gentiane, rosæ aridæ, cassiæ fistulæ, enu  
 le; oia æquis ponderibus pro modo aialū misces, conteris, cribras, in pixide  
 uel uitreo do lio cōdis, et cū opus fuerit, singula cochlearia, uel amplius, si ui  
 res patiūtur iumentis singulis dabis, ad lito uino et oleo. Interdū alijs potiōi  
 bus misces, si ratio artis uel cura mādauerit. Absirtus quadrigariū pulue  
 rem hac ratione cōposuit; Folij, spica nardi, crocus, piper album, piper lon  
 gam, piper nigrum, opopanax radix, cassia nidafantis, cassia marmalitidis,  
 cassia nardina, irisillyrica, apij semen, malum terræ, peucedanū, sauina, gen  
 tiana, herba rosina, thymum, myrrha, trixago, costum, thus masculum, gesse  
 mantium, malum punicum, calamum aromaticum, rosa sicca, ruta agrestis,  
 petroselinum, aristologia longa, animum, calamum syriacum, herba arte  
 misia; hæc omnia pro numero animalum præparas æquis ponderibus intera  
 misces 3. tundis, cribrasque, 3. seruabis, aduersus passionē usurus.

## Compositio Caustici. Cap. XIII.

**C**auisticum hume ita siccatur, laxata constringit, luxata parat, lesa cō  
 firmat. Huius Chiron talem compositionem demonstrat: Bitumi  
 nis iudici pon lera duo, bituminis apollonij pondera duo, mannæ  
 thuris uncias sex, bitellij arabici uncias duas, medulle cruiue pondera  
 duo, propulei uncias duas, galbani uncias duas, guttæ storacis uncias duas,  
 ceræ communis pondera duo, resinæ cabialis librā unā, uiscericali un  
 cias 3, apoxime unc. duas, succi hyssopi unc. 2. guttæ armoniacæ unc. 2. picis  
 brutiæ



## ARTIS VETERINARIAE

brittiæ librā. Pelagonius causticū, quod suffusiones uesticasq; siccaret in genibus uel articulis, hac ratione cōposuit: Cere punice librā, resinæ pondera duo & semis, galbani uncias 3, asphalti iudici pondera 2, myrrhæ secundariæ pondera 2, bituminis librā, armonici uncias 6, costi uncias 6. Verū cetera decoquis in cacabo fictili nouo, qui cum refrixerit, addis asphaltum et armoniacum et costū pro mēsurā, quā scriptū est, tritum ad modum farine, & agita bis, & iterū coques ut sit una substantia, quo uteris aduersum uenas & uesticas & suffusiones, quæ nascūtur in genibus, aut in tibijs, aut inter nodos, aut in articulis, usq; eo ut ossulagnem curare credantur. Malagma quoq; causticum hac uoluit ratione componi: Picis pondera duo, cere pondera 2, galbani uncias 3, resinæ librā, adipis taurinæ pondera 2, bdellij uncias 7, thuris pollinis uncias 3, resinæ terbentinæ uncias sex, uisci pondera 2, glutis uncias 3.

Absirtus huiusmodi causticum hac ratione composuit, glandularis resinæ frixæ uncias 3, picis duræ uncias 3, bituminis iudaici uncias 3, euisci uncias 3, galbani uncias 3, bituminis græci uncias 3, hæc omnia in uino decoquis. Bitumen uero contundis & superimmittis.

### Compositio malagmæ. Ca. xv.

**C**ompositio malagmæ ad tumores duros & ueteres: Galbani uncias duas, resinæ librā, armoniaci selibrā, picis britiæ selibrā, cere librā, olei quod temperare possit. Item malagma ad tumores duros & ueteres. Galbani libras 2, armoniaci selibrā, resinæ terbentinæ selibrā, opopanacis librā, storacis libram, cere rufæ librā, bdellij lib. piperis albi unc. 1, baccæ lauri lib. piperis lōgi unc. 1, picis britiæ selib. olei irini quantū sufficit.

### Compositio Collyrii fistularis. Ca. xvi.

**C**ollyrium fistulare, quod conficitur ut mittatur in fistulas uulnenum quæ ab initio curata fuerint negligenter. Formatur aut ad mēsuram ipsius fistulæ, ut cū immissum fuerit eadē possit implere, ut celerius iā consumpta duricia, caro uiua ducat solidam cicatricē: Misi librā, fecule lib. eruginis lib. calcitis librā, cymini uncias sex, teres cū aceto, et collyria facies.

Item aliter componitur collyrium fistulare: Misi, eruginis, calcitis, lib. sinapis (lactis) gulas, mellis unc. sex (zungitis) pondera 2, coquas ex uino ueteri, pastillosq; inde facies fistulis inferendos.

Compositio

## Compositio malagmæ crudæ. Cap. XVII.

**C**alcis uiuæ libras 2. sinopidis alexandrini librā, ficus sicca uncias 6. axungie quantum sufficit, immisces, contundis, & uteris.

## Compositio syncrismæ. Ca. XVIII.

**C**eræ rufæ pondera duo, resinæ fricæ pond. 2. olei laurini librā, sepi taurini librā, axungie libram, medullæ ceruinæ lib. olei cyprini, eruginis, hyssopi, axungie ueteris libras singulas, hæc omnia pariter ad carbones decoquis & uteris.

## Compositio Traumatici. Cap. XIX.

**T**raumaticum medicamentū curationi uulnerū ualde cōuenit. Nā absumpta putredine, uiuā carnē ad sanitatē reducit. Huius talis est compositio: Misi librā, calcitis pondera 2. eruginis librā, pariter colabis, & supra tegulam in ignē pones, et coques ut rubeū fiat. Post in mortario teres, & ad similitudinē farinæ puluerē facies. Deinde duos sextarios mellis in olla noua coquis cū uino, & cū feruere cœperit, puluerē superscriptum agitabis, & pariter decoques, refrigeratōq; ad cancrumatas plagas, ad fāmicem & cicatrices reducendas uteris. Traumaticum quoq; hac ratione componitur: Misi, cathimie, aloes (acori) libras singulas, eruginis libras 2. calcitis librā, mellis lib. 2. in olla noua decoques, refrigeratōq; uteris.

## Compositio malagmæ Basilicæ. Ca. XX.

**M**alagmæ quoq; istiusmodi compositio approbata est: Mellis librā, galbani, storacis, bdellij, piperis albi singulas libras, armoniaci pondera duo, medullæ ceruinæ, baccarū lauri ass libram, thuris pollinis uncias 2. sepi caprini uncias 1.

## Compositio alia malagmæ. Cap. XXI.

**M**alagmæ quoq; medicamentū hac ratione componitur: Armoniaci uncias tres, ceræ librā, nitri floris unc. 2. resinæ terbetinæ pōdera duo, storacis uncias 3. baccarū lauri unc. 6. olei cyprini unc. 3. olei laurini uncias 3. medullæ ceruinæ unc. 6. olei rosati uncias 3. adipis anserinæ uncias 6. hyssopi unc. 4. adipis ceruinæ unc. 6. opopanacis unc. 6. piperis albi unc.

S



## ARTIS VETERINARIAE

bi uncias 2. galbani uncias tres, axungiae ueteris libram, aceti acerrimi heminam, thuris masculi uncias 4.

### Compositio prima anacollimatis. Ca. XXII.

**A**bsirtus compositione anacollimatis eiusmodi composuit et prodidit: Floris nitri sextarium, opopanax uncias tres, croci siculi unc. 2. pipis albi unciam, pollinis thuris unc. 3. cochleas contusas x. bulbos xx. anellanis xx. quae omnia contusa et permixta, si aceto temperaris, diuulsa coniungis. Efficacius tamen est, si locis dolorosis emissum sanguinem ipsius animalis addideris. Compositio syncrismæ. Storacis uncias 4. armoniaci unc. tres, medullae ceruinæ unc. 2. olei glaucini unc. 6. olei cyprini unc. 3. seui taurini unc. 3. resinae terbentinae uncias 4. adipis ursinae uncias 3. adipis leoninae uncias 4. propulei unc. 3. olei ueteris uncias 6. axungiae ueteris librā, olei saurensis lib. opopanax, galbani unc. 3. haec ad carbones lentis uaporibus decoquantur, et unctionem saluberrimam praestant.

### Compositio malagmae crudae. Ca. XXIII.

**C**ompositio malagmae crudae talis est: cere punicea selibra, armoniaci selibra, bdellij unc. 3. storacis uncias 2. sagapini unc. 4. thuris pollinis unc. 6. olei ueteris unc. 4. propulei uncias 2. medullae ceruinæ unc. 6. sepi taurini unc. 2. resinae frixae unc. 2. adipis ursinae unc. 2. adipis leonis uncias 2. opopanax, baccarum lauri an unc. 2. olei cyprini unc. 4. gentianae unc. tres, resinae colophonae unc. 6. galbani uncias 6. Item alia compositio malagmae: Cere, armoniaci an lib. storacis unc. 6. sagapini unc. 3. thuris pollinis uncias 3. medullae ceruinæ unc. 4. opij hispani unc. 2. propulei uncias 4. sepi caprini uncias 6. galbani uncias 6. picis britiae unc. 4. resinae terbentinae unc. 3. resinae frixae uncias 3. aceti acerrimi un. 4. olei lentiscini unc. 6. olei irini un. 4.

### Compositio malagmae ad uligines. Ca. XXIII.

**C**ompositio malagmae ad uligines. Salis asri lib. 1. bulbi libram, sulphuris libram 1. misci libras 2. olei lib. his coctis diligenter, uteris.

### Compositio malagmae ad neruos. Ca. XXV.

**S**ulphuris uiui, aluminis, resinae, picis britiae an lib. 1. cere pond. 2. medullae ceruinæ lib. 1. haec omnia pariter diu agitas aut uerberas.

## Compositio Traumatici. Cap. XXVI.

**C**ompositio traumatici. Gallæ unc. 4. æris usti unc. 3. corticis mali punici unc. 3. misî unc. 4. uini unc. 1. aceti unc. 3. in olla noua excoquis et

## Compositio Collyriorum. Ca. XXVII.

(uteris.

Opositiones collyriorum Absirti, Pelagonij, Chironisq; subiecimus.

**c** Ad album enim de oculis tollendū & abstergendū Absirtus tradidit: nuces auellanas combustas donec redigantur in cineres, in mortario deteres, addesq; mannæ thuris idē pondus, quæ diutissime trita, & melle optimo adiecto comprehendatur, & sic inungatur aīal. Idem Absirtus eiusmodi collyriū laudat. Piperis albi grana s. mellis attici unc. 2. croci unc. 2. sepia marinæ (diligenter statissim) & rutæ unc. 2. balsami unc. 1. Pelagonius tale collyrium monstrat (propter). Oleū, sal, resinam, cerusam, opobalsamū, addito melle deteris atq; cōponis, alternis diebus inducis usq; ad sanitatē. Nardinū quoq; collyriū hac ratione composuit. Violæ unc. 1. spicæ nardi uncia semis, castæ, myrrhæ unc. 3. croci unc. 3. olei cyprini unc. 6. pipis albi unc. 2. cymini unc. 3. Item alia collyria cōposuit. opobalsami, croci, myrrhæ, salis hispani, lepidis, ossis sepia singulas uncias, cathimix unc. 2. asronitri unc. 1. mellis attici librā. Chiron etiā uetera glaucomata hac collyrij indicat confectiōe purgari. Cornu bubulini extremū ubi solidū est cōbures, ac thuris masculi puluerē, stercoris quoq; humani cōbusti & salis armoniaci pari mēsurā puluerem facies, piper longū, ossa sepia, flos eruginis, uetus uinū, crocus, ruta, pariter detrita cōmisces, addito optimo melle qd sufficit, & inungis. Aliud quoq; collyriū simile cōposuit. Ossa sepia marinæ, crocus, myrrha, trogloditis; item sal ac stercus crocodili, hæc oīa pariter ac diutissime deteruntur, & bene trita cernuntur, additoq; optimo melle unctiōis uilitatē aīalibus præstat. Licet parua & propè nulla de his, quæ diuersi authores retulerūt (præterissent) doceamus, tamen quæcūq; uidebantur probata conscripsimus. Verum ne longior liber confusionem magis legentibus, quàm instructionē uideretur afferre, modū plenum credimus faciendum. Aliud iterum uerumq; commonentes, ut diligenti cura passionum occurratur exordijs. Nā etiam incurabiles ægitudines, si præsentēs fuerint ui, medentis arte uincuntur. In ueteratas causas etiam faciles, curari sape nō posse legi.



## Alia quaedam medicamentorum genera.

**Cephalicum**, quod facit ad omnia uulnera difficilia claudenda et sup-  
plenda; Herbae panacis radices, thus masculum, myrrham, pollinē erui, ro-  
se folia arida bene trita et cribrata. hic puluis cōfectus difficilia uulnera clau-  
dit ac curat. Nunc etiā si melle decocto, & huius medicamēto mixto collyriū  
facias, et altis sub uulneribus fistule subijcias, citius supplere et sanare cogit.

**Medicamentum consuetum**, in usu quotidiano necessarium,  
propter compendium & moras ita facies: Eruginem, chalcitem, aeris florē,  
as ustū; hēc bene trita et cribrata aequo pondere catastaticum faciūt, quod  
carnē supercrescentem comedendo effouet. Hoc idem cum aceto & melle de-  
coctum ad mellis crassitudinem, facies medicamentū, quod facit ad omnia uul-  
nera & caneros elympidanda, & ossa scabrosa.

**Chlora medicamentum**, quod facit ad omnia uulnera complete  
lympidanda, uel sine difficultate claudenda: cerā punicā, resinam terbentinā  
medullam ceruinam, eruginem, oleum, ita conficies quantum sufficit.

**Tetrapharmacum**, quod facit ad omnia uulnera elympidanda, &  
uelocius curanda († ualde per hoc medicamentum cataloticum) Adipē tau-  
rinā, cerā, picem, oleū. Igitur medicamentū, quod supra dixi cataloticū est.

**Glicium**, quod facit ad omnia uulnera sordida et canerosa: Amurcā,  
salem, acetum: his mixtis quantum uolueris ad crassitudinē mellis uteris.

**Osioclare medicamentum**, qđ facit ad oīa osicula, et († darscus  
quo loco factum si deijciendum uolueris) Picem liquidam, axungiam ueterē,  
eruginem bene tritam & admixtam, colas bene coctum, post decoctionē su-  
pra scripta purgat uulnera diligenter.

**Stypticum**, quod facit ad omnia uulnera humecta, et fungos exiccan-  
dos: Alumen scissum, gallas minores, cortices mali granati, subcorticem de  
ipsa arbore. hēc oīa trita, puluis ipsius uulneribus exiccādis ualde prodest.

**Medicamentum** quod facit ad omnia uulnera claudenda: Absyn-  
thium, sinopidem, lepidam hēc tria bene commixta faciunt medicamentum  
siccum, quod ad omnia uulnera prodest.

**Implectoricum medicamētum**, quod facit ad omnia caua sup-  
plenda: Pollinem thuris, pollinem herbi, lepidam. hēc bene trita medicamen-  
tum

tum

tum faciunt ad supplenda uel elympidanda uulnera.

Ad oculorum rupturas & tuniculas seruandas prodest, si fel caprinum lacti caprino misceatur, & sic penna nigra oculi inungantur. Ad oculorum album siue glaucomata sic facies: uini sextarios 4. gariofloris sextarium unum, mellis uncias 4. pariter decoquis et uteris. Ad (uecentē) ocularem percussum: Croci, myrrhæ, thuris masculi, gummi, medullæ ueruiciniæ, anagallici succi, mellis, cardami, binas uncias.

Syncrisma: Cerae rufæ pondera 2. axungie pondera 4. opopanax uncias 2. olei ueteris pond. 2. galbani unc. 3. myrrhæ pond. 4. armoniæ pō 3. olei cyprini pond. 4. medullæ ceruinæ pond. 2. hyssopi pond. 2. storacis pōd. 4. olei lentiscini pondera 4.

Syncrisma ad alia genera: Galbani pond. 2. opopanax pond. 1. cerae pond. 4. medullæ ceruinæ pond. 3. thuris masculi pond. 2. piperis albi pondus 1. resine terbeninæ pond. 3. storacis pond. 1. adipis anserinæ pond. semis, euforbij uncias 6. adipis leoninæ, mellis, castorei, libras singulas, olei myrrhæ lib. 2. olei lentiscini pond. 2. olei syriaci lib. 2. olei ueteris lib. 2. olei mellini pondera 2. olei storacis pond. 2. opij pond. 3.

Lipparia sic facies: Spumæ argenti pondus 1. cerusæ uncias 2. uini sextarios 3. olei pondus 1. & semis, omnia conficies, & sic uteris.

Lipparia alio genere sic facies: Spumam argenti, cerusam, thus masculinum, acetum album, oleum, hæc omnia in unum conteres, & cum uino mellificato admisces, & sic uteris.

Traumaticum sic facies: Chalcitidis pond. 1. misi pond. 1. semis, erugenis uncia 1. stercoris columbini pond. 1. adarcis uncias 3. & scrupulos 3. decoquis una, et sic uteris. Item alio genere ad flegmonas tollendas: Sinapis alexandrinæ unc. 6. fici asæ unc. 3. axungie ueteris uncias 6. aceti scrup. 3.

Item Traumaticum alio genere ad uerrucas tollendas: Floris chalcitis uncias 2. nutri uncias 2. lasari uncias 3. aceti heminā. Item alio genere ad suffraginosos: Eruginis, aluminis añ pond. 5. herbe syderitis, ferrariæ pond. 1. aceti acris sextarium unum.

Ad flegmonas discutiendas: Radicis, erui, axungie, aceti acris, linis in linteo, & sic uteris.

Causticum ad neruos crassos, uel quæcūq; in notitia sunt: Galbani,

S 3

opopana



## ARTIS VETERINARIAE

opopanacis, medullæ ceruinæ, resinæ terbeninæ, armoniaci, propulei, uiolæ, thuris pollinis, bina pondera, resinæ frixæ pondera 5. bituminis pond. 3. picis duræ pond. 5. resinæ pituinæ pond. 5. ceræ pond. 5. olei cerini pōd. 3. incomij pond. 2. storacis pond. 2. uisci pond. 2.

**Cauticum ad neruorū dolores:** Galbani, storacis, uiolæ, propulei, resinæ singula pond. colophonæ uncias sex, resinæ terbeninæ pond. 6. opopanacis pond. 1. thuris pollinis, hyssopi, armoniaci, bacce lauri singula pond. picis britiæ pond. 1. et semis, uini (inei) pond. 1. semis, resinæ bituminis pond. 1. hæc omnia in uno cacabo coques, in linteolo induces calida.

**Malagma cocticum sic facies:** Ceræ albæ, galbani uncias singulas, resinæ terbeninæ pond. 2. adipis taurinæ pond. 3. hyssopi pond. 2. bdellij pondus 1. semis, irisillyricæ pond. 2. adipis anserinæ pond. 1. hæc omnia decoquis & uteris.

**Malagma ad neruorum dolorem,** Ceræ unc. 6. adipis ceruinæ unc. 3. galbani, piperis, armoniaci, resinæ terbeninæ uncias ternas, traciæ uncias 5. singula contundis, permisces, & uteris.

**Malagma ad neruos uexatos,** Mentæ, galbani, rubricæ, storacis, uiolæ atq. pond. 6. similagnis pond. 4. hæc omnia cum similagine & uino decoques in cacabo, & liquida facies, deinde similaginem & uinū in unū permiscebis, in linis in linteolo, & alligabis feruentia.

**Malagma ad tumores sic facies:** Ceræ uncias 6. adipis ceruinæ uncias 3. galbani uncias 3. uiolæ, piperis albi uncias ternas, armoniaci unciam, resinæ terbeninæ unc. 3. storacis unc. 3. gentianæ unc. 1. singula contundis, postea permisces in uino, & sic uteris.

**Emplastrum,** Ceræ uiridis pond. 1. et semis, olei cyprini unc. 5. olei myrthini uncias 2. adipis anserinæ uncias 2. thuris pollinis unc. 2. hæc oīa in cacabum mittis, coquis, & linteolis inlinis.

**Cerotum ad ulcera, (strumenta)** pond. 2. ceræ rusæ pond. x. olei myrthini pond. 6. olei ueteris pōdera 8. aluminis pond. 5. olei cyprini pond. decem, calcis pond. quinq.

**Fomentum ad tumores siue ad duriciam quālibet sic facies:** cuiuscum ex uino decoctum conteris cū a xungia, & sic uteris. Si minus, herbā sauinam cōteris, et ex rosatio concoquis, & sic uteris ad sanitatem.

Compositio

Compositio ad colices, Asari pontici, petroselini, feniculi uncias singulas, piperis nigri uncias 2. marrubij mas. unc. 1. abrotani unciam semis, mellis optimi pond. 2. coques & despumabis, & hæc omnia contundes et cer nes, & sic in melle commiscebis, inde figuram facies nucis auellanae, & ex aqua dabis, et aqua congiū 1. in potū. Item diebus quibus eo morbo tenetur, feniculi seminis cum uino cochlearia tria aut quatuor fricabis in mortario, adij cies uini cibarij sextariū 1. mittes in ampullam aut cornu, & dabis ut bibat, & cum sagis bene munies.

Malagma ad neruos claudos, Sepi hircini libram, mollicidenæ selibram, resinæ libram, eruginis selibram.

Compositio ad genua. Aceti hemina, salis pusillum, æris usti seli bram, sinopidis quod satis est.

Potio hyemalis. Croci, costi, petroselini macedonici, murrhæ, thuris masculi, tracanti, cymini alexandrini, crocomagnæ, piperis uncias singulas, uini & olei quod sufficit (oua) hæc omnia permisces, & dabis cū succo ptisanæ, cui immittis palmas xxv. bulbos xxv. hyssopi fascem (caprinos adipes catulum breuem uiuum mittis) quem cum madefactum uideris, tunc oia exiccabis, & adijcies olei quod sufficit, tūc illa oia permisces & potionabis.

Potio æstiuæ. Traganti, croci, abrotani, cardamomi, glaucij, petroselini macedonici binas uncias, gingiberis unc. 1. hæc temperas, & cum dare cœperis, mittis quotidie heminas singulas singulis iumentis. Ad des porri sectiui, porclæ sil gallici, thus, apii, olei asri heminam, temperabis quod sufficit & uteris. Sed hæc uide lib. 1. cap. 57.

## F I N I S.

BASILEAE. ANNO. M. D. XXVIII.

EXCVDEBAT IOANNES FABER

EMMEVS IULIACENSIS.
















...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

005644186

